

Miroslav Fiedler

Geometrie simplexu v  $E_n$ . II.

Časopis pro pěstování matematiky, Vol. 80 (1955), No. 4, 462--476

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/108224>

## Terms of use:

© Institute of Mathematics AS CR, 1955

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

GEOMETRIE SIMPLEXU V  $E_n$

(druhá část)

MIROSLAV FIEDLER, Praha.

(Došlo dne 20. listopadu 1954.)

DT 513.821.2

V této druhé části práce se zavádí pojem význačné množiny simplexu, popisuje se množina vlastních i nevlastních význačných bodů a vlastních význačných přímek. Jsou zde uvedeny některé význačné množiny obecného simplexu a dokazují se věty o isogonální příbuznosti.

**6. Význačné množiny simplexu.** Budiž opět  $E_n$  eukleidovský prostor dimenze  $n$  ( $n$  přirozené). Nazveme přípustným zobrazením  $m$ -tého řádu ( $m \geq 0$  celé) takové zobrazení  $\varphi$ , které každé uspořádané skupině  $m + 1$  bodů  $A_1, A_2, \dots, A_{m+1}$  z  $E_n$  přiřazuje nějakou množinu  $M \subset \bar{E}_n$  \*)

$$M = \varphi(A_1, A_2, \dots, A_{m+1}),$$

a to tak, že platí: je-li  $T$  isometrické zobrazení  $\bar{E}_n$ , pak

$$\varphi(TA_1, TA_2, \dots, TA_{m+1}) = T\varphi(A_1, A_2, \dots, A_{m+1}).$$

Budiž nyní  $A_1, A_2, \dots, A_{m+1}$  ( $m \geq 0$  celé) pevná skupina (ne uspořádaná) bodů z  $E_n$ . Nazveme *význačnou množinou* této skupiny každou takovou množinu  $M \subset \bar{E}_n$ , k níž existuje přípustné zobrazení  $m$ -tého řádu  $\varphi$  tak, že

$$M = \varphi(A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_{m+1}})$$

pro každou permutaci  $(i_1, i_2, \dots, i_{m+1})$  indexů  $1, 2, \dots, m + 1$ . Význačnými množinami simplexu v  $E_n$  rozumíme význačné množiny skupiny vrcholů simplexu. Zřejmě průnik i sjednocení význačných množin simplexu jsou opět význačné množiny simplexu.

V dalších větách se budeme zabývat množinou všech význačných bodů pevného simplexu v  $E_n$  o vrcholech  $O_1, O_2, \dots, O_{n+1}$ , t. j. množinou všech význačných jednobodových množin tohoto simplexu.

**Věta 16.** *Množina všech vlastních význačných bodů simplexu tvoří (neprázdný) lineární prostor.*

\*)  $\bar{E}_n$  je eukleidovský prostor  $E_n$ , doplněný nevlastními body.

Důkaz. Označme  $\mathcal{A}$  množinu všech vlastních význačných bodů daného simplexu. Jsou-li  $P, Q$  dva různé body  $\mathcal{A}$ , pak každý vlastní bod přímky  $PQ$  je význačný bod simplexu: pro body  $P$  a  $Q$  to platí, každému jinému bodu  $S$  přímky  $PQ$  je přiřazen dělicí poměr  $\lambda$  ( $0 \neq \lambda \neq 1$ ) vzhledem k bodům  $P$  a  $Q$ . Odpovídají-li význačným bodům  $P$  a  $Q$  přípustná zobrazení  $\varphi$  a  $\psi$ , takže  $P = \varphi(O_{i_1}, O_{i_2}, \dots, O_{i_{n+1}})$ ,  $Q = \psi(O_{i_1}, O_{i_2}, \dots, O_{i_{n+1}})$  pro každou permutaci  $(i_1, i_2, \dots, i_{n+1})$ , označme  $\chi$  takové zobrazení, které každé uspořádané skupině  $n + 1$  bodů  $A_1, A_2, \dots, A_{n+1}$  z  $E_n$  přiřazuje množinu všech bodů  $X$ , k nimž existují vlastní body  $P' \in \varphi(A_1, A_2, \dots, A_{n+1})$ ,  $Q' \in \psi(A_1, A_2, \dots, A_{n+1})$ ,  $P' \neq Q'$ , tak, že  $X$  má dělicí poměr  $\lambda$  vzhledem k bodům  $P', Q'$ . Zřejmě je  $\chi$  přípustné zobrazení a platí

$$S = \chi(O_{i_1}, O_{i_2}, \dots, O_{i_{n+1}})$$

pro každou permutaci  $(i_1, i_2, \dots, i_{n+1})$ , t. j. bod  $S$  je rovněž význačným bodem simplexu.

Odtud však ihned plyne, že  $\mathcal{A}$  je lineární prostor. Že  $\mathcal{A}$  je neprázdné, ukážeme (nezávisle) ve větě 18.

**Věta 17.** *Nechť  $\sigma_i(\xi_{kl})$ ,  $i = 1, 2, \dots, n + 1$ , jsou reálné funkce  $\binom{n+1}{2}$  reálných proměnných  $\xi_{kl}$ ,  $k < l$ ,  $k, l = 1, 2, \dots, n + 1$ , definované pro všechna kladná  $\xi_{kl}$ ; definujeme ještě pro  $k > l$   $\xi_{kl} = \xi_{lk}$ . Nechť dále platí: při výměně každých dvou indexů  $i, j$ ,  $i \neq j$ , u  $\xi_{ki}$  se pro  $i \neq p \neq j$   $\sigma_p$  nezmění,  $\sigma_i$  přejde v  $\sigma_j$  a  $\sigma_j$  v  $\sigma_i$ .<sup>1)</sup> Označme v simplexu  $\Sigma$  o vrcholech  $O_1, O_2, \dots, O_{n+1}$  čtverce vzdáleností bodů  $O_i, O_j$  symboly  $e_{ij}$ . Potom bod o barycentrických souřadnicích  $\sigma_i(e_{ki})$ , pokud existuje (t. j. pokud nejsou  $\sigma_i(e_{ki}) = 0$  pro  $i = 1, \dots, n + 1$ ), je význačný bod simplexu  $\Sigma$ .*

Důkaz. Nechť  $\sigma_i$  jsou funkce splňující předpoklady věty. Označme  $\sigma(A_1, A_2, \dots, A_{n+1})$  zobrazení, které každé skupině bodů  $A_1, \dots, A_{n+1}$  z  $E_n$  přiřazuje buď bod o barycentrických souřadnicích  $\sigma_i(a_{kl})$ , kde  $a_{kl} = \varrho^2(A_k, A_l)$ ,  $i, k, l = 1, \dots, n + 1$ , vzhledem k simplexu  $A_1, \dots, A_{n+1}$ , pokud body  $A_1, \dots, A_{n+1}$  jsou lineárně nezávislé a pokud nejsou  $\sigma_i(a_{kl}) = 0$  pro  $i = 1, \dots, n + 1$ , anebo prázdnou množinu v opačném případě. Zobrazení  $\sigma$  je přípustné, jak plyne z invariance barycentrických souřadnic při isometrických transformacích. Dále je

$$\sigma(A_1, A_2, \dots, A_{n+1}) = \sigma(A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_{n+1}}) \quad (6,1)$$

pro každou permutaci  $(i_1, i_2, \dots, i_{n+1})$  indexů  $1, 2, \dots, n + 1$ . Podle předpokladů o funkcích  $\sigma_i$  to totiž platí pro každou transpozici (podrobněji: je-li na jedné straně rovnosti (6,1) prázdná množina, je i na druhé straně prázdná množina; je-li na jedné straně (6,1) bod, je na druhé straně též bod, neboť jeho bary-

<sup>1)</sup> Podrobněji: položíme-li  $\xi'_{ik} = \xi_{jk}$ ,  $\xi'_{jk} = \xi_{ik}$  pro  $i \neq j \neq k$ ,  $\xi'_{kl} = \xi_{kl}$  pro  $i \neq k \neq j$ ,  $i \neq l \neq j$ , je pro  $i \neq p \neq j$   $\sigma_p(\xi_{kl}) = \sigma_p(\xi'_{kl})$ ,  $\sigma_i(\xi_{kl}) = \sigma_j(\xi'_{kl})$ ,  $\sigma_j(\xi_{kl}) = \sigma_i(\xi'_{kl})$ .

centrické souřadnice se nezmění až na výměnu příslušných dvou souřadnic, pro které se však zároveň mění oba vrcholy simplexu  $A_1, \dots, A_{n+1}$ ). Poněvadž každou permutaci lze složit z transposic, je tím věta dokázána.

Bezprostředním důsledkem je tato věta:

**Věta 18.** *V každém simplexu je bod o barycentrických souřadnicích  $(1, 1, \dots, 1)$  význačný bod. Nazývá se těžištěm simplexu.*

Důkaz. Stačí ve větě 17 položit  $\sigma_i(\xi_{ki}) = 1$  pro  $i = 1, \dots, n + 1$ .

Poznámka. Nechť  $M_1$  je neprázdna podmnožina množiny indexů  $M = \{1, 2, \dots, n + 1\}$ . Potom těžiště té stěny simplexu  $O_1, \dots, O_{n+1}$ , která má vrcholy  $O_i, i \in M_1$ , má barycentrické souřadnice (vzhledem k celému simplexu)  $T_{M_1} = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n+1})$ , kde  $\xi_i = 1$  pro  $i \in M_1$ ,  $\xi_j = 0$  pro  $j \notin M_1$ . To plyne ihned z toho, že barycentrické souřadnice bodu v té stěně jsou  $\xi_i = \xi_i^{(M_1)}$  pro  $i \in M_1$ ,  $\xi_j = 0$  pro  $j \notin M_1$ , kde  $\xi_i^{(M_1)}$  jsou barycentrické souřadnice tohoto bodu (až příp. na faktor) vzhledem k simplexu (o příp. menším počtu dimensí) o vrcholech  $O_i, i \in M_1$ , jak vyplývá na př. z rovnice (2,8) odst. 2 první části tohoto článku.

Abychom mohli studovat lineární prostor  $\mathcal{A}$  význačných bodů simplexu, zavedeme si nejprve pojem *grupy automorfismů simplexu*. Automorfismem simplexu v  $E_n$  nazýváme každé isometrické zobrazení  $E_n$ , které převádí množinu vrcholů simplexu v sebe. Automorfismy simplexu tvoří zřejmě grupu, kterou nazýváme grupou automorfismů simplexu. Každý automorfismus simplexu je jednoznačně určen permutací vrcholů simplexu (totiž permutací  $(i_1, i_2, \dots, i_{n+1})$  čísel  $1, 2, \dots, n + 1$  takovou, že při tom automorfismu přejde vrchol  $O_k$  ve vrchol  $O_{i_k}$ ), t. j. grupa automorfismů simplexu v  $E_n$  je isomorfní některé podgrupě grupy permutací  $(n + 1)$ -ho stupně. Množinu vrcholů simplexu lze rozložit na podmnožiny té vlastnosti, že každý vrchol  $O_i$  jedné podmnožiny přejde při libovolném automorfismu simplexu opět ve vrchol této podmnožiny, a při tom pro každý vrchol  $O_j$  této podmnožiny existuje alespoň jeden automorfismus simplexu, který převádí vrchol  $O_i$  ve vrchol  $O_j$ . Tyto podmnožiny odpovídají systémům transitivity uvedené podgrupy permutační grupy a budeme je proto nazývat systémy transitivity vrcholů. Tak simplex v  $E_n$ , jehož grupa automorfismů obsahuje jediný (identický) automorfismus, má  $n + 1$  systémů transitivity vrcholů (v každém systému je vždy jeden vrchol).

**Věta 19.** *Význačné množiny simplexu  $\Sigma$  jsou právě ty množiny, které jsou invariantní při všech automorfismech simplexu  $\Sigma$ .*

Důkaz. Že význačná množina simplexu je invariantní při všech jeho automorfismech, je zřejmé. Nechť obráceně je  $M$  množina, invariantní při všech automorfismech simplexu  $\Sigma$  o vrcholech  $O_1, \dots, O_{n+1}$ . Sestrojme nejprve ke každé permutaci  $k_1, \dots, k_{n+1}$  indexů  $1, \dots, n + 1$  zobrazení  $n$ -tého řádu  $\psi_{k_1, \dots, k_{n+1}}$  takto:

Nechť  $A_1, \dots, A_{n+1}$  je nějaká skupina  $n + 1$  bodů z  $E_n$ ; platí-li  $\varrho(A_{k_i}, A_{k_j}) = \varrho(O_i, O_j)$  pro všechna  $i, j = 1, \dots, n + 1$ , t. j. tvoří-li (podle věty 3) body

$A_{k_1}, \dots, A_{k_{n+1}}$  v tomto pořadí vrcholy simplexu  $\Sigma'$  shodného se simplexem  $\Sigma$ , pak  $\psi_{k_1, \dots, k_{n+1}}(A_1, \dots, A_{n+1})$  je množina, která vznikne z  $M$  isometrií, převádějící  $\Sigma$  v  $\Sigma'$ . Neplatí-li  $\varrho(A_{k_i}, A_{k_j}) = \varrho(O_i, O_j)$  pro všechna  $i, j = 1, \dots, n+1$ , pak necht'  $\psi_{k_1, \dots, k_{n+1}}(A_1, \dots, A_{n+1}) = \bar{E}_n$ .

Zobrazení  $\psi_{k_1, \dots, k_{n+1}}$  jsou zřejmě vesměs přípustná. Položíme-li nyní  $\varphi(A_1, \dots, A_{n+1}) = \bigcap_{(k_1, \dots, k_{n+1})} \psi_{k_1, \dots, k_{n+1}}(A_1, \dots, A_{n+1})$ , je  $\varphi$  opět přípustné zobrazení a platí

$$M = \varphi(O_{i_1}, \dots, O_{i_{n+1}})$$

pro každou permutaci  $i_1, \dots, i_{n+1}$  indexů  $1, \dots, n+1$ . Je tedy  $M$  skutečně význačná množina simplexu  $\Sigma$ .

**Věta 20.** *Necht' v simplexu  $\Sigma$  je  $r$  systémů transitivity vrcholů. Potom lineární prostor  $A$  význačných bodů simplexu má dimenzi rovnu  $r - 1$ . Je určen  $r$  těžišti vždy té stěny simplexu  $\Sigma$ , která má vrcholy z jednoho systému transitivity vrcholů.*

**Důkaz.** Necht' simplex  $\Sigma$  má vrcholy  $O_1, \dots, O_{n+1}$  a necht'  $e_{ij}$  jsou opět čtverce vzdáleností vrcholů  $O_i, O_j$ . Označme na okamžik

$$x = \left\| \begin{array}{c} x_1 \\ x_2 \\ \cdot \\ \cdot \\ x_{n+1} \end{array} \right\|, \quad y = \left\| \begin{array}{c} y_1 \\ y_2 \\ \cdot \\ \cdot \\ y_{n+1} \end{array} \right\|, \quad L = \|1, 1, \dots, 1\|$$

(o  $n+1$  prvcích),  $E = \|e_{ij}\|$ .

Platí tato pomocná věta: *Necht'  $A$  je lineární zobrazení prostoru  $E_n$ , při kterém bodu o barycentrických souřadnicích  $(x_1, x_2, \dots, x_{n+1})$  vzhledem k simplexu  $\Sigma$  odpovídá bod  $(y_1, y_2, \dots, y_{n+1})$  tak, že pro  $i = 1, \dots, n+1$  je*

$$y_i = \sum_{k=1}^{n+1} a_{ik} x_k,$$

t. j. pro  $A = \|a_{ik}\|$  platí

$$y = Ax.$$

*Zobrazení  $A$  je isometrické tehdy a jen tehdy, existuje-li nenulové číslo  $\alpha$  tak, že*

$$A'EA = \alpha^2 E, \tag{6,2}$$

$$LA = \alpha L. \tag{6,3}$$

**Důkaz.** Podle rovnice (2,9) z věty 1 prvé části je čtverec vzdálenosti dvou vlastních bodů  $\overset{1}{X}, \overset{2}{X}$  možno psát ve tvaru

$$\varrho^2(\overset{1}{X}, \overset{2}{X}) = \left( \frac{\overset{1}{x}}{Lx} - \frac{\overset{2}{x}}{Lx} \right)' E \left( \frac{\overset{1}{x}}{Lx} - \frac{\overset{2}{x}}{Lx} \right),$$

kde  $\overset{1}{x}$  resp.  $\overset{2}{x}$  jsou obdobné sloupcové matice barycentrických souřadnic bodů  $\overset{1}{X}, \overset{2}{X}$  jako je matice  $x$ . Přitom je  $Lx = \sum_{i=1}^{n+1} x_i \neq 0, Lx^2 \neq 0$ . Odtud snadno plyne, že platí-li (6,2) a (6,3), je zobrazení  $A$  isometrické. Je-li obráceně  $A$  isometrické zobrazení, pak, jak známo, převádí vlastní body opět ve vlastní body a nevlastní opět v nevlastní; odtud plyne (6,3). Z toho, že platí  $\varrho^2(A\overset{1}{X}, A\overset{2}{X}) = \varrho^2(\overset{1}{X}, \overset{2}{X})$  pro každou dvojici vlastních bodů  $\overset{1}{X}, \overset{2}{X}$ , pak plyne (s užitím (6,3))

$$\frac{1}{\alpha^2} \begin{pmatrix} \overset{1}{x} & \overset{2}{x} \\ Lx^1 & Lx^2 \end{pmatrix} A'EA \begin{pmatrix} \overset{1}{x} & \overset{2}{x} \\ Lx^1 & Lx^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \overset{1}{x} & \overset{2}{x} \\ Lx^1 & Lx^2 \end{pmatrix}' E \begin{pmatrix} \overset{1}{x} & \overset{2}{x} \\ Lx^1 & Lx^2 \end{pmatrix},$$

t. j. po snadné úvaze rovnice (6,2).

Z této pomocné věty vyplývá, že automorfismům simplexu  $\Sigma$  odpovídají (až na nenulové faktory) takové matice  $A = \|a_{ij}\|$ , které mají tvar  $a_{ij} = 1$  pro  $j = k_i, a_{ij} = 0$  pro  $j \neq k_i$ , kde  $(k_1, k_2, \dots, k_{n+1})$  je permutace čísel  $1, \dots, n+1$ , a pro které je dále

$$A'EA = E. \quad (6,4)$$

Dokážeme teď druhou pomocnou větou:

*Nechť  $Y = (y_1, \dots, y_{n+1})$  je vyjádření vlastního význačného bodu simplexu  $\Sigma$  v barycentrických souřadnicích a necht vrcholy  $O_j, O_k$  simplexu  $\Sigma$  leží ve stejném systému transitivitu. Potom je  $y_j = y_k$ .*

**Důkaz.** Podle předpokladu existuje isometrické zobrazení  $A$  prostoru  $E_n$  tak, že převádí množinu vrcholů simplexu v sebe, a při tom vrchol  $O_j$  ve vrchol  $O_k$ . Pro příslušnou matici  $A$  tedy je

$$a_{kj} = 1, \quad a_{kl} = 0 \quad \text{pro } l \neq j. \quad (6,5)$$

Protože  $Y$  je význačný bod, existuje přípustné zobrazení  $\varphi$  tak, že

$$Y = \varphi(O_1, O_2, \dots, O_{n+1}) = \varphi(AO_1, AO_2, \dots, AO_{n+1}).$$

Odtud plyne, že pro některé  $\varrho \neq 0$  je

$$Ay = \varrho y, \quad (6,6)$$

kde  $y$  je příslušná sloupcová matice. Protože  $Y$  je vlastní bod a platí (6,5), je v (6,3)  $\alpha = 1$  a v (6,6)  $\varrho = 1$ . Ze vztahů (6,5) a (6,6) s  $\varrho = 1$  pak ihned plyne  $y_j = y_k$ , jak jsme chtěli dokázat.

Nechť nyní je pro  $M = \{1, 2, \dots, n+1\}$   $M = M_1 \cup M_2 \cup \dots \cup M_r$  rozklad množiny  $M$ , který odpovídá rozkladu množiny vrcholů simplexu  $\Sigma$  v systémy transitivitu. Z druhé pomocné věty ihned plyne, že každý vlastní význačný bod  $Y$  má barycentrické souřadnice  $y_i$  tvaru

$$y_i = c_\lambda$$

pro  $i \in M_\lambda$ ,  $\lambda = 1, 2, \dots, r$ . To však znamená, že bod  $Y$  leží v lineárním prostoru  $A_\Sigma$ , o němž mluví věta 20, vytvořeném těžišti systémů transitivní vrcholů. Tato těžiště mají totiž podle poznámky za větou 18 tvar (v barycentrických souřadnicích)  $\overset{\lambda}{T} = (\overset{\lambda}{t}_i)$ , kde  $\overset{\lambda}{t}_i = 1$  pro  $i \in M_\lambda$ ,  $\overset{\lambda}{t}_i = 0$  pro  $i \notin M_\lambda$ . Tedy  $A \subset A_\Sigma$ .

Obráceně, skupina vrcholů, které patří jednomu systému transitivní, je invariantní při všech automorfismech simplexu. Je tedy také těžiště vrcholů každého systému transitivní invariantní množina při všech automorfismech simplexu  $\Sigma$ , t. j. toto těžiště je význačný bod  $\Sigma$ . Odtud plyne, že  $A_\Sigma \subset A$  a věta je dokázána.<sup>2)</sup>

Všimněme si teď nevlastních význačných bodů. Jsou-li  $P, Q$  dva různé vlastní význačné body simplexu, je nevlastní bod přímky  $PQ$  (jakožto průnik význačné přímky  $PQ$  a význačné nevlastní nadroviny rovněž význačným bodem simplexu). Jsou tedy všechny nevlastní body lineárního prostoru  $A$  (přesněji  $\bar{A}$ ) význačné body. Není však pravda, že vlastní i nevlastní body dohromady tvoří (uzavřený) lineární prostor. Tak pro  $n = 1$  má každý simplex (dvojice různých bodů) jen jeden vlastní význačný bod (střed čili těžiště) a jeden nevlastní. Obdobně to může nastat i pro  $n > 1$ .<sup>3)</sup>

Platí však tato věta:

**Věta 21.** *Nevlastní význačné body simplexu tvoří sjednocení  $N_1 \cup N_2 \cup \dots \cup N_k$  po dvou ortogonálních nevlastních lineárních prostorů  $N_i$ . Má-li  $A$  kladnou dimenzi, je nevlastní lineární prostor prostoru  $A$  jedním z uvedených prostorů  $N_i$ .*

Důkaz. Dokážeme nejprve dvě pomocné věty:

I. *Jsou-li  $P, Q$  dva různé význačné nevlastní body simplexu, pak buď  $P$  a  $Q$  jsou ortogonální, nebo každý bod přímky  $PQ$  je význačný.*

Nejsou-li totiž  $P$  a  $Q$  ortogonální, pak bod  $P'$  přímky  $PQ$ , který je ortogonální k  $P$ , je rovněž význačný bod, který je různý od  $P$  i  $Q$ . Ke každému reálnému číslu  $\lambda$ ,  $\lambda \neq 0$ ,  $\lambda \neq 1$ , lze přiřadit právě jeden bod  $X$  přímky  $PQ$ , pro který je dvojpoměr  $(P, Q, P', X) = \lambda$ , a takto dostaneme všechny body přímky  $PQ$ , různé od  $P, Q, P'$ . Jsou tedy všechny body přímky  $PQ$  význačné.

<sup>2)</sup> Na platnost věty 19 a odtud vyplývající vztah  $A_\Sigma \subset A$  mne laskavě upozornil prof. VL. KNICHAL.

<sup>3)</sup> Plyne to na př. z této konstrukce:

Nechť  $n > 1$ . V  $E_n$  zvolme libovolný podprostor  $E_1$  dimenze 1 a další, s  $E_1$  disjunktní podprostor  $E_{n-2}$ , pro  $n > 2$  kolmý k  $E_1$ . V  $E_{n-2}$  sestrojme simplex  $O_1, \dots, O_{n-1}$  tak, aby všechny jeho (nenulové) hrany měly délky navzájem různé (takový simplex skutečně existuje, neboť tím požadujeme pouze platnost nerovností  $\neq$ , lineárních v  $e_{ij}$ ). Označme  $P$  průsečík nadroviny  $\nu$ , vedené prostorem  $E_{n-2}$  kolmo k  $E_1$ , s přímkou  $E_1$ . V  $E_1$  teď zvolme body  $O_n$  a  $O_{n+1}$  tak, aby byly souměrně sdružené vzhledem k  $P$  a aby vzdálenost  $O_n$  a  $O_{n+1}$  byla různá od všech vzdáleností  $O_i O_j$ ,  $i, j = 1, \dots, n-1$ , i od všech vzdáleností  $O_i O_n$ ,  $O_i O_{n+1}$ . To lze, volíme-li  $O_n O_{n+1}$  dost malé. Tím dostáváme simplex  $O_1, \dots, O_{n+1}$ , jehož grupa automorfismů má jen dva prvky, z nichž jeden odpovídá identitě a druhý symetrii podle  $\nu$ . Každý vlastní význačný bod leží tedy v  $\nu$ , avšak nevlastní bod přímky  $E_1$  je rovněž význačným bodem, který neleží v  $\nu$ .

II. Zavedeme-li relaci mezi význačnými nevlastními body  $P \sim Q$ , jestliže je buď  $P = Q$ , anebo  $P \neq Q$  a celá přímka  $PQ$  je přímka význačných bodů, pak tato relace je ekvivalence.

Reflexivnost a symetrie uvedené relace je evidentní. Nechť nyní  $P \sim Q$ ,  $Q \sim R$ , a při tom  $P \neq Q$ ,  $Q \neq R$  (jinak je zřejmě  $P \sim R$ ). Jsou tedy všechny body přímek  $PQ$  a  $QR$  význačné. Leží-li body  $P, Q, R$  v přímce, je skutečně  $P \sim R$ . Nechť tedy neleží v přímce. Zvolme nějaký bod  $P_1$  přímky  $PQ$ , různý od  $P$  i  $Q$ , a bod  $R_1$  přímky  $QR$ , různý od  $Q$  i  $R$  ( $P_1$  i  $R_1$  jsou tedy význačné body). Můžeme teď v rovině určit jednoznačně soustavu projektivních souřadnic tím, že zvolíme body  $P, Q, R$  za vrcholy soustavy souřadnic a průsečík přímek  $P_1R$  a  $PR_1$  za jednotkový bod soustavy. Každé třídě homogenních nenulových trojčíslic pak odpovídá nějaký bod roviny  $PQR$ , a dostaneme tím všechny body této roviny. Je proto každý bod roviny  $PQR$  význačný, a tedy i každý bod přímky  $PR$ ,  $P \sim R$ .

Z II. pomocné věty plyne, že třídy nevlastních bodů podle uvedené ekvivalence tvoří lineární prostory. Z I. pomocné věty plyne, že dva takové různé lineární prostory jsou navzájem ortogonální. K důkazu věty 21 zbývá dokázat, že existuje-li neprázdný nevlastní útvar  $\bar{N}$  lineárního prostoru  $\Lambda$  vlastních význačných bodů, pak  $\bar{N}$  je jedním z uvedených lineárních prostorů. Kdyby totiž pro dvojici různých význačných nevlastních bodů  $P, Q$  platilo, že  $P \in \bar{N}$ ,  $Q \notin \bar{N}$ ,  $P \sim Q$ , pak by na přímce  $PQ$  existoval bod  $R \neq P$ , který by byl význačný, ale nebyl by kolmý k  $P$ . Je-li  $T$  těžiště simplexu,  $S$  bod přímky  $TP$ , různý od  $T$  i  $P$ , pak  $S \in \Lambda$  je význačný bod a pata kolmice spuštěné z bodu  $S$  k přímce  $TR$  je vlastní bod  $S'$ , který neleží v  $\Lambda$ , avšak je význačný. Tím jsme dostali spor.

Poznámka. Podobnou metodou jako v důkazu druhé pomocné věty při důkazu věty 20 lze ukázat: Jsou-li vrcholy  $O_j$  a  $O_k$  ve stejném systému transitivity a je-li  $y = (y_1, \dots, y_{n+1})$  význačný nevlastní bod, pak platí  $y_j = \pm y_k$ .

Pomocí nevlastních význačných bodů můžeme snadno popsat množinu význačných vlastních přímek.

**Věta 22.** Množina význačných vlastních přímek simplexu je tvořena jednak množinou všech vlastních přímek prostoru  $\Lambda$  význačných bodů, jednak přímkami  $PQ$ , kde bod  $P$  probíhá  $\Lambda$  a bod  $Q$  probíhá ty nevlastní lineární prostory význačných bodů z věty 21, které jsou různé od nevlastního prostoru  $\bar{N}$  prostoru  $\Lambda$ .

Důkaz. Že každá přímka uvedených vlastností je význačná vlastní přímka, je zřejmé.

Nechť tedy obráceně je  $p$  význačná vlastní přímka. Je-li  $p \in \Lambda$ , věta platí. Předpokládejme tedy, že  $p \notin \Lambda$ . Pata kolmice z těžiště  $T$  simplexu na  $p$  je zřejmě vlastní význačný bod simplexu; označíme-li jej  $P$ , je  $P \in \Lambda$ . Nevlastní bod  $Q$  přímky  $p$  je význačný nevlastní bod, který neleží v  $\bar{\Lambda}$ . Tím je důkaz proveden.



Poznámka. Obdobně lze popsat množinu všech vlastních význačných lineárních prostorů dimenze  $k$ ,  $0 < k < n$  pomocí bodů z  $\Delta$  a nevlastních význačných lineárních prostorů dimenze  $k - 1$ .

**7. Speciální význačné množiny simplexu.** Ve větě 19 jsme si ukázali, že těžiště simplexu je význačný bod. V tomto odstavci najdeme jiné význačné množiny simplexu a uvedeme jejich vlastnosti.

**Věta 23.** *Ke každému simplexu v  $E_n$  existuje právě jedna  $(n - 1)$ -koule,<sup>4</sup> která prochází všemi jeho vrcholy (opsaná  $(n - 1)$ -koule). Její rovnice v barycentrických souřadnicích je*

$$\sum_{i,j=1}^{n+1} e_{ij}x_i x_j = 0, \quad (7,1)$$

její střed je bod  $S = (g_{01}, g_{02}, \dots, g_{0,n+1})$ <sup>5</sup> a poloměr  $r = \sqrt{-\frac{g_{00}}{2\Delta}}$ . Neobsahuje žádný vnitřní bod simplexu.

Důkaz. Věta plyne ihned z věty 14 a z faktu, že číslo  $\sqrt{-\frac{g_{00}}{2\Delta}}$  je kladné jakožto čtverec vzdálenosti bodů  $S$  a  $O_j$ . Závěr vyplývá ze (7,1) a z  $e_{ii} = 0$ ,  $e_{ij} > 0$  pro  $i \neq j$ .

Poznámka I. Z nezávislosti bodu  $S$  na permutacích vrcholů a na isometrických transformacích plyne, že  $S$  je význačný bod (snadno to také plyne z věty 18).

Poznámka II. Můžeme teď pomocí množiny všech význačných bodů simplexu a opsané  $(n - 1)$ -koule popsat množinu všech význačných nadrovin simplexu. Nadrovina  $\pi$  je totiž význačná tehdy a jen tehdy, je-li její pól vzhledem k opsané  $(n - 1)$ -kouli význačný (vlastní nebo nevlastní) bod. Podobně to lze učinit pro každou význačnou regulární kvadriku simplexu.

**Věta 24.** *Nechť  $m$  je přirozené číslo,  $m \leq n - 1$ . Existuje jediná kvadrika, která se dotýká každé  $m$ -dimensionální stěny simplexu v  $E_n$  v těžišti této stěny.<sup>6</sup> V barycentrických souřadnicích je její rovnice*

$$(m + 1) \sum_{i=1}^{n+1} x_i^2 - \left( \sum_{i=1}^{n+1} x_i \right)^2 = 0, \quad (7,2)$$

její střed je v těžišti simplexu.

Důkaz. Předpokládejme, že taková kvadrika existuje; nechť má v barycentrických souřadnicích rovnici  $\sum_{i,j=1}^{n+1} a_{ij}x_i x_j = 0$ . Snadno se zjistí, že vlastnost této kvadriky, že se dotýká každé  $m$ -dimensionální stěny simplexu v jejím

<sup>4</sup>) Viz odst. 5.

<sup>5</sup>) Čísla  $g_{00}$ ,  $g_{0i}$ ,  $\Delta$  jsou zavedena v odst. 2 první části.

<sup>6</sup>) Těžištěm stěny  $O_{k1}$ ,  $O_{k2}$ ,  $\dots$ ,  $O_{k,m+1}$  rozumíme těžiště těchto vrcholů.

těžišti, je ekvivalentní s tím, že pro každou takovou podmnožinu  $M_{m+1}$  množiny  $M = \{1, 2, \dots, n+1\}$ , která má  $m+1$  prvků, a pro každé  $i \in M_{m+1}$  platí

$$\sum_{k \in M_{m+1}} a_{ik} = 0.$$

Protože je  $1 \leq m \leq n-1$ , plyne odtud snadno, že pro  $i \neq j$  je  $a_{ij} = a$ ,  $a_{ii} = -ma$ ,  $a \neq 0$ . To však ihned dává (7,2). Že těžiště simplexu je středem kvadriky (7,2), plyne z faktu, že polární nadrovinou těžiště vzhledem ke kvadrice (7,2) je nevlastní nadrovina.

**Poznámka.** Kvadriky (7,2) pro  $m = 1, 2, \dots, n-1$  jsou navzájem homotetické a homotetické i s kvadrikou téhož tvaru pro  $m = 0$ . Tato kvadrika prochází všemi vrcholy simplexu a nazývá se *Steinerova opsaná kvadrika* (nebo Steinerův opsaný elipsoid, neboť všechny kvadriky (7,2) pro  $m = 0, \dots, n-1$  jsou eliptického typu), kvadriky (7,2) pro  $m > 0$  Steinerovy vepsané kvadriky (elipsoidy). Množině kvadrik tvaru (7,2) pro  $m > -1$  budeme říkat *Steinerův systém kvadrik*.

**Věta 25.** *V simplexu existuje jediný bod  $L$  té vlastnosti, že součet čtverců jeho vzdáleností od  $(n-1)$ -rozměrných stěn je minimální. V barycentrických souřadnicích je  $L = (g_{11}, g_{22}, \dots, g_{n+1, n+1})$ ; nazývá se *Lemoinův bod simplexu*. Je vždy vnitřním bodem simplexu.*

**Důkaz.** Necht  $P = (p_1, p_2, \dots, p_{n+1})$  je vlastní bod. Pak součet čtverců jeho vzdáleností od stěn  $\omega_i \equiv x_i = 0$  je podle (3,12)

$$\sum_{i=1}^{n+1} \rho^2(P, \omega_i) = -\frac{\Delta}{2(\sum_i p_i)^2} \sum_{i=1}^{n+1} \frac{p_i^2}{g_{ii}} = -\frac{\Delta}{2\sum_i g_{ii}} + \left(-\frac{\Delta}{2\sum_i g_{ii}}\right) \frac{\sum_i g_{ii} \sum_i \frac{p_i^2}{g_{ii}} - (\sum_i p_i)^2}{(\sum_i p_i)^2},$$

První sčítanec je však součet čtverců vzdáleností pro Lemoinův bod. Druhý je [podle nerovnosti  $(\sum_i a_i b_i)^2 \leq \sum_i a_i^2 \sum_i b_i^2$  pro  $a_i = \sqrt{|g_{ii}|}$ ,  $b_i = \frac{p_i}{\sqrt{|g_{ii}|}}$ , neboť  $g_{ii}$  jsou nenulová čísla téhož znamení  $(-1)^n$  podle (4,3) a (4,5)] stále nezáporný, dokonce kladný pro  $P \neq L$ . Odtud plyne věta. Že  $L$  je vnitřní bod, plyne ze (4,3) a (4,1).

**Poznámka.** Obdobně lze dokázat známou větu, že těžiště simplexu je bod, pro který je součet čtverců jeho vzdáleností od vrcholů minimální.

**Věta 26.** *Pro každý simplex v  $E_n$  existuje právě jeden vnitřní bod  $V$ , který má od všech  $(n-1)$ -rozměrných stěn simplexu stejnou vzdálenost; je to střed vepsané  $(n-1)$ -koule, t. j.  $(n-1)$ -koule, která se dotýká  $(n-1)$ -rozměrných stěn simplexu a obsahuje (kromě dotykových bodů) jen vnitřní body simplexu. V barycentrických souřadnicích je  $V = (v_1, \dots, v_{n+1})$ ,  $v_i = \sqrt{|g_{ii}|}$ , rovnice vepsané  $(n-1)$ -koule je*

$$(\sum_i v_i)^2 (exx) - 2\sum_i v_i (evx) \sum_i x_i + [(evv) + |\Delta|] (\sum_i x_i)^2 = 0, \quad (7,3)$$

její poloměr

$$\rho = \frac{\sqrt{\frac{1}{2}|\Delta|}}{\sum_i v_i}. \quad (7,4)$$

Důkaz plyne snadno z (3,11).

Poznámka. Obdobně se zjistí, že celkem existuje pro simplex v  $E_n$  nejvýše  $2^n$  bodů, které mají od všech  $(n - 1)$ -rozměrných stěn stejnou vzdálenost. Jsou to (při vyjádření v barycentrických souřadnicích a při  $v_i = \sqrt{|g_{ii}|}$ ) ty body

$$V_{(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{n+1})} = (\varepsilon_1 v_1, \varepsilon_2 v_2, \dots, \varepsilon_{n+1} v_{n+1}), \quad \varepsilon_i = \pm 1,$$

které jsou vlastní (t. j. pro něž  $\sum_i \varepsilon_i v_i \neq 0$ ). Pro  $V_{(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{n+1})} \neq V$  to jsou středy t. zv. připsaných (vně vepsaných)  $(n - 1)$ -koulí.

V následující větě zobecníme pro simplex definici isogonálně sdružených bodů a ve větách 28 a 29 dokážeme zobecnění jejich vlastností, známých z geometrie trojúhelníka.

**Věta 27.**<sup>7)</sup> *Nechť bod  $P$  neleží na žádné  $(n - 1)$ -rozměrné stěně simplexu. Pak existuje právě jeden bod  $Q$ , který má tuto vlastnost:*

*Jsou-li  $\omega, \omega'$  libovolné různé  $(n - 1)$ -rozměrné stěny simplexu, pak nadroviny  $\nu_P$  resp.  $\nu_Q$  ze svazku nadrovin určeného  $\omega, \omega'$ , procházející body  $P$  resp.  $Q$ , jsou sdružené v involuci ve svazku  $(\omega, \omega')$ , která má jako samodružné nadroviny půlicí úhel nadrovin  $\omega, \omega'$ .*

*Jsou tedy úhly nadrovin  $\nu_P, \omega$  a  $\nu_Q, \omega'$  stejné. Je-li v barycentrických souřadnicích  $P = (p_1, p_2, \dots, p_{n+1}), Q = (q_1, q_2, \dots, q_{n+1})$ , platí pro  $\rho \neq 0$*

$$\rho p_i q_i = g_{ii}. \quad (7,5)$$

*Body  $P, Q$  se nazývají isogonálně sdružené.*

Důkaz. Budiž dán bod  $P = (p_1, \dots, p_{n+1}), p_i \neq 0$  pro  $i = 1, \dots, n + 1$ , a předpokládejme, že existuje takový bod  $Q = (q_1, \dots, q_{n+1})$ , že vyhovuje první části věty. Existuje index  $i$  tak, že  $q_i \neq 0$ ; nechť  $j \neq i$ . Pro stěny  $\omega \equiv x_i = 0, \omega' \equiv x_j = 0$  je  $\nu_P \equiv p_j x_i - p_i x_j = 0, \nu_Q \equiv q_j x_i - q_i x_j = 0$ . Snadno se zjistí, že obě nadroviny, půlicí úhel nadrovin  $\omega, \omega'$ , jsou tvaru  $x_i \sqrt{|g_{jj}|} \pm x_j \sqrt{|g_{ii}|} = 0$ . Poněvadž  $\nu_P$  a  $\nu_Q$  patří do involuce uvedené ve větě, je

$$(p_j x_i - p_i x_j)(q_j x_i - q_i x_j) \equiv \alpha(x_i \sqrt{|g_{jj}|} + x_j \sqrt{|g_{ii}|})^2 + \beta(x_i \sqrt{|g_{ii}|} - x_j \sqrt{|g_{ii}|})^2.$$

Odtud  $p_j q_i = (\alpha + \beta)|g_{ii}|, p_i q_j = (\alpha - \beta)|g_{jj}|$ ; protože  $p_i q_i \neq 0$ , je  $\alpha + \beta \neq 0$  a pro  $\rho = \frac{(-1)^n}{\alpha + \beta}$  (vzhledem k (4,3) a (4,5)) platí (7,5) pro indexy  $i$  a  $j$ . Avšak  $j$  byl libovolný index různý od  $i$ , platí tedy (7,5) pro  $i = 1, \dots, n + 1$ . Obráceně lze snadno zjistit, že bod  $Q$  definovaný (7,5) skutečně vyhovuje podmínce věty.

<sup>7)</sup> Ve větách 27—30 předpokládáme, že  $n > 1$ .

**Poznámka.** Z (7,5) vyplývá, že bod je sám k sobě isogonálně sdružen tehdy a jen tehdy, je-li některým z bodů  $V_{(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{n+1})}$  z předchozí poznámky, t. j., je-li středem vepsané nebo připsané  $(n - 1)$ -koule (případně směrem; ve větách 27 a 28 nerozlišujeme vlastní a nevlastní body). Je také zřejmé z (4,1) a (7,5), že isogonálně sdružené body leží ve stejných poloprostorech vyřezaných vždy jednou  $(n - 1)$ -rozměrnou stěnou. Speciálně jsou oba nebo žádný vnitřním bodem simplexu.

**Věta 28.** *Isogonálně sdružené body (pokud alespoň jeden z nich je vlastní) jsou vždy dvojicí (příp. splývající) ohnisek rotačních kvadrik, dotýkajících se všech  $(n - 1)$ -rozměrných stěn simplexu.<sup>8)</sup>*

Důkaz je založen na této větě, kterou zde nebudeme dokazovat:

Rotační kvadrika (v nadrovinových barycentrických souřadnicích, duálních k bodovým) s ohnisky  $P = (p_1, p_2, \dots, p_{n+1})$ ,  $Q = (q_1, q_2, \dots, q_{n+1})$  má tvar

$$\sum_{i,j=1}^{n+1} g_{ij} \xi_i \xi_j - \varrho \sum_{i=1}^{n+1} p_i \xi_i \sum_{i=1}^{n+1} q_i \xi_i = 0$$

a obráceně, každá rovnice tohoto tvaru s  $\varrho \neq 0$  a  $\sum_{i=1}^{n+1} p_i \neq 0$  nebo  $\sum_{i=1}^{n+1} q_i \neq 0$  je rovnicí rotační kvadriky s ohnisky  $P, Q$ .

Je tedy nutná a postačující podmínka, aby kvadrika  $\sum_{i,j=1}^{n+1} \alpha_{ij} \xi_i \xi_j = 0$  byla rotační s reálnými ohnisky  $P = (p_i)$ ,  $Q = (q_i)$  a aby se při tom dotýkala všech  $(n - 1)$ -rozměrných stěn, aby

$$\begin{aligned} \alpha_{ii} &= g_{ii} - \varrho p_i q_i = 0, \quad i = 1, \dots, n + 1, \\ 2\alpha_{ij} &= 2g_{ij} - \varrho(p_i q_j + p_j q_i) \text{ pro } i \neq j. \end{aligned}$$

Odtud a z (7,5) plyne věta 28.

**Věta 29.** *Nechť  $P$  je vlastní bod, který neleží na žádné  $(n - 1)$ -rozměrné stěně simplexu. Označme  $R^i$ ,  $i = 1, \dots, n + 1$ , body, souměrně sdružené s bodem  $P$  vzhledem ke stěnám simplexu  $\omega_i \equiv x_i = 0$ . Jestliže body  $R^i$  leží v nadrovině, pak už neleží v lineárním prostoru menší dimenze a směr kolmý k této nadrovině je isogonálně sdružený (nevlastní) bod s bodem  $P$ . Jestliže body  $R^i$  neleží v nadrovině, pak střed  $(n - 1)$ -koule opsané simplexu  $R^1, \dots, R^{n+1}$  je isogonálně sdružený bod s bodem  $P$  (vzhledem k původnímu simplexu).*

Důkaz. Lehko se zjistí, že body  $R^i$  mají v barycentrických souřadnicích tvar

$$R^i = (g_{ii} p_1 - 2g_{i1} p_i, g_{ii} p_2 - 2g_{i2} p_i, \dots, g_{ii} p_{n+1} - 2g_{i,n+1} p_i),$$

<sup>8)</sup> Rotační kvadrika je kvadrika, k níž existuje vlastní přímka tak, že každá nadrovina k této přímce kolmá protíná kvadriku v  $(n - 2)$ -sféře se středem na této přímce. Ohniska jsou body, z nichž tečný kužel obsahuje absolutní kvadriku.

kde

$$P = (p_1, p_2, \dots, p_{n+1}), \quad p_i \neq 0 \quad (i = 1, \dots, n+1), \quad \sum_{i=1}^{n+1} p_i \neq 0.$$

Předpokládejme nejprve, že body  $\overset{i}{R}$  leží v nějaké nadrovině  $\nu \equiv \sum_{i=1}^{n+1} \gamma_i x_i = 0$ . Potom platí pro  $k = 1, 2, \dots, n+1$ :

$$g_{kk} \sum_{i=1}^{n+1} \gamma_i p_i - 2p_k \sum_{i=1}^{n+1} g_{ik} \gamma_i = 0,$$

čili

$$\sum_{i=1}^{n+1} g_{ik} \gamma_i = \frac{g_{kk}}{2p_k} \sum_{i=1}^{n+1} \gamma_i p_i. \quad (7,6)$$

Nadrovina  $\nu$  je vlastní, t. j. levé strany rovnic (7,6) nejsou vesměs rovny nule. Tedy  $\sum_{i=1}^{n+1} \gamma_i p_i \neq 0$  a podle (3,4) a (7,5) je isogonálně sdružený bod  $Q$  s bodem  $P$  nevlastní bod v kolmém směru k nadrovině  $\nu$ . Odtud rovněž plyne, že taková nadrovina  $\nu$  procházející všemi body  $\overset{i}{R}$  je jediná.

Nechť nyní body  $\overset{i}{R}$  neleží v žádné nadrovině; potom bod  $Q$ , isogonálně sdružený s  $P$ , je vlastní: kdyby byl nevlastní, pak by řádky matice  $\|g_{ii} p_j - 2g_{ij} p_i\|$  souřadnic bodů  $\overset{i}{R}$  byly lineárně závislé (po násobení  $i$ -tého řádku  $\frac{1}{p_i}$  a sečtení, podle (2,15 d)), a tedy by byly lineárně závislé i sloupce ve sporu s tím, že body  $\overset{i}{R}$  neleží v nadrovině. Příným výpočtem podle vzorce (2,9) za použití (2,15) se zjistí, že vzdálenosti bodu  $Q$  od bodů  $\overset{i}{R}$  jsou si navzájem rovny, t. j. bod  $Q$  je středem  $(n-1)$ -koule opsané simplexu  $\overset{1}{R}, \dots, \overset{n+1}{R}$ .

Z vět 19, 25 a 27 plyne ihned věta:

**Věta 30.** *Těžiště a Lemoinův bod simplexu jsou body isogonálně sdružené.*

Závěrem této části bych podotkl, že pomocí věty 18 můžeme tvořit libovolně mnoho význačných bodů simplexu, na př. bod

$$C_1 = (c_1, c_2, \dots, c_{n+1}), \quad \text{kde } c_i = \sum_j e_{ij}, \quad C_2 = (c_1^2, c_2^2, \dots, c_{n+1}^2) \text{ atp.}$$

Některé takové body jsou (obecně) lineárně nezávislé, některé jsou vždy lineárně závislé, na př. bod  $C_2$  a body  $D = (d_1, \dots, d_{n+1})$ ,  $D' = (d'_1, \dots, d'_{n+1})$ , kde  $d_i = \sum_j e_{ij}^2$ ,  $d'_i = \sum_{\substack{k,l \\ k \neq l}} e_{ik} e_{il}$ , leží vždy v přímce (nebo dokonce splývají).

Lze dále definovat algebraické význačné body simplexu tak, že to jsou body o barycentrických souřadnicích  $\sigma_i(e_{kl})$ , kde  $\sigma_i(\xi_{kl})$  jsou homogenní polynomy v  $\xi_{kl}$  s celými koeficienty, vyhovující podmínce ve větě 17. Tak na př. těžiště,

Lemoinův bod, střed opsané  $(n - 1)$ -koule, body  $C_1, C_2, D, D'$  z předchozího odstavce a všechny body, které z nich vzniknou isogonální transformací, jsou body, které mají za  $\sigma_i(\xi_{ki})$  homogenní polynomy s celými koeficienty. Tuto problematiku zde již nebudeme rozšiřovat. Je zajímavější studovat speciální simplexu, což učiníme ve třetí části.

## Резюме

### ГЕОМЕТРИЯ СИМПЛЕКСА В $E_n$ II

МИРОСЛАВ ФИДЛЕР, (Miroslav Fiedler), Прага.

(Поступило в редакцию 20/XI 1954 г.)

В настоящей второй части работы, первая часть которой была опубликована в журнале *Časopis pro pěstování matematiky* 79 (1954), 297—320, прежде всего дается для  $m \geq 0$  целого определение понятия допустимого отображения  $m$ -го порядка в евклидовом  $n$ -мерном пространстве  $E_n$ . Это такое отображение  $\varphi$ , которое всякой упорядоченной системе  $m + 1$  точек  $A_1, A_2, \dots, A_{m+1}$  из  $E_n$  ставит в соответствие некоторое множество  $\varphi(A_1, A_2, \dots, A_{m+1})$  из  $\bar{E}_n$  (т. е. из  $E_n$ , пополненного несобственными точками) так, что если  $T$  есть изометрическое отображение  $\bar{E}_n$ , то

$$\varphi(TA_1, TA_2, \dots, TA_{m+1}) = T\varphi(A_1, A_2, \dots, A_{m+1}).$$

Если, далее,  $\Sigma$  — фиксированная система  $m + 1$  точек  $A_1, A_2, \dots, A_{m+1}$  из  $E_n$ , то множество точек  $M \subset \bar{E}_n$  называется избранным множеством от  $\Sigma$ , если существует допустимое отображение  $\varphi$   $m$ -го порядка так, что

$$M = \varphi(A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_{m+1}})$$

для любой перестановки  $i_1, \dots, i_{m+1}$  индексов  $1, \dots, m + 1$ . Под избранным множеством симплекса мы понимаем избранное множество его вершин.

В работе далее изучается множество всех собственных избранных точек (т. е. избранных одноточечных множеств) симплекса в  $E_n$  и доказывается, что оно образует линейное пространство  $L$  образованное следующим образом:

Группа автоморфизмов симплекса  $\Sigma$  (т. е. группа тех изометрических отображений в  $E_n$ , при которых множество вершин  $O_1, \dots, O_{n+1}$  симплекса остается без изменения) изоморфна некоторой группе перестановок индексов  $1, \dots, n + 1$ , так как каждое отображение  $T$  взаимно однозначно соответствует перестановке  $i_1, \dots, i_{n+1}$  такой, что  $TO_k = O_{i_k}$ . Обозначим через  $T_\lambda$  центр тяжести множества тех вершин от  $\Sigma$ , которые отмечены индексами одной системы транзитивности  $S_\lambda$  упомянутой группы перестано-

вок. Тогда  $A$  будет линейным пространством, образованным всеми  $T_\lambda$  для всех систем транзитивности  $S_\lambda$ .

В последующих теоремах изучается множество несобственных избранных точек, собственных избранных прямых и избранных гиперплоскостей. Для полноты и в целях использования в третьей части приводятся некоторые избранные точки и избранные множества, являющиеся обобщением некоторых избранных (замечательных) точек треугольника, и обсуждаются их свойства. В заключение исследуется изогональное средство в симплексе и доказывается, между прочим, что изогонально сопряженные точки являются фокусами гиперквадрик вращения, касающихся всех  $(n - 1)$ -мерных граней симплекса.

### Summary

#### GEOMETRY OF THE SIMPLEX IN $E_n$ (2nd part)

MIROSLAV FIEDLER, Prague.

(Received November 20, 1954.)

In the present paper (first part is published in *Časopis pro pěstování matematiky* 79 (1954), 297—320) we begin with the definition of an admissible mapping in the Euclidean  $n$ -space  $E_n$ . We say that  $\varphi$  is an admissible mapping of degree  $m$  ( $m \geq 0$  an integer) in  $E_n$  if for every ordered set of  $m + 1$  points  $A_1, \dots, A_{m+1} \in E_n$   $\varphi(A_1, \dots, A_{m+1})$  is a subset of  $\bar{E}_n$  (i. e.  $E_n$  completed with improper points) such that, for every isometric mapping  $T$  of  $\bar{E}_n$ ,

$$\varphi(TA_1, \dots, TA_{m+1}) = T\varphi(A_1, \dots, A_{m+1}).$$

Let  $\Sigma$  be a set of fixed points  $A_1, \dots, A_{m+1} \in E_n$ . We say that a set  $M \subset \bar{E}_n$  is a distinguished set of  $\Sigma$  if there exists an admissible mapping  $\varphi$  of degree  $m$  such that

$$M = \varphi(A_{i_1}, \dots, A_{i_{m+1}})$$

for every permutation  $i_1, \dots, i_{m+1}$  of  $1, \dots, m + 1$ . A set is a distinguished set of a simplex in  $E_n$  if it is a distinguished set of its  $n + 1$  vertices.

Theorems 16—20 show that the set of all proper distinguished points (i. e. distinguished one-point-sets) of the simplex is a linear space  $A$  formed the following way:

The group of all automorphisms of the simplex (i. e. the group of all isometric transforms in  $E_n$  preserving the set of all vertices  $O_1, \dots, O_{n+1}$  of the simplex) is isomorphic to a permutation group of indices  $1, \dots, n + 1$ , since for every such transform  $T$  there exists exactly one permutation  $i_1, \dots, i_{n+1}$  such that  $TO_k = O_{i_k}$ . Let us call transitivity systems of the vertices the sets  $S_\lambda$  of those ver-

tices of the simplex whose indices belong to one of the transitivity systems of the permutation group. Then  $\mathcal{A}$  is the linear space generated by all the centres of gravity  $T_\lambda$  of the transitivity systems  $\mathcal{S}_\lambda$  (theorem 20).

In the following theorems the sets of all improper distinguished points, proper distinguished lines, and distinguished hyperplanes are studied. For the sake of completeness and for the use in the third part some special distinguished points and distinguished sets are mentioned.

Finally the isogonal relationship in the simplex is studied. In theorem 28 is proved that isogonally associated points are foci of hyperquadrics of rotation touching all the faces of the simplex.