

Alois Švec

K výkladu teorie prostorů s konexí

Časopis pro pěstování matematiky, Vol. 86 (1961), No. 4, 425--432

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/117391>

## Terms of use:

© Institute of Mathematics AS CR, 1961

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

## K VÝKLADU TEORIE PROSTORŮ S KONEXÍ

ALOIS ŠVEC, Praha  
(Došlo 16. června 1960)

V práci je ukázáno, že studium variet v prostoru s konexí je ekvivalentní s jistou částí studia variet v odpovídajícím rovném prostoru.

1. Všechny následující úvahy je možno provést pro prostor s libovolnou konexí, abychom však měli konkrétní příklad, budeme pracovat s prostorem s afinní konexí; čtenář si výsledky snadno přetransformuje na případ projektivní, euklidovské nebo jiné konexe.

Definujme nejprve celkem obvyklým způsobem *n-rozměrný prostor s afinní konexí*  $\mathcal{A}_n$ : Buď dána *n-rozměrná* oblast  $\Omega_n$  parametrů  $(\xi) \equiv (\xi^\alpha) \equiv (\xi^1, \dots, \xi^n)$ , každému bodu  $(\xi) \in \Omega_n$  buď přiřazen lokální centroafinní prostor  $A_n(\xi)$  s centrem  $M(\xi)$ , jež mohu přímo ztotožnit s bodem  $(\xi)$ ; v každém lokálním prostoru  $A_n(\xi)$  buď dále zvolena lokální base  $\{M(\xi); I_1(\xi), \dots, I_n(\xi)\}$ . Budiž dále dána soustava formálních rovnic

$$(2) \quad \nabla M = \omega^\alpha I_\alpha, \quad \nabla I_\alpha = \omega_\alpha^\beta I_\beta,$$

kde

$$\omega^\alpha = \Gamma_{\beta\gamma}^\alpha(\xi) d\xi^\beta, \quad \omega_\alpha^\beta = \Gamma_{\gamma\alpha}^\beta(\xi) d\xi^\gamma;$$

$\omega^\alpha, \omega_\alpha^\beta$  jsou libovolné Pfaffovy formy, splňující podmínku, že formy  $\omega^1, \dots, \omega^n$  jsou lineárně nezávislé čili

$$(3) \quad [\omega^1 \dots \omega^n] \neq 0.$$

Geometrie prostoru  $\mathcal{A}_n$  je dána soustavou afinít mezi jednotlivými lokálními prostory, přiřazených obloukům, spojujícím centra uvažovaných lokálních prostorů. Tyto afinity se konstruují na základě rovnic (2). Buď tedy dán oblouk  $\gamma$  parametrickými rovnicemi

$$(4) \quad \xi^\alpha = \xi^\alpha(t), \quad 1 \leq t \leq 2t$$

a necht' spojuje body  $({}^1\xi^\alpha) = (\xi^\alpha({}^1t))$  a  $({}^2\xi^\alpha) = (\xi^\alpha({}^2t))$ ; sestojím jistou afinitu  $\mathbf{A}_\gamma$  mezi lokálními prostory  $A_n({}^1\xi), A_n({}^2\xi)$ . Pomocí formálních rovnic (2) mohu sestavit soustavu obyčejných diferenciálních rovnic

$$(5) \quad \frac{dN}{dt} = \Gamma_{\gamma\alpha}^\alpha(\xi(t)) \frac{d\xi^\gamma}{dt} J_\alpha, \quad \frac{dJ_\alpha}{dt} = \Gamma_{\gamma\alpha}^\beta(\xi(t)) \frac{d\xi^\gamma}{dt} J_\beta$$

a hledat její řešení

$$(6) \quad N = N(t), \quad J_\alpha = J_\alpha(t)$$

v prostoru  $A_n({}^1\xi)$ , určené počátečními podmínkami

$$(7) \quad N({}^1t) = M({}^1\xi), \quad J_\alpha({}^1t) = I_\alpha({}^1\xi),$$

kde  $\{M({}^1\xi); I_1({}^1\xi), \dots, I_n({}^1\xi)\}$  je předem zvolená base lokálního prostoru  $A_n({}^1\xi)$ . Afinita  $\mathbf{A}^\gamma: A_n({}^1\xi) \rightarrow A_n({}^2\xi)$  přiřazuje potom bodu

$$X = N({}^2t) + x^\alpha J_\alpha({}^2t)$$

prostoru  $A_n({}^1\xi)$  bod

$$X' = M({}^2\xi) + x^\alpha I_\alpha({}^2\xi)$$

prostoru  $A_n({}^2\xi)$ .

Rozvinutím  $\gamma^*$  oblouku  $\gamma$  (4) do lokálního prostoru  $A_n({}^2\xi)$  rozumím pak oblouk  $\gamma^*$ , jenž vzniká takto: Označme  $\gamma_\tau$ ,  ${}^1t \leq \tau \leq {}^2t$ , část oblouku  $\gamma$  mezi body  $\xi(\tau)$  a  $\xi({}^2t)$ , tj. oblouk  $\xi^\alpha = \xi^\alpha(t)$ ,  $\tau \leq t \leq {}^2t$ ; oblouk  $\gamma^*$  je pak tvořen body  $\mathbf{A}_{\gamma_\tau} M(\xi(\tau))$ ,  ${}^1t \leq \tau \leq {}^2t$ , kde  $\mathbf{A}_{\gamma_\tau}: A_n(\xi(\tau)) \rightarrow A_n({}^2\xi)$  je afinita mezi lokálními prostory v koncových bodech oblouku  $\gamma_\tau$  a  $M(\xi(\tau))$  je centrum lokálního prostoru  $A_n(\xi(\tau))$ .

Vzhledem k lineární nezávislosti forem  $\omega^\alpha$  je každý diferenciál  $d\xi^\beta$  jejich lineární kombinací, takže jistě mohou psát

$$(8) \quad \begin{aligned} [d\omega^\alpha] &= [\omega^\beta \omega_\beta^\alpha] + S_{\beta\gamma}^\alpha [\omega^\beta \omega^\gamma], & S_{\beta\gamma}^\alpha + S_{\gamma\beta}^\alpha &= 0, \\ [d\omega_\beta^\alpha] &= [\omega_\beta^\gamma \omega_\gamma^\alpha] + R_{\gamma\delta\beta}^\alpha [\omega^\gamma \omega^\delta], & R_{\gamma\delta\beta}^\alpha + R_{\delta\gamma\beta}^\alpha &= 0. \end{aligned}$$

Soustava funkcí  $S_{\beta\gamma}^\alpha$  resp.  $R_{\beta\gamma\delta}^\alpha$  se ze známých důvodů nazývá tensorem torse resp. křivosti prostoru  $\mathcal{A}_n$ .

Základním předmětem studia lokální diferenciální geometrie prostoru  $\mathcal{A}_n$  je studium vlastností variet do tohoto prostoru vnořených resp. zjišťování existence variet předepsaných vlastností v daném prostoru  $\mathcal{A}_n$ . Je-li dána v  $\mathcal{A}_n$  varieta  $V_r$ , mohou v každém jejím bodě specialisovat lokální repery tak, že  $\{M; I_1, \dots, I_r\}$  je basí tečného prostoru variety, takže  $V_r$  je dána soustavou rovnic

$$(9) \quad \omega^{r+1} = \omega^{r+2} = \dots = \omega^n = 0.$$

Vyšetřování variety  $V_r$  se pak analyticky děje postupným vnějším diferencováním systému (9) a jeho prodlužováním. Účelem tohoto článku není však konkrétní studium některých geometrických objektů. Studium lokálních vlastností variety  $V_r$  v některém jejím bodě  $M(\xi)$  spočívá ve vyšetřování vlastností soustavy rozvinutí všech oblouků, ležících na  $V_r$  a procházejících bodem  $M(\xi)$ , do lokálního prostoru  $A_n(\xi)$ . To, že na varietě  $V_r$  mohou uvažovat jen jednoparametrické útvary a neustále mluvit o jejich rozvinutí do některého lokálního prostoru, činí vyjadřování poměrně těžkopádným a v jisté míře nám nedovoluje jasný a jednoduchý geometrický pohled na studovaný objekt. Podle mého soudu jsou tyto nedostatky hlavní příčinou současného

stavu, kdy naše znalosti o varietách, vnořených v prostory s konexí, jsou nesrovnatelně menší než o obdobných varietách, vnořených do rovného prostoru. Ve své práci [2] jsem se pokusil o geometrisaci studia variet v prostorech s konexí, která v podstatě vedla k získání nových vlastností např. ploch v trojrozměrných prostorech s projektivní konexí, vycházel jsem však z klasické definice a chápání prostoru s konexí, jak jsem je uvedl v předchozím. V dalším se pokusím ukázat, že studium variety v prostoru s konexí je možno vhodně interpretovat jako část studia variety v rovném prostoru.

2. Naším úkolem budiž tedy studium variety  $V_r$  v afinním prostoru  $A_n$ . Všimněme si nejprve podrobněji analytického aparátu, který nám umožní naši práci. V prostoru  $A_n$  nebo v jeho určité oblasti, která nás zajímá, buďtež zavedeny souřadnice — obecně křivočaré —  $(\xi) \equiv (\xi^1, \dots, \xi^n)$ , v každém bodě  $M$  prostoru  $A_n$  buď dále dána soustava basí  $\{M; I_1, \dots, I_n\}$ , jež závisí na bodě  $M$  a na dalších tzv. sekundárních neboli vedlejších parametrech  $t^1, \dots, t^q$ ; předpokládám-li, že všechny sekundární parametry jsou podstatné, je ovšem  $q \leq n^2$ , neboť obecný reper v bodě  $M \in A_n$  je udán  $n^2$  souřadnicemi svých  $n$  vektorů. Je tedy celkem

$$(10) \quad M = M(\xi) \equiv M(\xi^1, \dots, \xi^n), \quad I_\alpha = I_\alpha(\xi, t) \equiv I_\alpha(\xi^1, \dots, \xi^n; t^1, \dots, t^q)$$

a zřejmě dostávám rovnice

$$(11) \quad dM = \omega^\alpha I_\alpha, \quad dI_\alpha = \omega_\alpha^\beta I_\beta,$$

kde

$$\omega^\alpha = \Gamma_\beta^\alpha d\xi^\beta, \quad \omega_\beta^\alpha = \Gamma_{\gamma\alpha}^\beta d\xi^\gamma + \gamma_{\alpha a}^\beta dt^a; \quad a = 1, \dots, q;$$

vzhledem k tomu, že bod  $M$  probíhá  $n$ -rozměrnou oblast prostoru  $A_n$ , platí (3). Vnější diferencováním předchozích rovnic dostávám tzv. podmínky integrability ve tvaru

$$(12) \quad [d\omega^\alpha] = [\omega^\beta \omega_\beta^\alpha], \quad [d\omega_\beta^\alpha] = [\omega_\beta^\gamma \omega_\gamma^\alpha];$$

tyto rovnice označme souhrnně **I**. Mám-li nyní studovat varietu  $V_r$ , vnořenou v  $A_n$ , přiřadím každému jejímu bodu podsoustavu z uvažovaných basí, pro niž vektory  $I_1, \dots, I_r$  jsou tečné vektory variety  $V_r$ . Varieta  $V_r$  je pak dána soustavou rovnic (9), další studium variety je založeno na studiu této soustavy s užitím podmínek integrability **I**.

Nechť v prostoru  $A_n$  je dána určitá varieta  $V_r$ . Její vlastnosti mohou rozdělit do tří skupin na

- 1° vlastnosti, jež mohou odvodit z rovnic (9) bez užití podmínek integrability **I**;
- 2° vlastnosti, odvoditelné z rovnic (9) a **I**, jež však není možno odvodit pouze z (9);
- 3° speciální vlastnosti variety  $V_r$ , neodvoditelné z rovnic (9) a **I**.

Nyní budu říkat, že vlastnosti 1° jsou vlastnostmi variety  $V_r$ , vnořené v prostor s afinní konexí; vlastnosti 1° a 2° jsou vlastnostmi  $V_r$ , vnořené v afinní prostor. V průběhu dalšího se ukáže, že studium variety vnořené do prostoru s afinní konexí (jak

bylo uvedeno v první části) je založeno na témž analytickém aparátu jako hledání vlastností 1° variety v afinním prostoru.

Uvažujme tedy afinní prostor  $A_n$ , v každém jeho bodě buď dána soustava basí (jak bylo popsáno výše), takže platí rovnice (11); nepředpokládejme však platnost rovnic I nebo lépe řečeno zakažme jejich užívání. Základním lemmatem naší celé teorie v tomto případě bude pak tvrzení, že *vnější kvadratické formy*

$$(13) \quad \Omega^\alpha = [d\omega^\alpha] - [\omega^\beta \omega_\beta^\alpha], \quad \Omega_\beta^\alpha = [d\omega_\beta^\alpha] - [\omega_\beta^\gamma \omega_\gamma^\alpha]$$

jsou formami pouze v diferenciálech hlavních parametrů  $d\xi^1, \dots, d\xi^n$  čili jsou tvaru

$$(14) \quad \Omega^\alpha = S_{\beta\gamma}^\alpha [\omega^\beta \omega^\gamma], \quad \Omega_\beta^\alpha = R_{\gamma\delta\beta}^\alpha [\omega^\gamma \omega^\delta];$$

$S_{\beta\gamma}^\alpha, R_{\beta\gamma\delta}^\alpha$  jsou ovšem funkcemi v  $\xi^\alpha, t^\alpha$ .

Důkaz podává např. E. CARTAN v [1] celkem neuspokojivým způsobem užíváním nepřesných infinitesimálních úvah, o nichž se sám vyjadřuje značně kriticky. Zde podám důkaz, založený na přímém výpočtu. V každém bodě prostoru  $A_n$  nebo jeho uvažované oblasti buď zvolena určitá base  $\{M; I_1, \dots, I_n\}$ ,<sup>1)</sup> takže je  $M = M(\xi), I_{\alpha'} = I_{\alpha'}(\xi)$ . Potom jistě platí rovnice

$$(19) \quad \begin{aligned} dM &= \omega^{\alpha'} I_{\alpha'}, & dI_{\alpha'} &= \omega_{\alpha'}^{\beta'} I_{\beta'}, \\ \omega^{\alpha'} &= \Gamma_{\beta}^{\alpha'} d\xi^\beta, & \omega_{\alpha'}^{\beta'} &= \Gamma_{\gamma\beta}^{\alpha'} d\xi^\gamma \end{aligned}$$

a formy  $\Omega^{\alpha'}, \Omega_{\beta'}^{\alpha'}$  jsou jistě tvaru

$$(20) \quad \Omega^{\alpha'} = S_{\beta'\gamma'}^{\alpha'} [\omega^{\beta'} \omega^{\gamma'}], \quad \Omega_{\beta'}^{\alpha'} = R_{\gamma'\delta'\beta'}^{\alpha'} [\omega^{\gamma'} \omega^{\delta'}].$$

Nyní pro každou z předem uvažovaných basí  $\{M(\xi); I_1(\xi, t), \dots, I_n(\xi, t)\}$  platí

$$(21) \quad I_{\alpha'}(\xi, t) = c_{\alpha'}^{\alpha}(\xi, t) I_{\alpha}(\xi)$$

čili

$$(22) \quad I_{\alpha'}(\xi) = c_{\alpha'}^{\alpha}(\xi, t) I_{\alpha}(\xi, t),$$

kde

$$(23) \quad c_{\alpha'}^{\alpha} c_{\alpha}^{\beta'} = \delta_{\alpha}^{\beta'}, \quad c_{\alpha}^{\alpha'} c_{\beta'}^{\alpha} = \delta_{\beta'}^{\alpha'}$$

a  $\delta_{\alpha}^{\beta}, \delta_{\beta'}^{\alpha'}$  jsou Kroneckerova delta (= 1 pro stejné a = 0 pro různé indexy). Diferencováním rovnice (23<sub>1</sub>) dostávám  $c_{\alpha'}^{\beta'} dc_{\alpha}^{\alpha'} + c_{\alpha}^{\alpha'} dc_{\alpha'}^{\beta'} = 0$  a po vynásobení  $c_{\gamma}^{\alpha}$ , a vhodných změnách indexů, v nichž se sčítá, dostávám konečně

$$(24) \quad dc_{\alpha}^{\alpha'} = -c_{\alpha}^{\beta'} c_{\beta'}^{\alpha} dc_{\beta'}^{\alpha'}.$$

Dosazením (21) do (11) dostávám

$$dM = \omega^{\alpha} c_{\alpha'}^{\alpha'} I_{\alpha'}, \quad dc_{\alpha}^{\alpha'} \cdot I_{\alpha'} + c_{\alpha}^{\alpha'} dI_{\alpha'} = \omega_{\alpha}^{\beta'} c_{\beta'}^{\alpha'} I_{\alpha'},$$

<sup>1)</sup> Užívám označení čárkovaných indexů z tensorového počtu, viz např. SCHOUTENŮV Ricci-Calculus.

čili formy  $\omega^\alpha$ ,  $\omega_\alpha^\beta$  se transformují podle rovnic – jak plyne srovnáním s (19) –

$$(25) \quad \omega^{\alpha'} = c_\alpha^{\alpha'} \omega^\alpha, \quad \omega_{\alpha'}^{\beta'} = c_\alpha^{\alpha'} c_{\beta'}^{\beta} \omega_\alpha^\beta - c_\alpha^{\alpha'} d c_{\alpha'}^{\beta'}$$

Dále je

$$\Omega^{\alpha'} \equiv [d\omega^{\alpha'}] - [\omega_{\beta'}^{\alpha'} \omega^{\beta'}] = [d c_\alpha^{\alpha'} \omega^\alpha] + c_\alpha^{\alpha'} [d\omega^\alpha] - \\ - c_{\beta'}^{\beta} c_\alpha^{\alpha'} c_{\beta'}^{\alpha'} [\omega^\gamma \omega_\alpha^\beta] + c_{\beta'}^{\beta} c_\alpha^{\alpha'} [\omega^\gamma d c_\alpha^{\alpha'}],$$

pomocí (23) se zjistí, že první a čtvrtý člen mají nulový součet, takže konečně

$$(26) \quad \Omega^{\alpha'} = c_\alpha^{\alpha'} \Omega^\alpha \quad \text{čili} \quad \Omega^\alpha = c_\alpha^{\alpha'} \Omega^{\alpha'}.$$

Je

$$\Omega_{\beta'}^{\alpha'} \equiv [d\omega_{\beta'}^{\alpha'}] - [\omega_{\gamma'}^{\beta'} \omega^{\gamma'}] = c_\alpha^{\alpha'} [d c_{\beta'}^{\beta} \omega_\alpha^\beta] + c_{\beta'}^{\beta} [d c_\alpha^{\alpha'} \omega_\beta^\alpha] + \\ + c_\alpha^{\alpha'} c_{\beta'}^{\beta} [d\omega_\beta^\alpha] - [d c_{\beta'}^{\beta} d c_\alpha^{\alpha'}] - c_{\beta'}^{\beta} c_\gamma^{\gamma'} c_\alpha^{\alpha'} [\omega_\beta^\gamma \omega_\delta^\alpha] + \\ + c_{\beta'}^{\beta} c_\gamma^{\gamma'} c_\alpha^{\alpha'} [\omega_\beta^\gamma d c_\alpha^{\alpha'}] + c_{\beta'}^{\beta} c_\gamma^{\gamma'} c_\alpha^{\alpha'} [d c_\alpha^{\alpha'} \omega_\beta^\gamma] - c_{\beta'}^{\beta} c_\gamma^{\gamma'} [d c_\alpha^{\alpha'} d c_\alpha^{\alpha'}].$$

Pomocí rovnic (23) a (24) se snadno zjistí, že součet prvního a sedmého resp. druhého a šestého resp. čtvrtého a osmého členu je nulový, takže dostávám

$$(27) \quad \Omega_{\beta'}^{\alpha'} = c_\alpha^{\alpha'} c_{\beta'}^{\beta} \Omega_\beta^\alpha \quad \text{čili} \quad \Omega_\beta^\alpha = c_\alpha^{\alpha'} c_{\beta'}^{\beta} \Omega_{\beta'}^{\alpha'}.$$

Protože nyní  $\Omega^{\alpha'}$ ,  $\Omega_{\beta'}^{\alpha'}$  jsou tvaru (20), dostávám

$$(28) \quad \Omega^\alpha = c_\alpha^{\alpha'} S_{\beta'}^{\alpha'} [\omega_{\beta'}^{\alpha'} \omega^{\beta'}] = c_\alpha^{\alpha'} c_{\beta'}^{\beta} c_\gamma^{\gamma'} S_{\beta'}^{\alpha'} [\omega_\beta^\gamma \omega^\delta], \\ \Omega_\beta^\alpha = c_\alpha^{\alpha'} c_{\beta'}^{\beta} c_\gamma^{\gamma'} c_\delta^{\delta'} R_{\gamma'\delta'}^{\alpha'} [\omega_\beta^\gamma \omega^\delta],$$

což dokazuje naše základní lemma. Pro soustavu vybraných basí  $\{M(\xi); I_1(\xi, t), \dots, I_n(\xi, t)\}$  platí tedy rovnice (11) a bez použití podmínek integrability I je možno dokázat, že platí i rovnice (8). Rovnice I' nám ovšem říkají, že

$$(29) \quad S_{\beta\gamma}^\alpha = R_{\gamma\delta\beta}^\alpha = 0.$$

Studium vlastností 1° variety  $V_r$  v prostoru  $A_n$  je tedy ekvivalentní se studiem vlastností variety  $V_r$  v prostoru s afinní konexí  $\mathcal{A}_n$ , neboť k obojímu užívám téhož analytického aparátu, vycházejícího z rovnic (2) resp. (11), (8) a (9).

Při přechodu od jedné soustavy basí  $\{M; I_1(\xi, t), \dots, I_n(\xi, t)\}$  k jiné soustavě  $\{M; I_1(\xi, t'), \dots, I_n(\xi, t')\}$ , jež jsou spojeny vztahy

$$(30) \quad I_{\alpha'} = c_\alpha^{\alpha'} I_\alpha \quad \text{čili} \quad I_\alpha = c_\alpha^{\alpha'} I_{\alpha'},$$

ukazuje výpočet, totožný s důkazem základního lemmatu, že z platnosti rovnic (11), (19) plynou pro formy (13) rovnice (27) a tedy

$$(31) \quad S_{\beta\gamma}^\alpha = c_\alpha^{\alpha'} c_{\beta'}^{\beta} c_\gamma^{\gamma'} S_{\beta'\gamma'}^{\alpha'}, \quad R_{\gamma\delta\beta}^\alpha = c_\alpha^{\alpha'} c_{\beta'}^{\beta} c_\gamma^{\gamma'} c_\delta^{\delta'} R_{\gamma'\delta'\beta'}^{\alpha'}.$$

Tyto rovnice nás opravňují říkat, že soustava funkcí  $S_{\beta\gamma}^\alpha$ , resp.  $R_{\gamma\delta\beta}^\alpha$  je *tensozem torse* resp. *křivosti* uvažovaného prostoru. Rovnice I jsou pak ekvivalentní s tvrzením, že torse a křivost prostoru  $A_n$  je nulová, čili že platí rovnice (29).

3. V předchozím jsem tedy ukázal, že studium variety  $V_r$  v prostoru s afinní konexí je možno interpretovat jako studium variety  $V_r$  v afinním prostoru  $A_n$ , zde používám téhož analytického aparátu a postupu, na který jsme zvyklí při užívání Cartanových metod, pouze podmínky integrability I jsou nahrazeny rovnicemi struktury (8). Na základě tohoto postupu mohu snadno studovat i existenční otázky pro speciální typy variet s předem předepsanými vlastnostmi.

Jestliže chci studovat pouze vlastnosti variety  $V_r$  v  $A_n$  a nemám zájem o řešení existenčních otázek, je možno postupovat způsobem, který se mi zdá početně výhodnějším. Buď v  $A_n$  dána varieta  $V_r$  a zkoumejme její vlastnosti, uvedené v 1°. Každému jejímu bodu  $M = M(\xi)$  přiřadím jistý lokální reper  $\{M(\xi); I_1(\xi), \dots, I_n(\xi)\}$  tak, aby  $\{M(\xi); I_1(\xi), \dots, I_r(\xi)\}$  byla basí tečného prostoru variety  $V_r$  v bodě  $M(\xi)$ . Systém diferenciálních rovnic, určujících varietu  $V_r$ , jest tedy

$$(32) \quad dM = \Gamma_b^\alpha d\xi^b \cdot I_\alpha, \quad dI_\alpha = \Gamma_{aa}^\beta d\xi^a \cdot I_\beta \\ (\alpha, \beta, \dots = 1, \dots, n; \quad a, b, \dots = 1, \dots, r);$$

jeho podmínek integrability nebudu v dalším užívat. Přejít k jiným lokálním reperům týchž vlastností se uskuteční pomocí rovnic

$$(33) \quad M = M', \quad I_\alpha = \sigma_{\alpha'}^{\alpha'} I_{\alpha'},$$

kde

$$\sigma_a^{A'} = 0 \quad \text{pro} \quad a = 1, \dots, r; \quad A' = r + 1, \dots, n; \quad \det |\sigma_a^{A'}| \neq 0;$$

resp.

$$(34) \quad M' = M, \quad I_{\alpha'} = \sigma_{\alpha'}^{\alpha} I_\alpha,$$

kde

$$\sigma_{a'}^A = 0 \quad \text{pro} \quad a' = 1, \dots, r; \quad A = r + 1, \dots, n; \quad \sigma_{\alpha'}^{\alpha} \sigma_{\alpha'}^{\beta} = \delta_{\alpha}^{\beta}.$$

Při užití (33) a (34) a současné změně parametrů

$$(35) \quad \xi^a = \xi^a(\xi^{a'}) \quad \text{resp.} \quad \xi^{a'} = \xi^{a'}(\xi^a)$$

jsou rovnice (32) nahrazeny rovnicemi

$$(36) \quad dM = \Gamma_{b'}^{a'} d\xi^{b'} \cdot I_{a'}, \quad dI_{a'} = \Gamma_{\alpha'a'}^{\beta'} d\xi^{\alpha'} \cdot I_{\beta'};$$

po snadném výpočtu, sestávajícím pouze z dosazení (33) do (32), vychází

$$(37) \quad \Gamma_{b'}^{a'} = \sigma_a^{a'} A_b^b \Gamma_b^a, \quad \Gamma_{\alpha'a'}^{\beta'} = \sigma_{\alpha'}^{\alpha} \sigma_{\beta'}^{\beta} A_{\alpha'}^{\alpha} \Gamma_{\alpha\alpha}^{\beta} - \sigma_{\alpha'}^{\alpha} \partial_{\alpha'} \sigma_{\alpha'}^{\beta'},$$

kde

$$(38) \quad \partial_{a'} f = \frac{\partial f}{\partial \xi^{a'}}, \quad A_{a'}^a = \partial_{a'} \xi^a.$$

Specialisaci reperu provádím nyní tím způsobem, že pomocí výrazů  $\sigma_a^\alpha$  a  $A_a^\alpha$  (které právě vyjadřují změny reperů resp. parametrů na varietě) dávám maximálnímu možnému počtu funkcí  $\Gamma_{b'}^{a'}$ ,  $\Gamma_{a'a'}^{b'}$  číselné hodnoty. Postup je ovšem pro každý konkrétní případ jiný, direktivu, které z funkcí  $\Gamma$  vybrat a učinit konstantními, nám udává specialisace reperu, provedená pro varietu v afinním prostoru.

#### Literatura

- [1] E. Cartan: Sur les variétés à connexion affine. Ann. Éc. Norm. Sup., (3), *XLI*, 1924.  
 [2] A. Švec: L'application des variétés à connexion à certains problèmes de la géométrie différentielle. Чех. мат. журнал, *10* (85), 1960, 523—550.

#### Резюме

### К ИЗЛОЖЕНИЮ ТЕОРИИ ПРОСТРАНСТВ СО СВЯЗНОСТЬЮ

АЛОИС ШВЕЦ (Alois Švec), Прага

Пусть в аффинном пространстве  $\mathcal{A}_n$  задано многообразие  $V_r$  уравнениями (9). Свойства этого многообразия можно подразделить на три группы, а именно:

- 1° свойства, которые можно вывести из уравнений (9) без использования условий интегрируемости (12);
- 2° свойства, вытекающие из уравнений (9) и (12), но которые нельзя вывести только из (9);
- 3° специальные свойства многообразия  $V_r$ , которые нельзя вывести из уравнений (9) и (12).

Показано, что изучение свойств 1° равносильно изучению многообразия  $V_r$  в пространстве аффинной связности, когда уравнения (12) заменяются уравнениями (8).

#### Résumé

### SUR L'EXPOSITION DE LA THÉORIE DES ESPACES À CONNEXION

ALOIS ŠVEC, Praha

Dans un espace affín  $\mathcal{A}_n$ , soit donnée une variété  $V_r$  par les équations (9). Ses propriétés peuvent être divisées en trois groupes:

- 1° propriétés que l'on peut déduire des équations (9) sans tenir compte des conditions d'intégrabilité (12);



2° propriétés que l'on peut déduire des équations (9) et (12), mais non pas de (9) seulement;

3° propriétés spéciales de la variété  $V_r$ , que l'on ne peut pas déduire des équations (9) et (12).

On montre ensuite que l'étude des propriétés 1° est équivalente à l'étude de la variété  $V_r$ , dans un espace à connexion affine où les équations (12) sont remplacées par les équations (8).