

Jaromír Kryš

r -rozměrné konfigurace. II.

Časopis pro pěstování matematiky, Vol. 98 (1973), No. 4, 409--414

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/117823>

Terms of use:

© Institute of Mathematics AS CR, 1973

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

r -ROZMĚRNÉ KONFIGURACE II

JAROMÍR KRYS, Hradec Králové

(Došlo dne 15. září 1972)

Úvod. Tato práce je pokračováním článku [1], jehož znalost předpokládáme a pokračujeme také v označování vět, poznámek i odstavců.

4. r -rozměrné konfigurace s body U_{ij} a M_{ij} . Označme M_{ij} bod jehož i -tá a j -tá souřadnice je rovna jedné a ostatní jsou rovny nule. Zřejmě platí $M_{ij} \equiv M_{ji}$ a v daném S_r existuje právě $\binom{r+1}{2}$ těchto bodů M_{ij} .

Označme S_s^I s -rozměrný podprostor daného S_r určený rovnicemi:

$$(5) \quad \begin{aligned} a_1x_{i_1} + a_2x_{i_2} + \dots + a_{s+1}x_{i_{s+1}} + a_{s+2}x_{i_{s+2}} &= 0, \\ x_{i_{s+3}} &= 0, \dots, x_{i_{r+1}} = 0, \end{aligned}$$

kde a_i je rovno právě jednomu z čísel 1 a -1 a platí $0 \leq s \leq r-1$.

Z rovnic (5) je ihned vidět: jestliže podprostor S_s^I obsahuje bod U_{ij} , tak neobsahuje bod M_{ij} a obráceně. Součet počtu bodů U_{ij} a M_{ij} obsažených v daném S_s^I je právě $\binom{s+2}{2}$. Dále je vidět, že v daném S_s^I nemusí ležet žádný bod M_{ij} . Naopak v každém S_s^I , kde $s > 0$ leží aspoň jeden bod U_{ij} .

Věta 13. V daném S_r existuje právě 2^r nadrovin S_{r-1}^I .

Důkaz. Nadrovina S_{r-1}^I je určena rovnicí:

$$(6) \quad a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_{r+1}x_{r+1} = 0,$$

kde a_i je právě jedno z čísel 1 a -1 . Počet různých rovnic (6) je zřejmě $1 + r + 1 + \binom{r+1}{2} + \dots + \binom{r+1}{r} + 1 = 2^{r+1}$, neboť číslo $\binom{r+1}{s}$ určuje počet rovnic (6), které mají právě s záporných znamének u proměnných x_i . Znásobíme-li rovnici z rovnic (6) číslem -1 dostáváme opět rovnici z rovnic (6) a tyto dvě rovnice určují stejnou nadrovinu. Je tedy počet nadrovin určených rovnicemi (6) právě 2^r .

Věta 14. V daném S_r existuje právě $\binom{r+1}{s+1} \cdot 2^{s+1}$ s -rozměrných podprostorů S_s^I .

Důkaz. Uvažujme „přípustný“ s -rozměrný podprostor, určený soustavou (1). Zřejmě tento podprostor je prostor S_s^I a z důkazu předcházející věty snadno usoudíme, že k podprostorům S_s^I patří další podprostory určené tak, že v první rovnici soustavy (1) jsou také záporná znaménka u proměnných. Počet podprostorů S_s^I dostaneme tak, že počet „přípustných“ podprostorů znásobíme číslem 2^{s+1} . Z předcházejícího a z věty 3 vyplývá, že počet S_s^I v daném S_r je právě $\binom{r+1}{s+1} \cdot 2^{s+1}$.

Věta 15. Necht' $s > k$, potom každým S_k^I prochází právě $\binom{r-k-1}{s-k} \cdot 2^{s-k}$ různých podprostorů S_s^I .

Důkaz. Metodou použitou při důkazu věty 2. zjistíme, že daným S_k^I prochází $\binom{r-k-1}{s-k}$ různých S_s^I , jestliže čísla a_i jsou pevně stanovena. V našem případě se však u $s-k$ proměnných mohou změnit znaménka. Proto je třeba získaný počet násobit číslem 2^{s-k} analogicky jako ve větě 13.

Poznámka 4. Věta 15 platí i pro bod tj. prostor dimenze nula. Platí tedy: Každým bodem U_{ij} a M_{ij} prochází právě $\binom{r-1}{s} \cdot 2^s$ různých podprostorů S_s^I .

Věta 16. Necht' $s > k$. V podprostoru S_s^I daného prostoru S_r leží právě $\binom{s+2}{k+2}$ k -rozměrných podprostorů S_k^I prostoru S_s^I .

Důkaz. Tato věta je zcela obdobná větě 4. Je-li $S_k^I \subset S_s^I$, potom v první rovnici soustavy (5), která dané S_k^I a S_s^I určuje, musí být u příslušných proměnných stejná znaménka. Můžeme tedy zde aplikovat důkaz věty 4.

Věta 17. Necht' M' je množina, která jako své prvky obsahuje všechny podprostory $S_s^I \subset S_r$, $0 \leq s \leq r-1$. Potom množina M' je r -rozměrnou konfigurací typu:

$$(7) \quad \begin{pmatrix} 2 \binom{r+1}{2}, & 2(r-1), & \dots, & \binom{r-1}{r-2} \cdot 2^{r-2}, & 2^{r-1} \\ & 3, & \binom{r+1}{3} \cdot 2^2, & \dots, & \binom{r-2}{r-3} \cdot 2^{r-3}, & 2^{r-2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \binom{r+1}{2}, & \binom{r+1}{3}, & \dots, & \binom{r+1}{r}, & 2^r \end{pmatrix}.$$

Důkaz. Tato věta plyne z předcházejících vět. Na hlavní diagonále matice (7) jsou čísla podle věty 14, pod hlavní diagonálou jsou čísla určená větou 16 a nad hlavní diagonálou jsou čísla, která dostaneme užitím věty 15.

Označme S_s^{II} s -rozměrný podprostor daného S_r , určený rovnicemi:

$$(8) \quad x_{i_m} = 0, \quad \text{kde } m = s + 2, s + 3, \dots, r + 1$$

Věta 18. *V daném S_r existuje právě $\binom{r+1}{r-s}$ s -rozměrných podprostorů S_s^{II} .*

Důkaz. Jedná se zde zřejmě o kombinace $r - s$ -té třídy z $r + 1$ prvků.

Věta 19. *Nechť $s > k$. Každým podprostem S_k^{II} prostoru S_r prochází právě $\binom{r-k}{r-s}$ různých podprostorů S_s^{II} .*

Důkaz. Nechť S_s^{II} je dán soustavou (8) a S_k^{II} soustavou:

$$(9) \quad x_{i_n} = 0, \quad n = k + 2, k + 3, \dots, r + 1.$$

Zřejmě musí platit, že množina $\{x_{i_{s+2}}, x_{i_{s+3}}, \dots, x_{i_{r+1}}\}$ je podmnožinou množiny $\{x_{i_{k+2}}, x_{i_{k+3}}, \dots, x_{i_{r+1}}\}$. Protože prvá množina má $r - k$ prvků, druhá množina $r - s$ prvků a protože se jedná o kombinace je počet uvažovaných prostorů S_s^{II} dán číslem $\binom{r-k}{r-s}$.

Věta 20. *Nechť $s > k$. V každém podprostoru S_s^{II} prostoru S_r leží právě $\binom{s+1}{s-k}$ k -rozměrných podprostorů S_k^{II} .*

Důkaz. Nechť S_s^{II} je dán soustavou (8) a S_k^{II} soustavou (9). Množina $\{x_{i_{s+2}}, x_{i_{s+3}}, \dots, x_{i_{r+1}}\}$ musí být podmnožinou množiny $\{x_{i_{k+2}}, x_{i_{k+3}}, \dots, x_{i_{r+1}}\}$. Protože $r - s$ proměnných bylo již zvoleno, můžeme měnit pouze $r - k - (r - s) = s - k$ proměnných. Těchto $s - k$ proměnných budeme vybírat z $r + 1 - (r - s) = s + 1$ proměnných. Jsou to opět kombinace a počet prostorů S_k^{II} , které leží v daném S_s^{II} , je dán číslem $\binom{s+1}{s-k}$.

Věta 21. *Nechť M_1 je množina, která jako své prvky obsahuje všechny podprostory $S_s^{II} \subset S_r$, $0 \leq s \leq r - 1$. Potom množina M_1 je r -rozměrnou konfigurací typu:*

$$(10) \quad \left[\begin{array}{cccccc} r + 1, & \binom{r}{r-1}, & \binom{r}{r-2}, & \dots, & \binom{r}{2}, & r \\ 2, & \binom{r+1}{r-1}, & \binom{r-1}{r-2}, & \dots, & \binom{r-1}{2}, & \binom{r-1}{1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \binom{r}{r-1}, & \binom{r}{r-2}, & \binom{r}{r-3}, & \dots, & \binom{r}{2}, & r + 1 \end{array} \right].$$

Důkaz této věty vyplývá z předcházejících vět a proto ho nebudeme provádět.

Poznámka 5. Čtenář si jistě uvědomil, že množina M_1 z věty 21 je „souřadnicový simplex“. Použijeme ho však k odvození dalších konfigurací.

Věta 22. *Něcht' M_2 je množina, která jako své prvky obsahuje body M_{ij}, U_{ij} (tj. podprostory S_0^I) a všechny podprostory $S_s^{II} \subset S_r$, kde $0 < s \leq r - 1$. Potom množina M_2 je r -rozměrnou konfigurací typu:*

$$(11) \quad \begin{pmatrix} 2 \binom{r+1}{2}, & 1, & \binom{r-1}{r-2}, & \dots, & \binom{r-1}{2}, & r-1 \\ 2, & \binom{r+1}{r-1}, & \binom{r-1}{r-2}, & \dots, & \binom{r-1}{2}, & r-1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 2 \binom{r}{2}, & \binom{r}{r-2}, & \binom{r}{r-3}, & \dots, & \binom{r}{2}, & r+1 \end{pmatrix}.$$

Důkaz. Matice (11) se liší od matice (10) v prvním řádku a v prvním sloupci. Počet bodů U_{ij} a M_{ij} je zřejmě $2 \binom{r+1}{2}$ a dále je z rovnic (8) vidět, že každý $S_s^{II} (0 < s \leq r - 1)$ obsahuje právě $\binom{s+1}{2}$ bodů U_{ij} a $\binom{s+1}{2}$ bodů M_{ij} . Tedy ostatní čísla v prvním sloupci matice (11) jsou $2 \binom{s+1}{2}$. Z rovnic (8) je také vidět, že každý bod U_{ij} a M_{ij} leží na jediné přímce S_1^{II} . Z toho vyplývá, že v prvním řádku matice (11) je druhé číslo jedna a další čísla jsou stejná jako v druhém řádku.

Věta 23. *Něcht' M_3 je množina, která jako své prvky obsahuje podprostory S_s^I pro $s = 0, 1$ a podprostory S_s^{II} pro $s = 2, 3, \dots, r - 1$. Potom množina M_3 je r -rozměrnou konfigurací typu:*

$$(12) \quad \begin{pmatrix} 2 \binom{r+1}{2}, & 2(r-1), & \binom{r-1}{r-2}, & \dots, & \binom{r-1}{2}, & r-1 \\ 3, & \binom{r+1}{3} \cdot 2^2, & 1, & \dots, & \binom{r-2}{r-4}, & r-2 \\ 6, & 4, & \binom{r+1}{r-2}, & \dots, & \binom{r-2}{2}, & r-2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 2 \binom{r}{2}, & \binom{r}{3} \cdot 2^2, & \binom{r}{r-3}, & \dots, & \binom{r}{2}, & r+1 \end{pmatrix}.$$

Důkaz. Matice (12) se liší od matice (11) v druhém řádku a v druhém sloupci. Prvá dvě čísla v uvažovaném řádku a sloupci jsou již známa. Jestliže daná přímka S_1^I

má ležet v S_s^{II} ($s > 1$), potom v soustavě (8) – určující S_s^{II} – nesmí být žádná rovnice s proměnnou, která je v první rovnici soustavy (5) – určující danou přímkou S_1^I . V první rovnici soustavy (5) jsou tři proměnné (pro S_1^I) a tedy platí, že daná S_1^I je obsažena v $\binom{r-2}{s-2}$ různých podprostorech S_s^{II} . Tím jsou určena čísla v druhém řádku matice (12). Nyní určíme čísla v druhém sloupci matice (12). Proměnné v první rovnici soustavy (5) – určující S_1^I – můžeme vybírat z $s+1$ proměnných, které nejsou v soustavě (8) určující zvolený S_s^{II} . Dostáváme tak $\binom{s+1}{3}$ kombinací. V každé kombinaci však můžeme v první rovnici soustavy (5) měnit znaménka a pro případ přímky dostáváme zřejmě čtyři možnosti změn znamének, které vedou k různým přímkám. Čísla v druhém sloupci počínaje třetím řádkem jsou tedy $\binom{s+1}{3} \cdot 2^2$.

Poznámka 6. Necht' $r = 3$. Pro případ věty 17 dostáváme konfiguraci v trojrozměrném prostoru typu:

$$(13) \quad \begin{pmatrix} 12, & 4, & 4 \\ 3, & 16, & 2 \\ 6, & 4, & 8 \end{pmatrix}.$$

Pro případ věty 23 dostáváme konfiguraci v trojrozměrném prostoru typu:

$$(14) \quad \begin{pmatrix} 12, & 4, & 2 \\ 3, & 16, & 1 \\ 6, & 4, & 4 \end{pmatrix}.$$

Z rovnic (5) a (8) je vidět, že každé dvě roviny S_2^I a S_2^{II} jsou navzájem různé. Z toho vyplývá, že se dá sečíst třetí sloupec matice (13) s třetím sloupcem matice (14). Tím jsme dokázali tuto zajímavou větu:

Věta 24. V trojrozměrném prostoru existuje konfigurace typu:

$$\begin{pmatrix} 12, & 4, & 6 \\ 3, & 16, & 3 \\ 6, & 4, & 12 \end{pmatrix}.$$

Poznámka 7. V uvažovaném S_r platí princip duality. Platí tedy, že ke všem konfiguracím odvozeným v obou člancích existují konfigurace duální.

Literatura

- [1] J. Krys: r -Rozměrné konfigurace, Časopis pro pěstování matematiky, Svazek 96 (1971), str. 339–345.

Adresa autora: 501 91 Hradec Králové, Leninovo nám. 301 (Pedagogická fakulta).

Zusammenfassung

r -DIMENSIONALE KONFIGURATIONEN II

JAROMÍR KRYS, Hradec Králové

In dieser Arbeit, die eine Fortsetzung des Artikels [1] ist, sind drei weitere Konfigurationstypen im projektiven Raum über dem Körper der komplexen Zahlen hergeleitet. Die Elemente dieser Konfiguration sind von einer gewissen Anzahl von Punkten U_{ij} und M_{ij} bestimmt, wo $U_{ij} = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0, -1, 0, \dots, 0)$ und $M_{ij} = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$ ist.