

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

František Josef Studnička

Geometrické upotřebení některých pouček o determinantech

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 2 (1873), No. 1, 69--82

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/122446>

Terms of use:

© Union of Czech Mathematicians and Physicists, 1873

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

a poněvadž

$$q(u)_1 = -2qu_4$$

máme konečně

$$(u)_3 + q(u)_1 = 0$$

z čehož dle (7) soudíme, že body u_4, u_1, u_2, u_3 skutečně na tomtéž kruhu se nacházejí, jak dokázati jsme chtěli.

Při jiné příležitosti ukážeme, jak výhodně lze parametrů (u) k řešení jiných rozmanitých o kuželosečkách jednajících úloh použítí.

Geometrické upotřebení některých pouček o determinantech.

(Sepsal Prof. Dr. F. J. Studnička.)

Kdo se chce vycvičiti v užívání základních pouček o determinantech platících, nenalezne snad vděčnějšího pole nad analytickou geometrii jak v rovině tak v prostoru. Neb tu vyskytuje se stále řešení rovnic, vylučování rozličných veličin jakož i přetvořování výrazů, samé to úlohy, kteréž, jak známo z dějin theorie determinantů, první podnět daly k jejímu vyvinutí.


A jelikož nyní již na lepších školách středních možná si zjednati nejprvnějších známostí determinantů, sestavil jsem tuto analytický rozbor trojúhelníku a čtyřstěnu, abych ukázal, jak prospěšně se tu používá některých jednoduchých vlastností těchto zajímavých výrazů kombinatorických, doufaje, že mnohý tím bude povzbuzen k dalšímu studiu v oboru tomto.

I. O trojúhelníku.

Nejjednodušším způsobem určí se analytický trojúhelník v rovině, ustanoví-li se buď pravoúhelné souřadnice jeho vrcholů neb rovnice jeho stran, načež se snadno vypočítá obsah jeho, určí délka stran a výšek jakož i velikost uhlů jeho.

Značí-li v případě prvním x_k, y_k souřadnice bodu B_k , bude plocha trojúhelníku $B_1 B_2 B_3$ — obr. 7. — patrně

$$P = (I + II + III) - (I) - (II);$$



obr. 7.

použijeme-li tedy známého vzorce, ustanovujícího ploský obsah lichoběžníku, obdržíme tu

$$2P = (x_3 - x_1)(y_3 + y_1) - (x_2 - x_1)(y_2 + y_1) - (x_3 - x_2)(y_3 + y_2) \\ = x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2);$$

dá-li se pak výrazu tomuto tvar determinantu¹⁾

$$\Delta = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = (1\ 2\ 3), \quad (1)$$

povstane konečně pro plochu trojúhelníku jednoduchý vzorec

$$2P = \Delta = (1\ 2\ 3). \quad (2)$$

Kdyby však druhý bod byl tak položen, že by příslušné y_2 protínalo protější stranu trojúhelníku, kdyby tedy na př. byl v B'_2 , měli bychom pro plochy $B_1 B'_2 B_3$ výraz symbolický

$$2P = -(1\ 2\ 3) = (1\ 3\ 2).^2)$$

Konečně budiž tu ještě poznamenáno, že determinant Δ možná zjednodušiti odečítáním prvků jednoho řádku od prvků řádků ostatních,³⁾ čímž se obdrží, označíme-li podřízené determinanty příslušnými písmenami velkými,⁴⁾

$$2\Delta = (X_1\ Y_2) = (X_2\ Y_3) = (X_3\ Y_1). \quad (3)$$

Ze vzorce (1) jde na jevo, že pro $\Delta = 0$ jest i $P = 0$, z čehož jde, že tu všechny tři body leží v jedné přímce; a naopak leží-li tři body v jediné přímce, musí $\Delta = 0$.

Abychom ustanovi-li délku jednotlivých stran tohoto trojúhelníku, použijme známých vzorců

$$l_1^2 = (x_2 - x_3)^2 + (y_2 - y_3)^2 = X_1^2 + Y_1^2, \\ l_2^2 = (x_3 - x_1)^2 + (y_3 - y_1)^2 = X_2^2 + Y_2^2, \\ l_3^2 = (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 = X_3^2 + Y_3^2. \quad (4)$$

²⁾ Viz *Studnička* „O determinantech“ pag. 20.

³⁾ *ibid.* pag. 22.

⁴⁾ *ibid.* pag. 26.

⁵⁾ *ibid.* pag. 17.

Délky kolmic neb výšek trojúhelníkových obdrží se pak ze vzorce

$$2P = p_1 l_1 = p_2 l_2 = p_3 l_3 = \Delta,$$

z něhož jde přímo

$$p_1 = \frac{\Delta}{l_1}, \quad p_2 = \frac{\Delta}{l_2}, \quad p_3 = \frac{\Delta}{l_3}. \quad (5)$$

A podobně určí se sinusy úhlů trojúhelníkových pomocí vzorce

$$2P = l_1 l_2 \sin \alpha_3 = l_2 l_3 \sin \alpha_1 = l_3 l_1 \sin \alpha_2 = \Delta,$$

z něhož se bezprostředně obdrží

$$\sin \alpha_1 = \frac{\Delta}{l_2 l_3}, \quad \sin \alpha_2 = \frac{\Delta}{l_3 l_1}, \quad \sin \alpha_3 = \frac{\Delta}{l_1 l_2} \quad (6)$$

Ze vzorců těchto jde na jevo, že v stejnostranném trojúhelníku, kde tedy

$$l_1 = l_2 = l_3,$$

zároveň platí

$$p_1 = p_2 = p_3,$$

$$\sin \alpha_1 = \sin \alpha_2 = \sin \alpha_3$$

Znajíce vzorec (1), ustanovíme snadno i v druhém případě obsah trojúhelníku, jehož strany určeny jsou rovnicemi

$$\begin{aligned} a_1 x + b_1 y + c_1 &= 0 \\ a_2 x + b_2 y + c_2 &= 0 \\ a_3 x + b_3 y + c_3 &= 0. \end{aligned} \quad (7)$$

Rešíme-li totiž tuto soustavu rovnic, spojíme je po dvou, zjednáme si napřed souřadnice průseků, tedy vrcholů trojúhelníkových, načež jen třeba hodnoty takto obdržené dosaditi do vzorce (1), aby se přišlo k cíli.

Označíme-li determinanty, které se tu vyskytnou, příslušnými písmeny velkými, obdržíme z rovnice druhé a třetí⁵⁾

$$x_1 = \frac{A_1}{C_1}, \quad y_1 = \frac{B_1}{C_1},$$

z rovnice třetí a první

$$x_2 = \frac{A_2}{C_2}, \quad y_2 = \frac{B_2}{C_2}$$

a konečně z rovnice první a druhé

$$x_3 = \frac{A_3}{C_3}, \quad y_3 = \frac{B_3}{C_3}.$$

⁵⁾ ibid. pag. 29.

zavedeme-li tyto hodnoty do vzorce (1), obdržíme tedy, vyloučivše společného dělitele ⁶⁾

$$2P = \frac{1}{C_1 C_2 C_3} \begin{vmatrix} A_1 B_1 C_1 \\ A_2 B_2 C_2 \\ A_3 B_3 C_3 \end{vmatrix}.$$

Ale prvky posledního determinantu jsou subdeterminanty příslušné k soustavě (7) aneb k determinantu

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}, \quad (8)$$

z čehož jde, že hodnota jeho, jelikož jest stupně třetího, rovná se druhé mocnině původního determinantu Δ^2); jest tedy

$$2P = \frac{\Delta^2}{C_1 C_2 C_3}. \quad (9)$$

Jestli tu $\Delta = 0$, jest i $P = 0$, z čehož jde na jevo, že všechny tři přímky protínají se v jednom bodě a naopak; protínají-li se tři přímky v jednom bodě, musí příslušné $\Delta = 0$. ⁸⁾

Znajíce vzorec (9), můžeme jednoduchým způsobem vyjádřit i výšky trojúhelníku i délky jednotlivých stran jakož i velikost úhlů jimi uzavřených.

Značí-li l_1 délku strany mezi bodem B_2 a B_3 ležící a p_1 příslušnou výšku neb kolmici s protějšího vrcholu B_1 na ni spuštěnou, bude i

$$2P = p_1 l_1, \quad (10)$$

kdež se p_1 analyticky ustanoví vzorcem

$$p_1 = \frac{a_1 x_1 + b_1 y_1 + c_1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}};$$

dosadíme-li tedy do tohoto výrazu za x_1 a y_1 známé již hodnoty a položíme-li všeobecně

$$\sqrt{a_k^2 + b_k^2} = \mu_k, \quad (11)$$

obdržíme především pro výšku vzorec

$$p_1 = \frac{a_1 A_1 + b_1 B_1 + c_1 C_1}{C_1 \mu_1},$$

⁶⁾ ibid. pag. 23.

⁷⁾ ibid. pag. 40.

⁸⁾ ibid. pag. 31.

aneb složíme-li čitatele v Δ , ⁹⁾

$$p_1 = \frac{\Delta}{C_1 \mu_1},$$

a podobně

$$p_2 = \frac{\Delta}{C_2 \mu_2}, \quad (12)$$

$$p_3 = \frac{\Delta}{C_3 \mu_3} \quad {}^{10)}$$

Spojíme-li pak vzorce (9), (10) a (12), obdržíme bezprostředně dále

$$l_1 = \Delta \frac{\mu_1}{C_2 C_3},$$

$$l_2 = \Delta \frac{\mu_2}{C_3 C_1}, \quad (13)$$

$$l_3 = \Delta \frac{\mu_3}{C_1 C_2}.$$

A poněvadž tu

$p_1 = l_3 \sin \alpha_2$, $p_2 = l_1 \sin \alpha_3$, $p_3 = l_2 \sin \alpha_1$,
označíme-li úhel ležící proti straně l_k krátce α_k , obdržíme pomocí vzorců posledních

$$\sin \alpha_1 = \frac{C_1}{\mu_2 \mu_3},$$

$$\sin \alpha_2 = \frac{C_2}{\mu_3 \mu_1}, \quad (14)$$

$$\sin \alpha_3 = \frac{C_3}{\mu_1 \mu_2}.$$

U stejnostranného trojúhelníku platí

$$l_1 = l_2 = l_3,$$

z čehož jde, že tu

$$\mu_1 C_1 = \mu_2 C_2 = \mu_3 C_3 = k,$$

načež z posledních vzorců se obdrží

$$p_1 = p_2 = p_3 = \frac{\Delta}{k},$$

$$\sin \alpha_1 = \sin \alpha_2 = \sin \alpha_3 = \frac{k}{\mu_1 \mu_2 \mu_3},$$

⁹⁾ ibid. pag. 17.

¹⁰⁾ Jelikož μ_k má označení \pm , volí se v jednotlivých případech tak, aby p_k bylo pozitivní.

z čehož plyne pro k výraz


$$k = \frac{\mu_1 \mu_2 \mu_3}{2} \sqrt{3}.$$

II. O čtyřstěnu.

Zcela podobným způsobem možná provést analytický rozbor čtyřstěnu.

Značí-li v prvním případě všeobecně x_k, y_k, z_k souřadnice bodu B_k a chceme-li ustanoviti obsah čtyřstěnu $B_1 B_2 B_3 B_4$ — obr. 8. —, jehož rohy jsou určeny souřadnicemi pravouhlými x, y, z , rozložme hranol s jehlancovým zakončením na tři hranoly

$$1\ 2\ 4\ B_4\ B_2\ B_1, \quad 2\ 3\ 4\ B_4\ B_3\ B_2, \quad 1\ 2\ 3\ B_3\ B_2\ B_1$$



obr. 8.

a odečtíme od součtu těchto tří hranolů doplňující hranol

$$1\ 3\ 4\ B_4\ B_3\ B_1.$$

Obsah trojbokého hranolu O , jehož tři výšky jsou h_1, h_2, h_3 a základna b , určuje se, jak známo, podle vzorce

$$3O = b(h_1 + h_2 + h_3);$$

v případě tomto jest b trojúhelník, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi x, y a plocha tudíž vzorcem (1), takže všeobecně bude

$$6O = (mnp)(h_1 + h_2 + h_3).$$

Použijeme-li tohoto pravidla způsobem dříve již vytknutým, obdržíme tedy pro obsah čtyřstěnu

$$T = B_1 B_2 B_3 B_4$$

především vzorec

$$\begin{aligned} 6T &= (123)(z_1 + z_2 + z_3) \\ &\quad + (324)(z_3 + z_2 + z_4) \\ &\quad + (421)(z_4 + z_2 + z_1) \\ &\quad - (143)(z_1 + z_4 + z_3), \end{aligned}$$

z něhož jde, spořádáme-li výraz na pravé straně podlé jednotlivých z a použijeme-li známé stejninu

$$(mnp) = -(nmp) = -(pnm) = -(mpn)^{11)},$$

$$\begin{aligned} 6T &= z_1 [(123) + (421) + (341)] \\ &\quad - z_2 [(124) + (423) + (321)] \\ &\quad + z_3 [(123) + (324) + (341)] \\ &\quad - z_4 [(234) + (412) + (143)]; \end{aligned}$$

spojíme-li pak determinanty v závorkách obsažené, majíce na zřeteli, že podle ob. 8.

$$(143) = (123) + (324) + (421),$$

obdržíme dále

$$6T = z_1(234) - z_2(341) + z_3(412) - z_4(123),$$

což se dá složití podlé známého pravidla¹²⁾ v

$$6T = \begin{vmatrix} z_1 & x_1 & y_1 & 1 \\ z_2 & x_2 & y_2 & 1 \\ z_3 & x_3 & y_3 & 1 \\ z_4 & x_4 & y_4 & 1 \end{vmatrix};$$

vyměníme-li konečně druhý sloupec za první a pak třetí za druhý¹³⁾, povstane konečně pro obsah čtyřstěnu vzorec podobný (1), totiž

$$6T = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \\ x_4 & y_4 & z_4 & 1 \end{vmatrix} = \Delta, \quad (15)$$

kterýž možná ještě známým způsobem zjednoduší v

$$6T = \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_2 & y_3 - y_2 & z_3 - z_2 \\ x_4 - x_3 & y_4 - y_3 & z_4 - z_3 \end{vmatrix}. \quad (16)$$

Jak ze vzorce (15) jde na jevo, stane se $T = 0$, všechny body leží tedy v jedné rovině, když determinant $\Delta = 0$ a na-

¹¹⁾ ibid. pag. 22.

¹²⁾ ibid. pag. 12.

¹³⁾ ibid. pag. 21.

opak, leží-li čtyry body v jedné rovině, musí determinant, sestavený z jich souřadnic podle vzorce (15), rovnati se 0.

Abychom určili velikost jednotlivých ploch, použijme známé poučky, že čtverec nějaké plochy v prostoru rovná se součtu čtverců průmětů této plochy na tři roviny souřadnicové, načež obdržíme, značí-li P_k plochu ležící proti bodu B_k a $P_{k(mn)}$ průmět její na rovinu mn ,

$$P_k^2 = P_{k(xy)}^2 + P_{k(yz)}^2 + P_{k(zx)}^2;$$

označíme-li pak subdeterminanty patřící k Δ stejnými písmenami velkými, bude dále

$$\begin{aligned} 2P_{k(xy)} &= Z_k, \\ 2P_{k(yz)} &= X_k, \\ 2P_{k(zx)} &= Y_k, \end{aligned}$$

z čehož jde, že všeobecně

$$4P_k^2 = X_k^2 + Y_k^2 + Z_k^2 = M_k^2. \quad (17)$$

Délky jednotlivých hran nelze jednodušeji vyjádřiti nežli co vzdálenosti dvou bodů určených souřadnicemi, tedy vzorcem

$$l_{ik}^2 = (x_i - x_k)^2 + (y_i - y_k)^2 + (z_i - z_k)^2, \quad (18)$$

ačkoliv i tu možná výraz na pravé straně poměry determinantů nahraditi,

Co se tkne délky kolmic p_k spuštěných s bodů B_k na protější plochy P_k , ty ustanoví se snadno porovnáním dvou výrazů pro obsah čtyřstěnu; s jedné strany máme totiž podle vzorce (15)

$$6T = \Delta,$$

se strany druhé pak, jak známo ze stereometrie,

$$6T = 2P_k p_k = M_k p_k$$

z těchto dvou rovnic jde tedy všeobecně

$$p_k = \frac{\Delta}{M_k}. \quad (19)$$

Abychom určili úhly, jež jednotlivé plochy s sebou uzavírají, musíme napřed znáti úhly, jež uzavírají s jednotlivými rovinami souřadnicovými; a tu jest podle známé poučky o průmětech, značí-li α_k , β_k , γ_k úhly, jež uzavírá plocha P_k s rovinami XY , ZY a ZX ,

$$\begin{aligned} P_{k(xy)} &= P_k \cos \alpha_k, \\ P_{k(yz)} &= P_k \cos \beta_k, \\ P_{k(zx)} &= P_k \cos \gamma_k, \end{aligned}$$

z čehož jde, použijeme-li předešlých vzorců,

$$\cos \alpha_k = \frac{Z_k}{M_k}, \quad \cos \beta_k = \frac{X_k}{M_k}, \quad \cos \gamma_k = \frac{Y_k}{M_k}.$$

Nazveme-li pak úhel, jež uzavírají roviny P_i a P_k , krátce $(P_i P_k)$ a použijeme-li vzorce z analytické geometrie známého

$\cos(P_1 P_2) = \cos \alpha_1 \cos \alpha_2 + \cos \beta_1 \cos \beta_2 + \cos \gamma_1 \cos \gamma_2$,
obdržíme velmi snadno

$$\cos(P_1 P_2) = \frac{X_1 X_2 + Y_1 Y_2 + Z_1 Z_2}{M_1 M_2}. \quad (20)$$

Zavedeme-li sinus místo kosinusu, zjednáme si vzorce jednodušší; obdržímeť předešlím

$$\sin^2(P_1 P_2) = \frac{M_1^2 M_2^2 - (X_1 X_2 + Y_1 Y_2 + Z_1 Z_2)^2}{M_1^2 M_2^2};$$

podlé významu veličin M_1 a M_2 a podlé zvláštní poučky o determinantech platící¹⁴⁾ jest ale

$$\begin{aligned} M_1^2 M_2^2 - (X_1 X_2 + Y_1 Y_2 + Z_1 Z_2)^2 \\ = (X_1 Y_2)^2 + (Y_1 Z_2)^2 + (Z_1 X_2)^2; \end{aligned}$$

¹⁴⁾ Poučku příslušnou možná tímto způsobem odůvodniti:

Jestli $A = \Sigma \pm a_1 b_2 \dots l_n$, $B = \Sigma \pm \alpha_1 \beta_2 \dots \lambda_n$, $C = \Sigma \pm A_1 B_2 \dots L_n$
platí jak známé,

$$C = A \cdot B, \quad (1)$$

jestli $A_k = a_1 \alpha_k + b_1 \beta_k + \dots + l_1 \lambda_k$,

$$B_k = a_2 \alpha_k + b_2 \beta_k + \dots + l_2 \lambda_k, \quad (2)$$

.

$$L_k = a_n \alpha_k + b_n \beta_k + \dots + l_n \lambda_k.$$

Poněvadž C jest funkcí veličin A_k , B_k , ..., L_k , jde ze vzorce (1)

$$A \frac{\partial B}{\partial \alpha_k} = \frac{\partial C}{\partial \alpha_k} = \frac{\partial C}{\partial A_k} \cdot \frac{\partial A_k}{\partial \alpha_k} + \dots + \frac{\partial C}{\partial L_k} \frac{\partial L_k}{\partial \alpha_k}$$

neb použijeme-li vzorců (2)

$$A \frac{\partial B}{\partial \alpha_k} = a_1 \frac{\partial C}{\partial A_k} + a_2 \frac{\partial C}{\partial B_k} + \dots + a_n \frac{\partial C}{\partial L_k};$$

taktéž

$$A \frac{\partial B}{\partial \beta_k} = b_1 \frac{\partial C}{\partial A_k} + b_2 \frac{\partial C}{\partial B_k} + \dots + b_n \frac{\partial C}{\partial L_k},$$

.

$$A \frac{\partial B}{\partial l_k} = l_1 \frac{\partial C}{\partial A_k} + l_2 \frac{\partial C}{\partial B_k} + \dots + l_n \frac{\partial C}{\partial L_k}.$$

Znásobíme-li tyto rovnice, jak po sobě jdou, poměry diferenciálními

$$\frac{\partial A}{\partial \alpha_k}, \quad \frac{\partial A}{\partial \beta_k}, \quad \dots, \quad \frac{\partial A}{\partial l_k},$$

dále platí o těchto determinantech stupně druhého skládajících se ze subdeterminantů ¹⁵⁾

$$\begin{aligned}(X_1, Y_2) &= \Delta(z_3 - z_4) \\ (Y_1, Z_2) &= \Delta(x_3 - x_4) \\ (Z_1, X_2) &= \Delta(y_3 - y_4),\end{aligned}$$

z čehož jde, sečteme-li, uvedše napřed na druhou mocninu, pomocí vzorce (18)

$$(X_1, Y_2)^2 + (Y_1, Z_2)^2 + (Z_1, X_2)^2 = \Delta^2 l_{34}^2;$$

dosadíme-li tedy tento výraz do vzorce předešlého, obdržíme konečně

$$\sin(P_1 P_2) = \frac{\Delta l_{34}}{M_1 M_2} \quad (21)$$

a podobně i ostatní až k poslednímu

$$\sin(P_1 P_2) = \frac{\Delta l_{12}}{M_3 M_4}.$$

a sečteme-li na obou stranách, obdržíme, majíce zřetel k známým vzorcům

$$\begin{aligned}a_i \frac{\partial A}{\partial a_k} + b_i \frac{\partial A}{\partial b_k} + \dots + l_i \frac{\partial A}{\partial l_k} &= 0, \\ a_k \frac{\partial A}{\partial a_k} + b_k \frac{\partial A}{\partial b_k} + \dots + l_k \frac{\partial A}{\partial l_k} &= A,\end{aligned}$$

$$\frac{\partial A}{\partial a_k} \frac{\partial B}{\partial a_k} + \frac{\partial A}{\partial b_k} \frac{\partial B}{\partial b_k} + \dots + \frac{\partial A}{\partial l_k} \frac{\partial B}{\partial l_k} = \frac{\partial C}{\partial K_k} \quad (3)$$

Jestli pak ve zvláštním případě všeobecně

$$a = \alpha, b = \beta, c = \gamma, \text{ tedy } A = B, \quad (4)$$

obdrží se konečně vzorec svrchu uvedenou poučku vyjádřující

$$\left(\frac{\partial A}{\partial a_k}\right)^2 + \left(\frac{\partial A}{\partial b_k}\right)^2 + \dots + \left(\frac{\partial A}{\partial l_k}\right)^2 = \frac{\partial C}{\partial K_k}. \quad (5)$$

Jestli tedy na př. $A = \Sigma \pm a_1 b_2 c_3$, bude

$$\begin{aligned}B_2 &= a_2^2 + b_2^2 + c_2^2, \\ B_3 &= a_2 a_3 + b_2 b_3 + c_2 c_3 = C_2 \\ C_3 &= a_3^2 + b_3^2 + c_3^2\end{aligned}$$

$$\frac{\partial A}{\partial a_1} = b_2 c_3 - b_3 c_2, \quad \frac{\partial A}{\partial b_1} = c_2 a_3 - a_2 c_3, \quad \frac{\partial A}{\partial c_1} = a_2 b_3 - a_3 b_2,$$

$$\frac{\partial C}{\partial A_1} = B_2 C_3 - B_3 C_2,$$

a tudíž podle vzorce (5)

$$\begin{aligned}(a_2^2 + b_2^2 + c_2^2)(a_3^2 + b_3^2 + c_3^2) - (a_2 a_3 + b_2 b_3 + c_2 c_3)^2 \\ = (a_2 b_3 - a_3 b_2)^2 + (b_2 c_3 - b_3 c_2)^2 + (c_2 a_3 - c_3 a_2)^2\end{aligned}$$

¹⁵⁾ ibid. pag. 41.

Abychom konečně ustanovili úhly, jež uzavírají jednotlivé hrany, použijme známých vzorců (17) a

$$2P = ab \sin \gamma,$$

načež obdržíme pro plochu P_1

$$\begin{aligned} 2P_1 &= l_{23} l_{34} \sin (234) \\ &= l_{34} l_{42} \sin (342) \\ &= l_{42} l_{23} \sin (423) = M_1, \end{aligned}$$

z čehož jde bezprostředně

$$\sin (234) = \frac{M_1}{l_{23} l_{34}} \text{ a t. d.}$$

Podobně se obdrží v ostatních plochách

$$\sin (341) = \frac{M_2}{l_{34} l_{41}} \text{ a t. d.} \quad (22)$$

$$\sin (412) = \frac{M_3}{l_{41} l_{12}} \text{ a t. d.}$$

$$\sin (123) = \frac{M_4}{l_{12} l_{23}} \text{ a t. d.}$$

Abychom konečně vyšetřili všechny poměry čtyřstěnu, určeného rovnicemi omezujících rovin

$$\begin{aligned} a_1 x + b_1 y + c_1 z + d_1 &= 0, \\ a_2 x + b_2 y + c_2 z + d_2 &= 0, \\ a_3 x + b_3 y + c_3 z + d_3 &= 0, \\ a_4 x + b_4 y + c_4 z + d_4 &= 0, \end{aligned} \quad (23)$$

zjednejme si především souřadnice vrcholů; obdržíme tu, spojující rovnice tyto po třech,

$$\text{z 2., 3. a 4.} \quad x_1 = \frac{A_1}{D_1}, \quad y_1 = \frac{B_1}{D_1}, \quad z_1 = \frac{C_1}{D_1},$$

$$\text{z 3., 4., a 1.} \quad x_2 = \frac{A_2}{D_2}, \quad y_2 = \frac{B_2}{D_2}, \quad z_2 = \frac{C_2}{D_2}, \quad (24)$$

$$\text{z 4., 1. a 2.} \quad x_3 = \frac{A_3}{D_3}, \quad y_3 = \frac{B_3}{D_3}, \quad z_3 = \frac{C_3}{D_3},$$

$$\text{z 1., 2. a 3.} \quad x_4 = \frac{A_4}{D_4}, \quad y_4 = \frac{B_4}{D_4}, \quad z_4 = \frac{C_4}{D_4},$$

značí-li A, B, C, D subdeterminanty patřící k prvkům determinantu

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 & d_3 \\ a_4 & b_4 & c_4 & d_4 \end{vmatrix}. \quad (25)$$

Zavedeme-li hodnoty (24) do vzorce (15), obdržíme pak pro obsah čtyřstěnu T

$$6T = \frac{1}{D_1 D_2 D_3 D_4} \begin{vmatrix} A_1 & B_1 & C_1 & D_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 & D_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 & D_3 \\ A_4 & B_4 & C_4 & D_4 \end{vmatrix};$$

jelikož ale prvky tohoto determinantu patří co subdeterminanty stupně prvního k determinantu (25), rovná se, jsouc stupně čtvrtého, třetí mocnině determinantu původního, z čehož jde, že obsah čtyřstěnu vyjadřuje vzorec jednoduchý

$$6T = \frac{\Delta^3}{D_1 D_2 D_3 D_4}. \quad (26)$$

Jestli tu $\Delta = 0$, jest i $T = 0$, z čehož patrné, že všechny čtyry roviny protínají se v jednom bodě a naopak, protínají-li se čtyry roviny v jednom bodě, jest i $T = 0$.¹⁶⁾,

Znajíce vzorec (26) ustanovíme snadno ploský obsah jednotlivých trojúhelníků čtyřstěn omezujících; jestiž především

$$3T = P_1 p_1,$$

značí-li P_1 ploský obsah trojúhelníku a p_1 příslušnou výšku neb délku kolmice s protějšího rohu na něj spuštěné; dále tu jest

$$p_1 = \frac{a_1 x_1 + b_1 y_1 + c_1 z_1 + d_1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2 + c_1^2}},$$

aneb zavedeme-li hodnoty ze soustavy (24) a položíme-li všeobecně

$$M_k = \sqrt{a_k^2 + b_k^2 + c_k^2}, \quad (27)$$

co konečný vzorec pro délku kolmice p_1

$$p_1 = \frac{\Delta}{D_1 M_1}.$$

¹⁶⁾ ibid. pag. 32.

a podobně pro ostatní

$$p_k = \frac{\Delta}{D_k M_k}. \quad (28)$$

Pomocí vzorce (26) a (28) obdrží se pak velmi snadno všeobecně

$$P_k = \frac{\Delta^2 M_k D_k}{2D_1 D_2 D_3 D_4}. \quad (29)$$

Jestli tedy čtyřstěn pravidelný, platí-li tedy podmínka

$$P_1 = P_2 = P_3 = P_4,$$

jest patrně i

$$D_1 M_1 = D_2 M_2 = D_3 M_3 = D_4 M_4 = K,$$

z čehož se dále poznává, že i

$$p_1 = p_2 = p_3 = p_4 = \frac{\Delta}{K}.$$

Abychom určili úhel a_{pq} , jež uzavírá rovina P_p s rovinou P_q , použijme známého vzorce

$$\cos a_{pq} = \frac{a_p a_q + b_p b_q + c_p c_q}{M_p M_q},$$

načež obdržíme snadno vzorec

$$\sin^2 a_{pq} = \frac{(a_p b_q)^2 + (b_p c_q)^2 + (c_p a_q)^2}{M_p^2 M_q^2}, \quad (30)$$

v jehož čitateli se vyskytují podřízené determinanty stupně druhého.

Chceme-li určití délku jednotlivých hran, považujme ji jakožto vzdálenost dvou bodů v prostoru, načež obdržíme

$$h_{12}^2 = (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2$$

aneb máme-li zřetel k vzorcům (24),

$$h_{12}^2 = \frac{(A_1 D_2)^2 + (B_1 D_2)^2 + (C_1 D_2)^2}{D_1^2 D_2^2};$$

použijeme-li dále známého vzorce

$$(a_1 b_2) \Delta^{n-3} = (C_3 D_4 \dots L_n)^{17},$$

povstane z něho pomocí vzorce (30) konečně

$$h_{12} = \Delta \frac{M_3 M_4}{D_1 D_2} \sin a_{34}; \quad (31)$$

¹⁷⁾ ibid. pag. 41.

podobně se vyjádří ostatní délky až na poslední

$$h_{34} = \Delta \frac{M_1 M_2}{D_3 D_4} \sin a_{12}.$$

Abychom konečně ustanovili úhly rovinné, použijme posledního vzorce ve spojení s (29); obdržíme tu především

$$\begin{aligned} 2P_1 &= h_{23} h_{34} \sin (234) \\ &= h_{34} h_{42} \sin (342) \\ &= h_{42} h_{23} \sin (423) = \frac{\Delta^2 M_1}{D_2 D_3 D_4} \end{aligned}$$

a tudíž pomocí vzorce (29)

$$\begin{aligned} \sin (234) &= \frac{D_3}{M_4 M_1 M_2 \sin a_{12} \sin a_{14}}, \\ \sin (341) &= \frac{D_4}{M_1 M_2 M_3 \sin a_{23} \sin a_{21}}, \\ \sin (412) &= \frac{D_1}{M_2 M_3 M_4 \sin a_{34} \sin a_{32}}, \\ \sin (123) &= \frac{D_2}{M_3 M_4 M_1 \sin a_{41} \sin a_{43}}, \end{aligned} \quad (32)$$

z nichž se i ostatní sinusy výměnou dvou ukazovatelů snadno ustanoví.

Přímý důkaz průkladného vzorce Lagrange-ova.

(Podává dr. F. J. Studnička.)

Má-li se ustanoviti

$$y_n = A_0 + A_1 n + A_2 n^2 + \dots + A_{k-1} n^{k-1}$$

tak, aby pro k hodnot veličiny n , a sice pro

$$n = \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$$

bylo

$$y_n = y_{\alpha_1}, y_{\alpha_2}, \dots, y_{\alpha k},$$

třeba jen vyloučiti k součinitelů

$$A_0, A_1, A_2, \dots, A_{k-1}$$