

Stanislav Jílovec

Последовательные повторение игры при неопределенности

Kybernetika, Vol. 3 (1967), No. 6, (560)--586

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/125011>

Terms of use:

© Institute of Information Theory and Automation AS CR, 1967

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these

Terms of use.



This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library*
<http://project.dml.cz>

Последовательное повторение игры при неопределенности

Станислав Йиловец

Рассматривается повторение игры двух игроков и показывается класс стратегий (= стратегических процессов) II-го игрока гарантирующих, что ожидаемый проигрыш II-го игрока сходится к достижимому минимуму, если число повторений стремится к бесконечности. Эта сходимость равномерна относительно выбора стратегий I-го игрока.

Мы будем заниматься повторением игры двух игроков (A, B, w) . Предполагается, что второй игрок может в k -м шагу (т. е. в k -м повторении игры (A, B, w)) выбирать свою стратегию на основе стратегий, принятых первым игроком в предшествующих $k - 1$ играх или на основе несмещенных оценок этих стратегий. Цель второго игрока — максимализировать свой средний выигрыш для фиксированного числа повторений, которое ему не известно.

На стратегии первого игрока не ставится никаких ограничений. В частности, не предполагается, что поведение первого игрока в течение повторения игры можно описать вероятностным образом, как это предполагается во многих статьях, занимающихся применением опыта в теории игр и в статистических решениях.

С первого взгляда кажется, что в этом случае второму игроку придется принимать минимаксную стратегию. Но это не так. Как показал уже Ханнан, второй игрок может действовать таким образом, что его средняя потеря в первых n играх не превосходит ϱ_n на больше чем c/\sqrt{n} , каково бы ни было n . Здесь c постоянная и ϱ_n обозначает минимум средней потери при условии, что второй игрок с самого начала знает каковы будут частоты стратегий первого игрока после n повторений игры.

Вопросами этого рода впервые занимался Ханнан [1] и исследование продолжали например Э. Самуэл и Ван Рызин, особенно в случае статистических игр. Но проще всего рассматривать повторение статистической игры как повторение обычной игры в которой второму игроку (статистике) доступны только несмещенные оценки стратегий первого игрока (природы).

Чтобы упростить обозначения и доказательства, мы будем предполагать, что множество стратегий первого игрока состоит только из двух точек, несмотря на то, что нижеследующие теоремы имеют силу в случае, если число стратегий первого игрока конечно (некоторые предположения надо конечно выдоизменить) а я надеюсь, что удастся доказать их даже в более общем случае.

Начиная с этого мы условимся в следующем: Заданы вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{S}, \mu)$ и игра (A, B, w) т. е. A, B и Ω — непустые множества, \mathcal{S} — σ -поле подмножеств множества Ω , μ — вероятностная мера на \mathcal{S} и w — такая вещественная функция определенная на $A \times B$, что

$$(1) \quad \sup_{\substack{a \in A \\ b \in B}} w(a, b) = K < \infty.$$

Согласно вышесказанному, мы будем предполагать, что $A = \{0, 1\}$. Для обозначения множества всех целых положительных чисел и множества всех вещественных чисел мы будем употреблять соответственно символы N и R . Символом A обозначим бесконечномерное произведение множеств $A = A \times \dots \times A \times \dots$.

Для дальнейшего удобно распространить область определения функции w на множество $R \times B$ следующим образом

$$(2) \quad w(x, b) = (1 - x)w(0, b) + xw(1, b), \quad x \in R, \quad b \in B.$$

Введем теперь функцию ϱ на R соотношением

$$(3) \quad \varrho(x) = \inf_{b \in B} w(x, b), \quad x \in R.$$

В статистических играх принято называть функцию ϱ Байесовским риском. Известно, что в силу предположения (1) функция ϱ представляет собой непрерывную и вогнутую функцию и таким образом, ее односторонние производные удовлетворяют неравенствам

$$(4) \quad \varrho'_-(x) \geq \varrho'_+(x) \geq \varrho'_-(y) \geq \varrho'_+(y) \quad \text{для всех } x < y.$$

Отображение множества R в множество B мы будем называть процедурой. Процедура β называется ε -оптимальной процедурой, если для всех $x \in R$ выполняется неравенство

$$w(x, \beta(x)) \leq \varrho(x) + \varepsilon.$$

Очевидно, что для положительного ε всегда существует ε -оптимальная процедура.

Последовательность процедур $\{\beta_k\}_{k=1}^{\infty}$ называется регулярной последователь-

562 ностью $\{\varepsilon_k\}$ -оптимальных процедур, если выполняются следующие условия*

$$(P1) \quad w(x, \beta_k(x)) \leq \varrho(x) + \varepsilon_k \quad \text{для всех } x \in R \text{ и } k \in N$$

$$(P2) \quad \max_{j \in (0,1)} \sup_{k \in N} \text{Var } w(j, \beta_k(\cdot)) = c_0 < \infty.$$

Предложение. Если $\{\varepsilon_n\}_{n=1}^{\infty}$ последовательность положительных чисел, то существует регулярная последовательность $\{\varepsilon_n\}$ -оптимальных процедур.

Доказательство. Для каждого $x \in R$ и $k \in N$ существует $b_k(x) \in B$ так, что

$$w(x, b_k(x)) < \varrho(x) + \frac{1}{k}$$

и что существуют пределы $\lim_{k \rightarrow \infty} w(j, b_k(x))$ для $j = 0, 1$. Обозначим

$$(5) \quad w_j(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} w(j, b_k(x)), \quad x \in R, \quad j = 0, 1.$$

Очевидно, что

$$(6) \quad \varrho(x) = (1-x)w_0(x) + xw_1(x), \quad x \in R.$$

Покажем, прежде всего, что функция $w_j(\cdot)$ не возрастает в промежутке $(-\infty, j)$ и не убывает в промежутке $(j, +\infty)$, $j = 0, 1$. Так как

$$(1-x)w_0(y) + xw_1(y) = \lim_{n \rightarrow \infty} w(x, b_n(y)) \geq \varrho(x),$$

$$(1-y)w_0(x) + yw_1(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} w(y, b_n(x)) \geq \varrho(y), \quad x, y \in R,$$

то согласно (5) отсюда следует

$$x(w_1(x) - w_1(y)) \leq (1-x)(w_0(y) - w_0(x)),$$

$$(1-y)(w_0(y) - w_0(x)) \leq y(w_1(x) - w_1(y)).$$

Таким образом, если $x < y < 1$, то

$$\left(\frac{x}{1-x} - \frac{y}{1-y} \right) (w_1(x) - w_1(y)) \leq 0$$

и, следовательно, $w_1(x) \geq w_1(y)$; если $1 < x < y$, то имеют место обратные неравенства. Значит, утверждение касающееся функции w_1 , доказано. Кусочная монотонность функции w_0 доказывается вполне аналогичным образом.

Зафиксируем теперь $n \in N$ и обозначим

$$\varepsilon = \min \{1, \varepsilon_n\}$$

* Если f вещественная функция на R , то $\text{Var } f$ обозначает изменение f в R .

$$(7) \quad E_{i,j}^{(r)} = (r, r+1) \cap \\ \cap \left\{ x : \frac{\varepsilon i}{4(|r|+1)} + w_0(r) < w_0(x) \leq \frac{\varepsilon(i+1)}{4(|r|+1)} + w_0(r) \right\} \cap \\ \cap \left\{ x : \frac{\varepsilon j}{4(|r|+1)} + w_1(r) < w_1(x) \leq \frac{\varepsilon(j+1)}{4(|r|+1)} + w_1(r) \right\}, \\ r, j, i = \dots, -1, 0, 1, \dots$$

Выберем теперь из каждого непустого множества $E_{i,j}^{(r)}$ по одной точке. Пусть $\{x_m\}_{m \in S}$ последовательность всех выбранных точек. Так как w_0 и w_1 ограничены, то для фиксированного r только конечное число множеств $E_{i,j}^{(r)}$ не пусто. Таким образом, последовательность $\{x_m\}_{m \in S}$ не имеет собственных предельных точек, и, следовательно, мы можем последовательность $\{x_m\}_{m \in S}$ занумеровать целыми числами так, что $x_m < x_{m+1}$, $m = \dots, -1, 0, 1, \dots$. Символом E_m , $m = \dots, -1, 0, 1, \dots$, обозначим множество, из которого выбрана точка x_m . Заметим, что множества E_m , $m = \dots, -1, 0, 1, \dots$, образуют разбиение множества R .

Для каждого целого m существует ввиду (5) такой номер $k_m \in N$, что

$$(8) \quad \max_{j \in \{0,1\}} |w_j(x_m) - w(j, b_{k_m}(x_m))| < \frac{\varepsilon}{6 \cdot 2^{|m|}(\lceil |x_m| \rceil + 1)}.$$

Определим процедуру β_n соотношением

$$(9) \quad \beta_n(x) = b_{k_m}(x_m) \quad \text{если } x \in E_m.$$

Пусть $x \in R$. Если $x \in E_m$, то согласно (6), (7), (8) и (9)

$$(1-x)w(0, \beta_n(x)) + xw(1, \beta_n(x)) - \varrho(x) \leq \\ \leq |1-x| |w(0, b_{k_m}(x_m)) - w_0(x_m)| + |x| |w(1, b_{k_m}(x_m)) - w_1(x_m)| + \\ + |1-x| |w_0(x_m) - w_0(x)| + |x| |w_1(x_m) - w_1(x)| < \varepsilon \leq \varepsilon_n.$$

Значит, β_n — ε_n -оптимальная процедура. Оценим теперь изменение функции $(w_j, \beta_n(\cdot))$. Если $y_0 < y_1 < \dots < y_k$, $j \in \{0, 1\}$, то в силу (8) и (9)

$$\sum_{i=1}^k |w(j, \beta_n(y_i)) - w(j, \beta_n(y_{i-1}))| \leq \\ \leq \sum_{m=-\infty}^{\infty} |w(j, \beta_n(x_m)) - w(j, \beta_n(x_{m-1}))| \leq \\ \leq \sum_{m=-\infty}^{\infty} |w(j, \beta_n(x_m)) - w_j(x_m)| + \sum_{m=-\infty}^{\infty} |w_j(x_m) - w_j(x_{m-1})| + \\ + \sum_{m=-\infty}^{\infty} |w_j(x_{m-1}) - w(j, \beta_n(x_{m-1}))| \leq \varepsilon + \text{Var } w_j \leq 1 + \text{Var } w_j.$$

564 Так как $w_j(\cdot)$ является ограниченной и кусочно монотонной функцией, то $\text{Var } w_j < \infty$, так что имеет место (P2). Предложение доказано.

Лемма 1. Пусть $x \in \mathbb{R}$. Если $\{b_k\}_{k=1}^{\infty}$ такая последовательность точек множества B , что

$$\lim_{k \rightarrow \infty} w(x, b_k) = \varrho(x),$$

то имеют место неравенства

$$(11) \quad (\xi - x) \varrho'_-(x) + \varrho(x) \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} w(\xi, b_k) \leq \\ \leq \limsup_{k \rightarrow \infty} w(\xi, b_k) \leq (\xi - x) \varrho'_+(x) + \varrho(x)$$

для $\xi \leq x$ и

$$(12) \quad (\xi - x) \varrho'_+(x) + \varrho(x) \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} w(\xi, b_k) \leq \\ \leq \limsup_{k \rightarrow \infty} w(\xi, b_k) \leq (\xi - x) \varrho'_-(x) + \varrho(x)$$

для $\xi \geq x$.

Доказательство. Покажем, прежде всего, что

$$(13) \quad \varrho'_+(x) \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} (w(1, b_k) - w(0, b_k)) \leq \\ \leq \limsup_{k \rightarrow \infty} (w(1, b_k) - w(0, b_k)) \leq \varrho'_-(x).$$

Так как

$$w(x + h, b_k) \geq \varrho(x + h), \quad h \in \mathbb{R},$$

то

$$w(x + h, b_k) - w(x, b_k) \geq \varrho(x + h) - \varrho(x) + \varrho(x) - w(x, b_k).$$

Согласно (2) отсюда следует, что

$$w(1, b_k) - w(0, b_k) \geq \frac{\varrho(x + h) - \varrho(x)}{h} + \frac{\varrho(x) - w(x, b_k)}{h}$$

для $h > 0$ и

$$w(1, b_k) - w(0, b_k) \leq \frac{\varrho(x + h) - \varrho(x)}{h} + \frac{\varrho(x) - w(x, b_k)}{h}$$

для $h < 0$. Переходя теперь к пределу при $k \rightarrow \infty$ и затем при $h \rightarrow 0$, получим (13).

Чтобы доказать неравенства (11) и (12), хватит применить (13) к тождеству

$$w(\xi, b_k) = (\xi - x)(w(1, b_k) - w(0, b_k)) + (1 - x)w(0, b_k) + xw(1, b_k).$$

Из предыдущей леммы непосредственно вытекает, что для каждого положительного ε существует процедура β , удовлетворяющая для всех $x \in \langle 0, 1 \rangle$ неравенствам

$$(14) \quad \varrho(x) + (\xi - x) \varrho'_-(x) - \varepsilon \leq w(\xi, \beta(x)) \leq \varrho(x) + (\xi - x) \varrho'_+(x) + \varepsilon,$$

если $0 \leq \xi \leq x$, и

$$(15) \quad \varrho(x) + (\xi - x) \varrho'_+(x) - \varepsilon \leq w(\xi, \beta(x)) \leq \varrho(x) + (\xi - x) \varrho'_-(x) + \varepsilon,$$

если $x \leq \xi \leq 1$.*

Докажем теперь более убедительное утверждение.

Лемма 2. *Каково бы ни было $\varepsilon > 0$, существует процедура β , удовлетворяющая условиям (14), (15) и*

$$(16) \quad |w(1, \beta(0)) - \varrho(0) - \varrho'_+(0)| \leq \varepsilon,$$

$$(17) \quad |w(0, \beta(1)) - \varrho(1) + \varrho'_-(1)| \leq \varepsilon.$$

Доказательство. Пусть $\{\varepsilon_i\}_{i=1}^{\infty}$ — последовательность положительных чисел, $\varepsilon_i \rightarrow 0$, и пусть β_k — процедура, удовлетворяющая неравенствам (14) и (15) для $\varepsilon = \varepsilon_k$, $k = 1, 2, \dots$. Согласно (12), существует такая последовательность $\{\alpha_k\}_{k=1}^{\infty}$, сходящаяся к 0 справа, что

$$\begin{aligned} w(0, \beta_k(\alpha_k)) &\leq \varrho(0) + \varepsilon_k, \quad k = 1, 2, \dots, \\ \limsup_{k \rightarrow \infty} (w(1, \beta_k(\alpha_k)) - \varrho(\alpha_k) - (1 - \alpha_k) \varrho'_-(\alpha_k)) &= 0. \end{aligned}$$

Но так как ϱ вогнутая функция, то

$$\lim_{x \rightarrow 0+} (\varrho(x) + (1 - x) \varrho'_-(x)) = \varrho(0) + \varrho'_+(0)$$

и, следовательно,

$$(18) \quad \limsup_{k \rightarrow \infty} w(1, \beta_k(\alpha_k)) = \varrho(0) + \varrho'_+(0).$$

Если определить

$$\left. \begin{aligned} \tilde{\beta}_k(x) &= \beta_k(x) \quad \text{для } x \neq 0 \\ \tilde{\beta}_k(0) &= \beta_k(\alpha_k) \end{aligned} \right\} k = 1, 2, \dots,$$

то $\tilde{\beta}_k$, $k = 1, 2, \dots$, представляет собой ε_k -оптимальную процедуру и в силу

* Заметим, что процедура β представляет собой ε -оптимальную процедуру, как следует из (14), если положить $\xi = x$.

566 (18) и (12) имеет место

$$(19) \quad \lim_{k \rightarrow \infty} w(1, \beta_k(0)) = \varrho(0) + \varrho'_+(0).$$

Таким образом, видоизменением последовательности процедур $\{\beta_k\}_{k=1}^{\infty}$ в точке $x = 0$, мы получили последовательность процедур $\{\tilde{\beta}_k\}_{k=1}^{\infty}$, удовлетворяющую, помимо неравенств (14) и (15), еще условию (19). Аналогичным образом можно видоизменить последовательность процедур $\{\tilde{\beta}_k\}_{k=1}^{\infty}$ в точке $x = 1$ так, что

$$(20) \quad \lim_{k \rightarrow \infty} w(0, \tilde{\beta}_k(1)) = \varrho(1) - \varrho'_-(1).$$

В силу предположения, что $\varepsilon_k \rightarrow 0$ и в силу (19) и (20), существует такой номер $k = k(\varepsilon)$, что процедура $\beta = \tilde{\beta}_{k(\varepsilon)}$ обладает свойствами (14), (15), (16) и (17), каково бы ни было $\varepsilon > 0$.

Определение 1. Если для каждого $k \in N$ b_k представляет собой такое отображение множества $\Omega \times A$ в множество B , что

1) для фиксированного $\mathbf{a} \in A$ $w(0, b_k(\cdot; \mathbf{a}))$ и $w(1, b_k(\cdot; \mathbf{a}))$ являются случайными величинами

2) для фиксированного $\omega \in \Omega$ $b_k(\omega; \mathbf{a})$ зависит только от первых $k - 1$ координат точки \mathbf{a} , то последовательность $\{b_k\}_{k=1}^{\infty}$ называется стратегическим процессом второго игрока в последовательном повторении игры (A, B, w) .

Ниже мы будем стратегический процесс второго игрока в последовательном повторении игры (A, B, w) просто называть стратегическим процессом.

Стратегический процесс называется простым, если для фиксированного $\omega \in \Omega$ и $k \in N$ $b_k(\omega; \mathbf{a})$ зависит только от суммы первых $k - 1$ координат точки \mathbf{a} , и называется детерминистическим, если $b_k(\omega; \mathbf{a})$ не зависит от ω .

Не трудно доказать, что для каждого стратегического процесса $\{b_k\}_{k=1}^{\infty}$ существует такая последовательность стратегий первого игрока $\{a_k\}_{k=1}^{\infty}$, что

$$E \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n w(a_k, b_k(\cdot; a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, \dots)) \geq \varrho \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \right)$$

для всех $n \in N$.

Заметим еще, что (см. [1], теорема 1) имеет место неравенство

$$\varrho(x) \geq \inf_{\{b_k\}_{k=1}^{\infty}} \sup_{M_{n,x}} E \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n w(a_k, b_k(\cdot; a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, \dots)) \geq \varrho(x) - \frac{c}{\sqrt{n}}.$$

Здесь c постоянная, зависящая только от функции w , $M_{n,x} = \{ \{a_k\}_{k=1}^{\infty} : a_k \in A, n^{-1} \sum_{i=1}^n a_i = x \}$, и $\{b_k\}_{k=1}^{\infty}$ — стратегический процесс.

Таким образом, вполне естественно определять оптимальность стратегического процесса следующим образом.

Определение 2. Стратегический процесс $\{b_k\}_{k=1}^{\infty}$ называется оптимальным относительно риска, если для каждого $\varepsilon > 0$ существует такой номер $n_0 = n_0(\varepsilon)$, что

$$E \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n w(a_k, b_k(\cdot; a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, \dots)) \leq \varrho \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \right) + \varepsilon$$

для всех $n \geq n_0$ и всех $(a_1, a_2, \dots) \in \mathbf{A}$.

Возникает вопрос, какими свойствами обладает стратегический процесс, оптимальный относительно риска, предполагая дополнительно, что последовательность стратегий первого игрока представляет собой последовательность независимых и одинаково распределенных случайных величин. Ответ дается следующей теоремой

Теорема 1. Пусть стратегический процесс $\{b_k\}_{k=1}^{\infty}$ оптимален относительно риска. Тогда для каждого $\varepsilon > 0$ существует такой номер $n_0 \in \mathbf{N}$, что для каждого $n \geq n_0$ и для каждой последовательности $\{\xi_k\}_{k=1}^{\infty}$ независимых и одинаково распределенных случайных величин, принимающих значения в множестве \mathbf{A} , имеет место неравенство

$$0 \leq E \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n w(\xi_k, b_k(\cdot; \xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{k-1}, \dots)) - \varrho(E\xi_1) < \varepsilon,$$

если

$$w(j, b_k(\cdot; \xi_1(\cdot), \xi_2(\cdot), \dots, \xi_{k-1}(\cdot), \dots)), \quad j = 0, 1, \quad k = 1, 2, \dots,$$

представляют собой случайные величины.

Доказательство. Так как

$$|\varrho(x) - \varrho(y)| \leq |\varrho'_+(0)| \cdot |x - y|, \quad x, y \geq 0,$$

то в силу неравенства Буняковского и независимости случайных величин ξ_k имеет место

$$\begin{aligned} E \left(\varrho \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k \right) - \varrho(E\xi_1) \right) &\leq |\varrho'_+(0)| E \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k - E\xi_1 \right| \leq \\ &\leq |\varrho'_+(0)| \sqrt{E \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\xi_k - E\xi_1)^2 \right)} = |\varrho'_+(0)| \sqrt{\frac{1}{n} E(\xi_1 - E\xi_1)^2} \leq \frac{|\varrho'_+(0)|}{4\sqrt{n}}. \end{aligned}$$

Обозначим

$$S_n(\omega) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n w(\xi_k(\omega), b_k(\omega; \xi_1(\omega), \xi_2(\omega), \dots, \xi_{k-1}(\omega), \dots)), \quad n \in \mathbf{N}, \quad \omega \in \Omega$$

и фиксируем $\varepsilon > 0$. Так как стратегический процесс $\{b_k\}_{k=1}^\infty$ оптимален относительно риска, существует такой номер $n_1 \in N$, что

$$\begin{aligned} & E(S_n - \varrho \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k \right) \mid \xi_1(\omega) = a_1, \xi_2(\omega) = a_2, \dots) = \\ & = E \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n w(a_k, b_k(\cdot; a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, \dots)) - \varrho \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \right) < \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

для каждого $n \geq n_1$ и каждой последовательности $(a_1, a_2, \dots) \in A$. Если представить ES_n в виде

$$ES_n - \varrho(E\xi_1) = E(E(S_n - \varrho \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k \right) \mid \xi_1, \xi_2, \dots)) + E(\varrho \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k \right) - \varrho(E\xi_1)),$$

то из вышесказанного следует, что для $n \geq \max\{n_1, (\varrho'_+(0)/2\varepsilon)^2\}$

$$ES_n - \varrho(E\xi_1) < \varepsilon,$$

какова бы ни была последовательность независимых и одинакового распределенных случайных величин $\{\xi_k\}_{k=1}^\infty$.

Остается доказать, что $ES_n \geq \varrho(E\xi_1)$. Обозначим

$$\begin{aligned} w_j^{(k)}(\omega) &= w(j, b_k(\omega; \xi_1(\omega), \xi_2(\omega), \dots)), \\ j &= 0, 1, \quad k \in N, \quad \omega \in \Omega. \end{aligned}$$

Достаточно показать, что для каждого $k \in N$

$$E((1 - \xi_k) w_0^{(k)} + \xi_k w_1^{(k)}) \geq \varrho(E\xi_1).$$

Но согласно известным свойствам условных математических ожиданий

$$\begin{aligned} E((1 - \xi_k) w_0^{(k)} + \xi_k w_1^{(k)}) &= EE((1 - \xi_k) w_0^{(k)} + \xi_k w_1^{(k)} \mid w_0^{(k)}, w_1^{(k)}) = \\ &= E(w_0^{(k)} E(1 - \xi_k \mid w_0^{(k)}, w_1^{(k)}) + w_1^{(k)} E(\xi_k \mid w_0^{(k)}, w_1^{(k)})) = \\ &= E(w_0^{(k)}(1 - E\xi_1) + w_1^{(k)} E\xi_1) \geq E\varrho(E\xi_1) = \varrho(E\xi_1) \end{aligned}$$

и это требовалось доказать.

Теперь мы будем заниматься существованием стратегических процессов оптимальных относительно риска.

Теорема 2. Пусть $\{\varepsilon_k\}_{k=1}^\infty$ последовательность неотрицательных чисел, сходящаяся к нулю и $\{\beta_k\}_{k=1}^\infty$ последовательность процедур, удовлетворяющая условиям

$$(21) \quad \varrho(x) + (\xi - x) \varrho'_-(x) - \varepsilon_k \leq w(\xi, \beta_k(x)) \leq \varrho(x) + (\xi - x) \varrho'_+(x) + \varepsilon_k,$$

если $0 \leq \xi \leq x$,

$$(22) \quad \varrho(x) + (\xi - x) \varrho'_+(x) - \varepsilon_k \leq w(\xi, \beta_k(x)) \leq \varrho(x) + (\xi - x) \varrho'_-(x) + \varepsilon_k,$$

если $x \leq \xi \leq 1$,

$$(23) \quad |w(0, \beta_k(1)) - \varrho(1) + \varrho'_-(1)| \leq \varepsilon_k$$

$$(24) \quad |w(1, \beta_k(0)) - \varrho(0) - \varrho'_+(0)| \leq \varepsilon_k$$

для всех $k \in N$, $x \in \langle 0, 1 \rangle$, $\xi \in \langle 0, 1 \rangle$.

Тогда детерминистический стратегический процесс $\{\beta_k\}_{k=1}^{\infty}$ определяемый равенством

$$b_k(a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, \dots) = \beta_k \left(\frac{1}{k-1} \sum_{i=1}^{k-1} a_i \right), \quad k = 1, 2, \dots^*$$

является оптимальным относительно риска только тогда, если функция ϱ имеет производную в открытом промежутке $(0, 1)$.

Подчеркнем, что последовательность процедур $\{\beta_k\}_{k=1}^{\infty}$, удовлетворяющая условиям (21)–(24), в силу леммы 2, существует всегда, если $\varepsilon_k > 0$ для $k = 1, 2, \dots$.

Доказательство необходимости. Предположим, что функция ϱ не имеет производную в точке $x \in (0, 1)$, так что $\varrho'_+(x) < \varrho'_-(x)$. Мы построим такую последовательность $\{a_k\}_{k=1}^{\infty}$ стратегий первого игрока, что

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n w(a_k, b_k(a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, \dots)) - \varrho \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \right) \geq \\ \geq x(1-x) \frac{\varrho'_-(x) - \varrho'_+(x)}{2}.$$

В силу (21) и (22) имеют место неравенства

$$w(0, \beta_k(\xi)) \geq \varrho(x) - x \varrho'_+(x) - \varepsilon_k, \quad \text{если } \xi > x$$

$$w(1, \beta_k(\xi)) \geq \varrho(x) + (1-x) \varrho'_-(x) - \varepsilon_k, \quad \text{если } \xi < x.$$

Так как $\varrho(x) \leq (1-x)w(0, \beta_k(x)) + xw(1, \beta_k(x))$, то не трудно обнаружить, что неравенство

$$w(0, \beta_k(x)) < \varrho(x) - \frac{1}{2}x(\varrho'_+(x) + \varrho'_-(x)) + \frac{\varepsilon_k}{1-x}$$

влечет за собой неравенство

$$w(1, \beta_k(x)) > \varrho(x) + \frac{1}{2}(1-x)(\varrho'_+(x) + \varrho'_-(x)) - \frac{\varepsilon_k}{x}.$$

* Для $k = 1$ определим $\frac{1}{k-1} \sum_{i=1}^{k-1} a_i = 0$.

570 Определим теперь последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ следующим образом:

$$a_1 = 1,$$

и для $n > 1$

$$a_n = 1, \text{ если } \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} a_i < x \text{ или если}$$

$$\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} a_i = x \text{ и } w(0, \beta_n(x)) < \varrho(x) - \frac{x}{2} (\varrho'_+(x) + \varrho'_-(x)) + \frac{\varepsilon_k}{1-x},$$

и

$$a_n = 0, \text{ если } \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} a_i > x \text{ или если}$$

$$\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} a_i = x \text{ и } w(0, \beta_n(x)) \geq \varrho(x) - \frac{x}{2} (\varrho'_+(x) + \varrho'_-(x)) + \frac{\varepsilon_k}{1-x}.$$

Очевидно, что

$$(25) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i = x$$

и что

$$(26) \quad w\left(a_k, \beta_k\left(\frac{1}{k-1} \sum_{i=1}^{k-1} a_i\right)\right) \geq \\ \geq (-\varepsilon_k + a_k(\varrho(x) + (1-x)\varrho'_-(x)) + (1-a_k)(\varrho(x) - x\varrho'_+(x)))(1-d_k) + \\ + c_k\left(\varrho(x) + \frac{1}{2}(1-x)(\varrho'_+(x) + \varrho'_-(x)) - \frac{\varepsilon_k}{x}\right) + \\ + (d_k - c_k)\left(\varrho(x) - \frac{1}{2}x(\varrho'_+(x) + \varrho'_-(x)) + \frac{\varepsilon_k}{1-x}\right), \quad k = 1, 2, \dots$$

Здесь

$$c_k = 1, \text{ если}$$

$$\frac{1}{k-1} \sum_{i=1}^{k-1} a_i = x \text{ и } w(0, \beta_k(x)) < \varrho(x) - \frac{x}{2} (\varrho'_+(x) + \varrho'_-(x)) + \frac{\varepsilon_k}{1-x},$$

$$c_k = 0 \text{ в противоположном случае}$$

и

$$d_k = 1, \text{ если } \frac{1}{k-1} \sum_{i=1}^{k-1} a_i = x;$$

$$d_k = 0 \text{ в противоположном случае.}$$

Суммированием неравенств (26) мы получим

$$\begin{aligned} & \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n w \left(a_k, \beta_k \left(\frac{1}{k-1} \sum_{i=1}^{k-1} a_i \right) \right) - \varrho \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \right) \cong \\ & \cong - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n e_k \left(1 + \frac{c_k}{x} - \frac{d_k - c_k}{1-x} \right) + \\ & + \left(\varrho(x) - \varrho \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \right) + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k (1-x) \varrho'_-(x) - \left(1 - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \right) x \varrho'_+(x) \right) + \\ & + \frac{1}{2} (\varrho'_-(x) - \varrho'_+(x)) \left(- \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n c_k (1-x) - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (d_k - c_k) x \right). \end{aligned}$$

При $n \rightarrow \infty$ первое слагаемое очевидно сходится к 0 и второе, согласно (25), сходится к $x(1-x)(\varrho'_-(x) - \varrho'_+(x))$. Теперь будем оценивать третье слагаемое. Если x иррациональное число, то $c_k = d_k = 0$ для всех $k \in N$. Если $x = r/s$ где r и s представляют собой взаимно простые числа, то $(1/n) \sum_{k=1}^n d_k < 1/s$, и, следовательно,

$$(27) \quad \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n d_k < \min \{x, 1-x\}.$$

Рассмотрим теперь функцию от ξ

$$f(\xi) = x(1-x) - \xi(1-x) - (D - \xi)x,$$

где $0 < x < 1$ и $0 \leq D < \min \{x, 1-x\}$. В соответствии с этим предположением $f(0) > 0$ и $f(D) > 0$, и так как f линейная функция, то $f(\xi) > 0$ для всех $\xi \in \langle 0, D \rangle$. В силу (27) отсюда следует, что

$$- \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n c_k (1-x) - \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n d_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n c_k \right) x \cong x(1-x).$$

Таким образом,

$$\begin{aligned} \liminf_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n w \left(a_k, \beta_k \left(\frac{1}{k-1} \sum_{i=1}^{k-1} a_i \right) \right) - \varrho \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \right) \right) & \cong \\ & \cong \frac{1}{2} x(1-x) (\varrho'_-(x) - \varrho'_+(x)), \end{aligned}$$

что и требовалось доказать.

Доказательство достаточности. В этом доказательстве условимся обозначать левостороннюю производную функции ϱ в точке $x = 1$ символом $\varrho'(1)$ и правостороннюю производную в точке $x = 0$ символом $\varrho'(0)$. Подчеркнем, прежде всего, что существование производной в открытом интервале $(0, 1)$

влечет за собой равномерную непрерывность функции q' в замкнутом интервале $\langle 0, 1 \rangle$. Это следует из общеизвестных свойств вогнутых функций и того, что в силу (1) односторонние производные функции q ограничены.

Обозначим

$$\begin{aligned}\bar{a}_0 &= 0, \\ \bar{a}_n &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k, \\ Q_n(a_1, a_2, \dots) &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n w(a_k, \beta_k(\bar{a}_k)) - q(\bar{a}_n), \\ P_n(a_1, a_2, \dots) &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (w(a_k, \beta_k(\bar{a}_{k-1})) - w(a_k, \beta_k(\bar{a}_k))), \\ n &= 1, 2, \dots\end{aligned}$$

Таким образом,

$$(28) \quad \begin{aligned}\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n w(a_k, b_k(a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, \dots)) - q\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k\right) = \\ = Q_n(a_1, a_2, \dots) + P_n(a_1, a_2, \dots).\end{aligned}$$

Очевидно, что

$$\begin{aligned}Q_n(a_1, a_2, \dots) &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n w(k\bar{a}_k - (k-1)\bar{a}_{k-1}, \beta_k(\bar{a}_k)) - q(\bar{a}_n) = \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (kw(\bar{a}_k, \beta_k(\bar{a}_k)) - (k-1)w(\bar{a}_{k-1}, \beta_k(\bar{a}_k))) - q(\bar{a}_n) = \\ &= w(\bar{a}_n, \beta_n(\bar{a}_n)) - q(\bar{a}_n) + \\ &+ \frac{1}{n} \sum_{k=2}^n (k-1)(w(\bar{a}_{k-1}, \beta_{k-1}(\bar{a}_{k-1})) - w(\bar{a}_{k-1}, \beta_k(\bar{a}_k))).\end{aligned}$$

Так как

$$\begin{aligned}w(\bar{a}_n, \beta_n(\bar{a}_n)) &\leq q(\bar{a}_n) + \varepsilon_n, \\ w(\bar{a}_{k-1}, \beta_{k-1}(\bar{a}_{k-1})) &\leq w(\bar{a}_{k-1}, \beta_k(\bar{a}_k)) + \varepsilon_{k-1},\end{aligned}$$

то

$$(29) \quad Q_n(a_1, a_2, \dots) \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \varepsilon_k.$$

Теперь будем оценивать $P_n(a_1, a_2, \dots)$. Так как мы предполагаем, что q имеет производную в промежутке $(0, 1)$, то согласно (21)–(24) имеет место

$$\sup_{x \in \langle 0, 1 \rangle} \max_{\xi \in [0, 1]} |w(\xi, \beta_k(x)) - q(x) - (\xi - x)q'(x)| < \varepsilon_k$$

и, следовательно

$$\begin{aligned} & w(a_k, \beta_k(\bar{a}_{k-1})) - w(a_k, \beta_k(\bar{a}_k)) \leq \\ & \leq \varrho(\bar{a}_{k-1}) + (a_k - \bar{a}_{k-1}) \varrho'(\bar{a}_{k-1}) - \varrho(\bar{a}_k) - (a_k - \bar{a}_k) \varrho'(\bar{a}_k) + 2\varepsilon_k, \quad k = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

Если $\varepsilon > 0$, то в силу равномерной непрерывности ϱ' в $\langle 0, 1 \rangle$ существует такое $\delta > 0$, что

$$\max_{\xi \in (0,1)} |\varrho(x) + (\xi - x) \varrho'(x) - \varrho(y) - (\xi - y) \varrho'(y)| < \varepsilon$$

если $x, y \in \langle 0, 1 \rangle$ и $|x - y| < \delta$. Ввиду того, что последовательность $s_n(a_1, a_2, \dots) = \bar{a}_n - \bar{a}_{n-1}$, $n = 1, 2, \dots$, сходится к 0 равномерно на \mathbf{A} , существует такой номер k_0 , что для всех $(a_1, a_2, \dots) \in \mathbf{A}$ и $k \geq k_0$ имеет место неравенство $|\bar{a}_k - \bar{a}_{k-1}| < \delta$. Следовательно,

$$|\varrho(\bar{a}_{k-1}) + (a_k - \bar{a}_{k-1}) \varrho'(\bar{a}_{k-1}) - \varrho(\bar{a}_k) - (a_k - \bar{a}_k) \varrho'(\bar{a}_k)| < \varepsilon$$

для всех $k \geq k_0$ и $(a_1, a_2, \dots) \in \mathbf{A}$. Таким образом,

$$\begin{aligned} P_n(a_1, a_2, \dots) & \leq \frac{2}{n} \sum_{k=1}^n \varepsilon_k + \\ & + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{k_0} (w(a_k, \beta_k(\bar{a}_{k-1})) - w(a_k, \beta_k(\bar{a}_k))) + \frac{n - k_0}{n} \varepsilon \end{aligned}$$

и согласно (1)

$$(30) \quad P_n(a_1, a_2, \dots) \leq \frac{2}{n} \sum_{k=1}^n \varepsilon_k + \frac{2k_0 K}{n} + \frac{n - k_0}{n} \varepsilon.$$

Из (28), (29) и (30) непосредственно следует, что стратегический процесс $\{b_k\}_{k=1}^{\infty}$ является оптимальным относительно риска.

Теперь мы приведем одну лемму, которая нам понадобится в доказательстве следующей теоремы.

Лемма 3. Пусть F_1 и F_2 — функции распределения, f — вещественная функция, определенная на R . Если f имеет конечное изменение в R , то

$$\left| \int f dF_1 - \int f dF_2 \right| \leq \text{Var } f \cdot \sup_{x \in R} |F_1(x) - F_2(x)|,$$

где интегралы понимаются в смысле Лебега-Стилтьеса.

Доказательство. Так как f имеет конечное изменение, то существуют такие неубывающие и ограниченные функции f_1 и f_2 , что $f = f_1 - f_2$ и $\text{Var } f = \text{Var } f_1 + \text{Var } f_2$. Таким образом, достаточно доказать лемму в случае,

574 когда f не убывает. В этом случае

$$\text{Var } f = f(+\infty) - f(-\infty),$$

где

$$f(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \quad \text{и} \quad f(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x).$$

Обозначим

$$E_{m,j} = \left\{ x : f(-\infty) + \frac{j-1}{m} \text{Var } f < f(x) \leq f(-\infty) + \frac{j}{m} \text{Var } f \right\},$$

$$j = 0, 1, \dots, m, \quad m = 1, 2, \dots,$$

$$f_m(x) = \sum_{j=0}^m \left(f(-\infty) + \frac{j}{m} \text{Var } f \right) \chi_{E_{m,j}}(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Здесь $\chi_{E_{m,j}}$ обозначает индикатор множества $E_{m,j}$. Очевидно, что f_m представляют собой ограниченные измеримые в смысле Бореля функции и

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |f_m(x) - f(x)| \leq \frac{\text{Var } f}{m}, \quad m = 1, 2, \dots$$

Таким образом,

$$\left| \int f \, dF_1 - \int f \, dF_2 \right| \leq \int |f - f_m| \, dF_1 + \int |f - f_m| \, dF_2 +$$

$$+ \left| \int f_m \, dF_1 - \int f_m \, dF_2 \right| \leq \frac{2 \text{Var } f}{m} + \left| \int f_m \, dF_1 - \int f_m \, dF_2 \right|.$$

Пусть μ_i — вероятностная мера, соответствующая функции распределения F_i , $i = 1, 2$. Согласно определению функции f_m , имеет место

$$\int f_m \, dF_1 - \int f_m \, dF_2 = \frac{\text{Var } f}{m} \sum_{j=1}^m j (\mu_1(E_{m,j}) - \mu_2(E_{m,j})) =$$

$$= \frac{\text{Var } f}{m} \sum_{j=1}^m (\mu_1(\bigcup_{k=j}^m E_{m,k}) - \mu_2(\bigcup_{k=j}^m E_{m,k})) =$$

$$= \frac{\text{Var } f}{m} \sum_{j=1}^m (\mu_2(\bigcup_{k=0}^{j-1} E_{m,k}) - \mu_1(\bigcup_{k=0}^{j-1} E_{m,k})).$$

В силу предположения, что f не убывает, множество $\bigcup_{k=0}^{j-1} E_{m,k}$, $j = 1, 2, \dots, m$, представляет собой промежуток вида $(-\infty, a)$ или $(-\infty, a]$. Множество $E_{m,0}$ может быть тоже пустым. Отсюда следует, что

$$|\mu_2(\bigcup_{k=0}^{j-1} E_{m,k}) - \mu_1(\bigcup_{k=0}^{j-1} E_{m,k})| \leq \sup_{x \in \mathbb{R}} |F_1(x) - F_2(x)|,$$

$$\left| \int f dF_1 - \int f dF_2 \right| \leq \text{Var } f \sup_{x \in \mathbb{R}} |F_1(x) - F_2(x)| + \frac{2 \text{Var } f}{m}, \quad m \in N,$$

и это доказывает лемму.

Теорема 3. Пусть $\{\gamma_k\}_{k=0}^\infty$ — последовательность вещественных чисел, $\{\alpha_k\}_{k=0}^\infty$ — такая последовательность положительных чисел, что

$$(C1) \quad k\alpha_k \leq (k+1)\alpha_{k+1} \quad \text{для } k = 0, 1, \dots$$

и $\{z_k\}_{k=0}^\infty$ — последовательность случайных величин, удовлетворяющих следующим условиям:

$$(C2) \quad \sup_{k \in N \cup \{0\}} E|z_k| = c_1 < \infty,$$

$$(C3) \quad E(z_k | z_{k+1}) = (1 - \gamma_k) z_{k+1} \quad \text{н. в.}, \quad k = 0, 1, \dots$$

Обозначим символом F_k функцию распределения случайной величины z_k , $k = 0, 1, \dots$. Если $\{\beta_k\}_{k=0}^\infty$ — регулярная последовательность $\{\varepsilon_k\}$ -оптимальных процедур, то для каждого $n \in N$ и каждой последовательности $(a_1, a_2, \dots) \in \mathbf{A}$ имеет место неравенство

$$\begin{aligned} & E \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n w \left(a_k, \beta_k \left(\frac{1}{k-1} \sum_{i=1}^{k-1} a_i + \alpha_{k-1} z_{k-1} \right) \right) - \varrho \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \right) \leq \\ & \leq 2Kc_1 \left(2\alpha_n + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} k\alpha_k |\gamma_k| \right) + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k\varepsilon_k + \\ & + \frac{c_0}{n} \sum_{k=1}^n \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| F_k \left(\frac{x - \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k a_i}{\alpha_k} \right) - F_{k-1} \left(\frac{x - \frac{1}{k-1} \sum_{i=1}^{k-1} a_i}{\alpha_{k-1}} \right) \right|. \end{aligned}$$

Доказательство. Заметим, прежде всего, что $w(a_k, \beta_k(1/(k-1) \sum_{i=1}^{k-1} a_i + \alpha_{k-1} z_{k-1}))$ случайная величина, имеющая конечное математическое ожидание. Это следует из того, что $\{\beta_k\}_{k=1}^\infty$ является регулярной последовательностью и, следовательно, в силу (P2) $w(a_k, \beta_k(1/(k-1) \sum_{i=1}^{k-1} a_i + \alpha_{k-1} x))$ представляет собой ограниченную и измеримую в смысле Бореля функцию от x .

Пусть $(a_1, a_2, \dots) \in \mathbf{A}$ и $n \in N$ фиксировано и обозначим

$$\begin{aligned} \bar{a}_0 &= 0, \\ \bar{a}_k &= \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k a_i, \end{aligned}$$

$$s_k = \bar{a}_k + \alpha_k z_k, \quad k \in N,$$

$$Q = E \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n w(a_k, \beta_k(s_k)) - \varrho(\bar{a}_n),$$

$$P = E \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (w(a_k, \beta_k(s_{k-1})) - w(a_k, \beta_k(s_k))).$$

Теперь мы докажем несколько вспомогательных неравенств. Согласно (P1) и (3) имеет место

$$w(s_k, \beta_k(s_k)) \leq w(s_k, \beta_{k+1}(s_{k+1})) + \varepsilon_k, \quad k = 1, 2, \dots$$

Отсюда, согласно (2), получим

$$(31) \quad \begin{aligned} w(\bar{a}_k, \beta_k(s_k)) - w(\bar{a}_k, \beta_{k+1}(s_{k+1})) &\leq \\ &\leq \alpha_k z_k (w(0, \beta_k(s_k)) - w(0, \beta_{k+1}(s_{k+1}))) - \\ &- \alpha_k z_k (w(1, \beta_k(s_k)) - w(1, \beta_{k+1}(s_{k+1}))) + \varepsilon_k. \end{aligned}$$

Если b_k , $k = 1, 2, \dots$ — $1/k$ -оптимальные процедуры такие, что существуют пределы

$$\lim_{k \rightarrow \infty} w(j, b_k(x)) = w_j(x), \quad j = 0, 1, \quad x \in X,$$

то из (P1) и (3) вытекает

$$0 \leq \varepsilon_n + w(s_n, b_k(\bar{a}_n)) - w(s_n, \beta_n(s_n))$$

и отсюда

$$\begin{aligned} w(\bar{a}_n, \beta_n(s_n)) - \varrho(\bar{a}_n) &\leq \alpha_n z_n (w(0, \beta_n(s_n)) - w(0, b_k(\bar{a}_n))) - \\ &- \alpha_n z_n (w(1, \beta_n(s_n)) - w(1, b_k(\bar{a}_n))) + \varepsilon_n + w(\bar{a}_n, b_k(\bar{a}_n)) - \varrho(\bar{a}_n). \end{aligned}$$

Переходя к пределу при $k \rightarrow \infty$, получим

$$(32) \quad \begin{aligned} w(\bar{a}_n, \beta_n(s_n)) - \varrho(\bar{a}_n) &\leq \\ &\leq \alpha_n z_n (w(0, \beta_n(s_n)) - w_0(\bar{a}_n)) - \alpha_n z_n (w(1, \beta_n(s_n)) - w_1(\bar{a}_n)) + \varepsilon_n. \end{aligned}$$

Очевидно

$$\begin{aligned} Q &= E \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n w(k \bar{a}_k - (k-1) \bar{a}_{k-1}, \beta_k(s_k)) - \varrho(\bar{a}_n) = \\ &= E \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (k w(\bar{a}_k, \beta_k(s_k)) - (k-1) w(\bar{a}_{k-1}, \beta_k(s_k))) - \varrho(\bar{a}_n) = \\ &= E \frac{1}{n} \left(\sum_{k=1}^{n-1} k (w(\bar{a}_k, \beta_k(s_k)) - w(\bar{a}_k, \beta_{k+1}(\bar{a}_{k+1}))) + \right. \\ &\quad \left. + n (w(\bar{a}_n, \beta_n(s_n)) - \varrho(\bar{a}_n)) \right). \end{aligned}$$

Отсюда в силу (31) и (32)

577

$$\begin{aligned}
 (33) \quad Q &\leq E \frac{1}{n} \sum_{j=0}^1 (-1)^j \left(\sum_{k=1}^{n-1} k \alpha_k z_k (w(j, \beta_k(s_k)) - w(j, \beta_{k+1}(s_{k+1}))) + \right. \\
 &\quad \left. + n \alpha_n z_n (w(j, \beta_n(s_n)) - w_j(\bar{a}_n)) \right) + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k \varepsilon_k = \\
 &= \frac{1}{n} \sum_{j=0}^1 (-1)^j \left(\sum_{k=1}^n |E(k \alpha_k z_k - (k-1) \alpha_{k-1} z_{k-1}) w(j, \beta_k(s_k))| + \right. \\
 &\quad \left. + |E n \alpha_n z_n w_j(\bar{a}_n)| \right) + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k \varepsilon_k.
 \end{aligned}$$

Так как $w(j, \beta_k(s_k))$ — борелевская функция от случайной величины z_k , то согласно общезвестным свойствам условных математических ожиданий и условию (С3) следует

$$\begin{aligned}
 E z_{k-1} w(j, \beta_k(s_k)) &= E E(z_{k-1} w(j, \beta_k(s_k)) | z_k) = \\
 &= E w(j, \beta_k(s_k)) E(z_{k-1} | z_k) = (1 - \gamma_{k-1}) E z_k w(j, \beta_k(s_k)).
 \end{aligned}$$

Если это тождество подставить в неравенство (33), то мы получаем

$$\begin{aligned}
 Q &\leq \frac{1}{n} \sum_{j=0}^1 (-1)^j \left(\sum_{k=1}^n |k \alpha_k - (k-1) \alpha_{k-1} (1 - \gamma_{k-1})| |E z_k w(j, \beta_k(s_k))| + \right. \\
 &\quad \left. + n \alpha_n |E z_n w_j(\bar{a}_n)| \right) + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k \varepsilon_k.
 \end{aligned}$$

Из (1), (С1) и (С2) вытекает

$$\begin{aligned}
 &|k \alpha_k - (k-1) \alpha_{k-1} (1 - \gamma_{k-1})| |E z_k w(j, \beta_k(s_k))| \leq \\
 &\leq (k \alpha_k - (k-1) \alpha_{k-1}) K c_1 + (k-1) \alpha_{k-1} |\gamma_{k-1}| K c_1, \\
 &n \alpha_n |E z_n w_j(\bar{a}_n)| \leq n \alpha_n K c_1.
 \end{aligned}$$

Таким образом, имеет место следующая оценка

$$(34) \quad Q \leq 2K c_1 \left(2\alpha_n + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} k \alpha_k |\gamma_k| \right) + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k \varepsilon_k.$$

Теперь будем оценивать P . Очевидно, что

$$\begin{aligned}
 &E(w(a_k, \beta_k(s_{k-1})) - w(a_k, \beta_k(s_k))) = \\
 &= \int w(a_k, \beta_k(\bar{a}_{k-1} + \alpha_{k-1} z)) dF_{k-1}(z) - \int w(a_k, \beta_k(\bar{a}_k + \alpha_k z)) dF_k(z) = \\
 &= \int w(a_k, \beta_k(x)) dF_{k-1}\left(\frac{x - \bar{a}_{k-1}}{\alpha_{k-1}}\right) - \int w(a_k, \beta_k(x)) dF_k\left(\frac{x - \bar{a}_k}{\alpha_k}\right).
 \end{aligned}$$

578 Отсюда, по лемме 3 и (P2) непосредственно вытекает, что

$$P \leq c_0 \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| F_k \left(\frac{x - \bar{a}_k}{\alpha_k} \right) - F_{k-1} \left(\frac{x - \bar{a}_{k-1}}{\alpha_{k-1}} \right) \right|.$$

Так как

$$E \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n w(a_k, \beta_k(s_{k-1})) - \varrho(\bar{a}_n) = P + Q,$$

то теорема полностью доказана.

Теорема 4. Пусть $\{\delta_k\}_{k=2}^\infty$ — последовательность вещественных чисел, $\{\alpha_k\}_{k=0}^\infty$ — последовательность положительных чисел, удовлетворяющих условию (C1) в теореме 2, и $\{z_k\}_{k=0}^\infty$ последовательность случайных величин, удовлетворяющих условию (C2) в теореме 2 и условию

$$(C4) \quad E(z_{k+1} | z_k) = (1 - \delta_{k+1}) z_k \quad \text{п. в.}, \quad k = 2, 3, \dots$$

Если $\{\beta_k\}_{k=1}^\infty$ — регулярная последовательность $\{e_k\}$ -оптимальных процедур, то для каждого $n \in \mathbb{N}$ и каждой последовательности $(a_1, a_2, \dots) \in \mathbf{A}$ имеет место неравенство

$$\begin{aligned} E \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n w \left(a_k, \beta_k \left(\frac{1}{k-1} \sum_{i=1}^{k-1} a_i + \alpha_{k-1} z_{k-1} \right) \right) - \varrho \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \right) &\geq \\ &\geq -2Kc_1 \left(\frac{2\alpha_1}{n} + 2\alpha_n + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k\alpha_k |\delta_k| \right) - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k e_{k+1}. \end{aligned}$$

Доказательство. Фиксируем $(a_1, a_2, \dots) \in \mathbf{A}$ и обозначим

$$\begin{aligned} \bar{a}_0 &= 0, \\ \bar{a}_k &= \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k a_i, \\ r_k &= \beta_{k+1}(\bar{a}_k + \alpha_k z_k). \end{aligned}$$

Имеет место

$$\begin{aligned} (35) \quad E \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n w(a_k, r_{k-1}) - \varrho(\bar{a}_n) &= \\ E &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k(w(\bar{a}_k, r_{k-1}) - w(\bar{a}_k, r_k)) + \\ &+ E(w(\bar{a}, r_n) - \varrho(\bar{a}_n)). \end{aligned}$$

Так как

$$w(\bar{a}_k + \alpha_k z_k, r_k) \leq w(\bar{a}_k + \alpha_k z_k, r_{k-1}) + e_{k+1},$$

то

$$w(\bar{a}_k, r_{k-1}) - w(\bar{a}_k, r_k) \geq \alpha_k z_k (q_k - q_{k-1}) - \varepsilon_{k+1},$$

где

$$q_k = w(1, r_k) - w(0, r_k).$$

Таким образом

$$\begin{aligned} & E \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k(w(\bar{a}_k, r_{k-1}) - w(\bar{a}_k, r_k)) \geq \\ & \geq E \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k \alpha_k z_k (q_k - q_{k-1}) - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k \varepsilon_{k+1} = \\ & = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} E(k \alpha_k z_k - (k+1) \alpha_{k+1} z_{k+1}) q_k + \\ & + \alpha_n E z_n q_n - \frac{\alpha_1}{n} E z_1 q_0 - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k \varepsilon_{k+1}. \end{aligned}$$

Из (1) и условий (C1) и (C4) вытекает

$$\begin{aligned} & E(k \alpha_k z_k - (k+1) \alpha_{k+1} z_{k+1}) q_k \geq \\ & \geq (k \alpha_k - (k+1) \alpha_{k+1}) 2Kc_1 - (k+1) \alpha_{k+1} |\delta_{k+1}| 2Kc_1, \\ & \alpha_n E z_n q_n \geq -2\alpha_n Kc_1, \\ & -\frac{\alpha_1}{n} E z_1 q_0 \geq -\frac{2\alpha_1}{n} Kc_1 \end{aligned}$$

и, следовательно,

$$\begin{aligned} & E \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k(w(\bar{a}_k, r_{k-1}) - w(\bar{a}_k, r_k)) \geq \\ & \geq -2Kc_1 \left(\frac{2\alpha_1}{n} + 2\alpha_n + \frac{1}{n} \sum_{k=2}^n k \alpha_k |\delta_{k1}| \right) - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k \varepsilon_{k+1}. \end{aligned}$$

Так как

$$w(\bar{a}_n, r_n) - \varrho(\bar{a}_n) \geq 0$$

то отсюда ввиду (35) непосредственно вытекает утверждение теоремы.

Теорема 5. Пусть $\{\varepsilon_k\}_{k=1}^{\infty}$ — такая последовательность неотрицательных чисел, что

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k \varepsilon_k \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \quad \text{для всех } n \in N,$$

и пусть $\{\beta_k\}_{k=1}^{\infty}$ — регулярная последовательность $\{\varepsilon_k\}$ -оптимальных процедур. Если случайная величина z_0 имеет конечный первый абсолютный момент

и ограниченную плотность, то простой стратегический процесс $\{b_k\}_{k=1}^{\infty}$, определяемый равенством

$$b_1(\omega; a_1, a_2, \dots) = \beta_1(z_0(\omega)),$$

$$b_k(\omega; a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, \dots) = \beta_k\left(\frac{1}{k-1} \sum_{i=1}^{k-1} a_i + \frac{1}{\sqrt{(k-1)}} z_0(\omega)\right)$$

для $k = 2, 3, \dots$

является оптимальным относительно риска и существует такая постоянная c , что

$$\left| E \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n w(a_k, b_k(\cdot; a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, \dots)) - q \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \right) \right| \leq \frac{c}{\sqrt{n}}$$

для всех $n \in N$ и $(a_1, a_2, \dots) \in \mathbf{A}$.

Доказательство. Символом F обозначим функцию распределения случайной величины z_0 . Покажем, прежде всего, что существует такая постоянная c_2 , что

$$(36) \quad \sup_{x \in \mathbf{R}} \left| F\left(\left(x - \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k a_i\right) \sqrt{k}\right) - F\left(\left(x - \frac{1}{k+1} \sum_{i=1}^{k+1} a_i\right) \sqrt{(k+1)}\right) \right| \leq c_2 \left(\sqrt{(k+1)} - \sqrt{k} + \frac{1}{\sqrt{(k+1)}} \right),$$

каковы бы ни были $(a_1, a_2, \dots) \in \mathbf{A}$ и $k \in N$.

В силу предположения, что $E|z_0| < \infty$, существуют такие положительные постоянные U и V , что

$$1 - F(x) \leq \frac{U}{x}, \quad \text{если } x \geq V,$$

$$F(x) \leq \frac{U}{|x|}, \quad \text{если } x \leq -V,$$

и, следовательно, для всех $k \in N$ и $(a_1, a_2, \dots) \in \mathbf{A}$

$$1 - F\left(\left(x - \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k a_i\right) \sqrt{k}\right) \leq \frac{1}{\sqrt{k}}, \quad \text{если } x \geq \max\{U+1, V\},$$

$$F\left(\left(x - \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k a_i\right) \sqrt{k}\right) \leq \frac{1}{\sqrt{k}} \quad \text{если } x \leq -\max\{U+1, V\}.$$

Таким образом,

$$(37) \quad \left| F\left(\left(x - \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k a_i\right) \sqrt{k}\right) - F\left(\left(x - \frac{1}{k+1} \sum_{i=1}^{k+1} a_i\right) \sqrt{(k+1)}\right) \right| \leq \frac{1}{\sqrt{k}},$$

если $|x| \geq \max\{U+1, V\}$.

Ввиду того, что случайная величина z_0 имеет ограниченную плотность, существует постоянная c_3 так, что

$$|F(x) - F(y)| \leq c_3|x - y|,$$

каковы бы ни были $x, y \in R$. Так как

$$\begin{aligned} & \left| \left(x - \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k a_i \right) \sqrt{k} - \left(x - \frac{1}{k+1} \sum_{i=1}^{k+1} a_i \right) \sqrt{k+1} \right| \leq \\ & \leq |x|(\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) + \frac{\sum_{i=1}^k a_i(\sqrt{k+1} - \sqrt{k})}{\sqrt{k(k+1)}} + \frac{a_{k+1}}{\sqrt{k+1}} \leq \\ & \leq (|x| + 1)(\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) + \frac{1}{\sqrt{k+1}}, \end{aligned}$$

то

$$\begin{aligned} & F \left| \left(\left(x - \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k a_i \right) \sqrt{k} \right) - F \left(\left(x - \frac{1}{k+1} \sum_{i=1}^{k+1} a_i \right) \sqrt{k+1} \right) \right| \leq \\ & \leq c_3(1 + \max\{U + 1, V\}) \left(\sqrt{k+1} - \sqrt{k} + \frac{1}{\sqrt{k+1}} \right), \text{ если} \\ & |x| \leq \max\{U + 1, V\}. \end{aligned}$$

Ввиду (37) отсюда следует (36).

Определим

$$\begin{aligned} z_k &= z_0, \\ \alpha_k &= \frac{1}{\sqrt{k}}, \quad k = 1, 2, \dots, \\ \alpha_0 &= 1. \end{aligned}$$

Очевидно, что

$$E(z_k | z_{k+1}) = E(z_{k+1} | z_k) = z_0 \quad \text{п. в.}, \quad k = 0, 1, \dots,$$

так что последовательность случайных величин $\{z_k\}_{k=0}^{\infty}$ удовлетворяет условиям (С3) и (С4), если положить $\gamma_k = \delta_k = 0$. Имея ввиду, что

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} \leq \frac{2}{\sqrt{n}},$$

то утверждение теоремы следует из теорем 3 и 4.

Почувительно сопоставить эту теорему с теоремой 2. Если второй игрок

действует таким образом, что в k -м шагу выбирает стратегию, которая является оптимальной (или ε_k -оптимальной, если оптимальной не существует) относительно частоты $1/(k-1) \sum_{i=1}^{k-1} a_i$ первых $k-1$ стратегий первого игрока, то этот процесс оптимален в смысле определения 2 только тогда, если функция ϱ дифференцируема в $(0,1)$. Если ϱ не дифференцируема, то второму игроку придется частоты стратегий первого игрока подходящим образом рандомизировать и выбирать оптимальные стратегии относительно этих рандомизированных частот.

Теперь мы будем заниматься случаем, когда в k -м шагу второму игроку доступны только несмещенные оценки, g_1, g_2, \dots, g_{k-1} в предыдущих $k-1$ играх. Если обозначить $h_i = g_i - E g_i$, то при условиях следующей теоремы достаточно, чтобы второй игрок в k -м шагу применял оптимальную (или ε_k -оптимальную) стратегию относительно $1/(k-1) \sum_{i=1}^{k-1} g_i(\omega)$. Дальнейшая рандомизация не нужна.

Теорема 6. Пусть $\{\varepsilon_k\}_{k=1}^{\infty}$ — такая последовательность неотрицательных чисел, что

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k \varepsilon_k \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \quad \text{для всех } n \in N$$

и пусть $\{\beta_k\}_{k=1}^{\infty}$ — регулярная последовательность $\{\varepsilon_k\}$ -оптимальных процедур. Если независимые и одинаково распределенные случайные величины $\{h_k\}_{k=1}^{\infty}$ удовлетворяют условиям

$$\begin{aligned} E h_k &= 0, \\ E h_k^2 &= \sigma^2 > 0, \\ E |h_k|^3 &< \infty, \quad k = 1, 2, \dots, \end{aligned}$$

то простой стратегический процесс $\{b_k\}_{k=1}^{\infty}$, определяемый равенством

$$b_1(\omega; a_1, a_2, \dots) = \beta_1(0),$$

$$b_k(\omega; a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, \dots) = \beta_k \left(\frac{1}{k-1} \sum_{i=1}^{k-1} (h_i(\omega) + a_i) \right) \quad \text{для } k = 2, 3, \dots,$$

является оптимальным относительно риска и существует такая постоянная c , что

$$\left| E \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n w(a_k, b_k(\cdot; a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, \dots)) - \varrho \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \right) \right| \leq \frac{c}{\sqrt{n}}$$

для всех $n \in N$ и $(a_1, a_2, \dots) \in \mathbf{A}$.

Доказательство. Так как случайные величины $h_k, k = 1, 2, \dots$, независимы и одинаково распределены, то

$$E(h_k | \sum_{i=1}^n h_i) = E(h_1 | \sum_{i=1}^n h_i) \text{ п. в.}$$

для всех $n \in N$ и $k = 1, 2, \dots, n$. Очевидно, что для каждого $n \in N$ имеет место

$$\sum_{k=1}^n h_k = E(\sum_{k=1}^n h_k | \sum_{i=1}^n h_i) = \sum_{k=1}^n E(h_k | \sum_{i=1}^n h_i) \text{ п. в.}$$

Таким образом,

$$E(h_k | \sum_{i=1}^n h_i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n h_i \text{ п. в., } k = 1, 2, \dots, n, \quad n \in N$$

и, следовательно,

$$(38) \quad E(\sum_{k=1}^{n-1} h_k | \sum_{i=1}^n h_i) = \frac{n-1}{n} \sum_{i=1}^n h_i \text{ п. в., } n \in N.$$

Зададим теперь последовательность случайных величин $\{z_k\}_{k=0}^{\infty}$ и последовательность положительных чисел $\{\alpha_k\}_{k=0}^{\infty}$ следующим образом

$$\begin{aligned} z_0 &= 0, \\ z_k &= \frac{1}{\sqrt{k}} \sum_{i=1}^k h_i, \\ \alpha_k &= \frac{1}{\sqrt{k}} \text{ для } k = 1, 2, \dots, \\ \alpha_0 &= 1. \end{aligned}$$

В силу (38)

$$E(z_k | z_{k+1}) = \sqrt{\left(\frac{k}{k+1}\right)} z_{k+1} \text{ п. в., } k \in N$$

и

$$E(z_0 | z_1) = 0 \text{ п. в.}$$

С другой стороны не трудно убедиться в том, что

$$E(z_{k+1} | z_k) = \sqrt{\left(\frac{k}{k+1}\right)} z_k \text{ п. в., } k \in N.$$

Таким образом, последовательность $\{z_k\}_{k=1}^{\infty}$, удовлетворяет условиям (С3) и (С4) в теоремах 3 и 4, если положить

$$\gamma_k = \delta_{k+1} = 1 - \sqrt{\left(\frac{k}{k+1}\right)} \text{ для } k \in N \text{ и } \gamma_0 = 1.$$

584 Но так как она удовлетворяет также условию (C2), то из теорем 3 и 4 следует

$$\begin{aligned}
 & -2Kc_1 \left(\frac{2}{n} + \frac{2}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \sqrt{(k+1)} \left(1 - \sqrt{\left(\frac{k}{k+1} \right)} \right) \right) - \frac{1}{\sqrt{n}} \leq \\
 & \leq E \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n w(a_k, b_k(\cdot; a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, \dots)) - \varrho \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \right) \leq \\
 & \leq 2Kc_1 \left(\frac{2}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \sqrt{k} \left(1 - \sqrt{\left(\frac{k}{k+1} \right)} \right) \right) + \frac{1}{\sqrt{n}} + \\
 & + \frac{c_0}{n} \sum_{k=1}^n \sup_{x \in R} \left| F_k \left(\left(x - \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k a_i \right) \sqrt{k} \right) - F_{k-1} \left(\left(x - \frac{1}{k-1} \sum_{i=1}^{k-1} a_i \right) \sqrt{(k-1)} \right) \right|.
 \end{aligned}$$

Так как

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \sqrt{(k+1)} \left(1 - \sqrt{\left(\frac{k}{k+1} \right)} \right) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} (\sqrt{(k+1)} - \sqrt{k}) \leq \frac{\sqrt{n}}{n} = \frac{1}{\sqrt{n}}$$

и

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} \leq \frac{2}{\sqrt{n}}$$

то остается только оценить

$$\begin{aligned}
 S_n(a_1, a_2, \dots) &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sup_{x \in R} \left| F_k \left(\left(x - \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k a_i \right) \sqrt{k} \right) - \right. \\
 & \left. - F_{k-1} \left(\left(x - \frac{1}{k-1} \sum_{i=1}^{k-1} a_i \right) \sqrt{(k-1)} \right) \right|.
 \end{aligned}$$

Обозначим

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt, \quad x \in R.$$

Если применить теорему нормального приближения (см. например [3] стр. 288) к последовательности случайных величин $\{h_k\}_{k=1}^{\infty}$, то мы получим: Существует такая числовая константа $c_3 < \infty$, что для всех $k \in N$

$$(39) \quad \sup_{x \in R} |F_k(\sigma x) - \Phi(x)| \leq c_3 \frac{E|h_1|^3}{\sigma^3 \sqrt{k}}.$$

В доказательстве теоремы 5 мы показали, что функция распределения F удовлетворяет неравенству (36), если соответствующая плотность ограничена и $\int |x| dF(x) < \infty$. Но этими свойствами обладает функция распределения Φ .

Так как

$$\begin{aligned} \sup_{x \in R} & \left| F_k \left(\left(x - \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k a_i \right) \sqrt{k} \right) - F_{k-1} \left(\left(x - \frac{1}{k-1} \sum_{i=1}^{k-1} a_i \right) \sqrt{(k-1)} \right) \right| \leq \\ & \leq \sup_{x \in R} |F_k(\sigma x) - \Phi(x)| + \sup_{x \in R} |F_{k-1}(\sigma x) - \Phi(x)| + \\ & + \sup_{x \in R} \left| \Phi \left(\left(x - \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k a_i \right) \sqrt{k} \right) - \Phi \left(\left(x - \frac{1}{k-1} \sum_{i=1}^{k-1} a_i \right) \sqrt{(k-1)} \right) \right|, \end{aligned}$$

то в силу (36) и (39) существует такая постоянная c_4 , что

$$S_n(a_1, a_2, \dots) \leq \frac{c_4}{\sqrt{n}}$$

Таким образом, теорема доказана.

(Поступило 6 июля 1967 г.)

ЛИТЕРАТУРА

- [1] J. Hannan: Approximation to Bayes Risk in Repeated Play. Contributions to the Theory of Games 3 (1957), 97—139.
- [2] S. Jilovec, B. Šubert: Repetitive Play of a Game against Nature. Aplikace matematiky — в печати.
- [3] M. Loeve: Probability Theory. 3rd ed., Van Nostrand, New York 1963.
- [4] J. van Ryzin: The Sequential Compound Decision Problem with Finite $n \times m$ Loss Matrix. Ann. Math. Stat. 37 (1966), 2, 954—975.
- [5] E. Samuel: Asymptotic Solutions of the Sequential Compound Decision Problem. Ann. Mat. Stat. 34 (1963), 1079—1094.

ВЫТАН

Секвенční opakování hry při neurčitosti

STANISLAV JÍLOVEC

В článku se vyšetřuje posloupnost zleva konečných strategických her dvou hráčů G_1, G_2, G_3, \dots , které mají stejnou strukturu, tj. $G_1 = G_2 = G_3 = \dots$, při čemž strategie hráčů se mohou měnit v každé hře. Hráč I může vybrat zcela libovolnou posloupnost strategií, nepředpokládá se, že volby hráče I lze popsat pravděpodobnostně. Hráč II zná v k -té hře strategie nebo nestranné odhady strategií, kterých použil hráč I v předcházejících hrách, a může této znalosti použít k volbě své strategie v k -té hře.

586 Postupuje-li hráč II tak, že v každé hře volí strategii, která je optimální vzhledem k vektoru relativních četností strategií použitých hráčem I v předcházejících hrách, je tento postup optimální (ve smyslu definice 2) právě tehdy, když Bayesova střední ztráta je diferencovatelnou funkcí (věta 2). Věta 3 udává třídu strategických postupů hráče II, která je optimální ve smyslu definice 2 i v případě, když Bayesova střední ztráta není diferencovatelná. Další věty jsou aplikacemi věty 3 v případě, kdy hráč II zná v každé hře strategie použité hráčem I v předcházejících hrách (věta 5) a nebo nestranné odhady těchto strategií (věta 6).

RNDr. Stanislav Jilovec, CSc., Ústav teorie informace a automatizace ČSAV, Vyšehradská 49, Praha 2.