

Vladimír Doležal

O nejednoznačnosti řešení soustavy diferenciálních rovnic

Časopis pro pěstování matematiky, Vol. 85 (1960), No. 3, 311--337

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/117335>

Terms of use:

© Institute of Mathematics AS CR, 1960

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

O NEJEDNOZNAČNOSTI ŘEŠENÍ SOUSTAVY DIFERENCIÁLNÍCH ROVNIC

VLADIMÍR DOLEŽAL, Praha

(Došlo dne 3. července 1959)

V tomto článku je sestroyen příklad, který ukazuje, že z jednoznačnosti řešení rovnice $\frac{dx}{dt} = g(x)$ nemusí plynout jednoznačnost řešení rovnice $x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t g(x(\tau)) d\sigma(\tau)$, kde $\sigma(\tau)$ je spojitá reálná funkce s konečnou variací.

Problémy řešené v tomto článku se vyskytly při studiu zobecněných diferenciálních rovnic, které zavedl J. KURZWEIL v článku [1], zvláště pak při studiu Diracovy funkce v nelineárních diferenciálních rovnicích v kap. 5 článku [2].

Tam se v pomocné větě 5,1 dokazuje následující: Buď $\chi(\eta)$, $\eta \geq 0$ rostoucí spojitá funkce, $\chi(0) = 0$, $\int_0^1 \frac{d\eta}{\chi(\eta)} = \infty$. Buď $\sigma(t)$, $t \in \langle 0, S \rangle$ spojitá reálná funkce s konečnou variací. Buď $g(x) = [g_1(x_1, x_2, \dots, x_m), \dots, g_m(x_1, x_2, \dots, x_m)]$ spojitá vektorová funkce na otevřené množině $D \subset E_m$ taková, že

$$(0,1) \quad \|g(x_*) - g(x^*)\| \leq \chi(\|x_* - x^*\|) \quad \text{pro } x_*, x^* \in D.$$

Buď $x_0 \in D$, $t_0 \in \langle 0, S \rangle$. Potom rovnice $x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t g(x(\tau)) d\sigma(\tau)$ má nejvýše jedno řešení.

Ve větě 5,1 se pak dokazuje následující: Buď $f(x, t) = [f_1(x_1, \dots, x_m, t), \dots, f_m(x_1, \dots, x_m, t)]$ spojitá vektorová funkce pro $x \in D$, $t \in \langle -T_1, T_1 \rangle$. Buď $g(x)$ funkce, která splňuje předpoklady pomocné věty 5,1. Nechť $\varphi_n(t)$, $n = 1, 2, 3, \dots$ je spojitá reálná funkce na $\langle -T_1, T_1 \rangle$, $\Phi_n(t) = \int_{-T_1}^t \varphi_n(\tau) d\tau$. Nechť $\varphi_n(t)$ splňuje následující podmínky:

$$(0,2) \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_{-T_1}^{T_1} |\varphi_n(\tau)| d\tau = L < \infty,$$

$$(0,3) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-T_1}^t |\varphi_n(\tau)| d\tau = 0 \quad \text{pro } -T_1 \leq t < 0,$$

$$(0,4) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_t^{T_1} |\varphi_n(\tau)| d\tau = 0 \quad \text{pro } 0 < t \leq T_1,$$

$$(0,5) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \Phi_n(t) = 0 \quad \text{pro } -T_1 \leq t < 0,$$

$$(0,6) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \Phi_n(t) = 1 \quad \text{pro } 0 < t \leq T_1.$$

Buď $u(t)$, $t \in \langle -T_0, 0 \rangle$, ($0 < T_0 < T_1$) řešení rovnice $\frac{dx}{dt} = f(x, t)$ určené jednoznačně počáteční podmínkou. Buď $v(t)$, $t \in \langle -\frac{L}{2}, \frac{L}{2} \rangle$ řešení rovnice $\frac{dx}{dt} = g(x)$ jednoznačně určené počáteční podmínkou $v(-\frac{1}{2}) = u(0)$. Buď $w(t)$, $t \in \langle 0, T_0 \rangle$ řešení rovnice $\frac{dx}{dt} = f(x, t)$ jednoznačně určené počáteční podmínkou $w(0) = v(\frac{1}{2})$.

Nechť $y_n \rightarrow u(-T_0)$ pro $n \rightarrow \infty$. Potom řešení $x_n(t)$, rovnice

$$\frac{dx}{dt} = f(x, t) + g(x) \cdot \varphi_n(t),$$

$x_n(-T_0) = y_n$ (ne nutně jednoznačné), je definováno na intervalu $\langle -T_0, T_0 \rangle$ (pro dosti velká n) a platí

$$(0,7) \quad \begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t) &= u(t) \quad \text{pro } -T_0 \leq t < 0, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t) &= w(t) \quad \text{pro } 0 < t \leq T_0. \end{aligned}$$

V tomto článku ukážeme, že podmínku (0,1), kterou musí splňovat funkce $g(x)$ nelze nahradit slabší podmínkou: necht $g(x)$ je spojitá vektorová funkce na množině $D \subset E_m$ taková, že rovnice $x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t g(x(\tau)) d\tau$ má pro $x_0 \in D$, $t_0 \in \langle 0, S \rangle$ právě jedno řešení. V kapitole II sestrojíme na množině $\langle 0, \pi \rangle \times \langle 0, 1 \rangle$ funkci $g(x, y)$ takovou, že pro $t_0 \in \langle 0, 8\pi \rangle$ $x_0 \in \langle 0, \pi \rangle$, $y_0 \in \langle 0, 1 \rangle$ má systém

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t d\tau, \quad y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t g(x(\tau), y(\tau)) d\tau.$$

právě jedno řešení. V kapitole III sestrojíme spojitou reálnou funkci s konečnou variací $\sigma(t)$, $t \in \langle 0, 8\pi \rangle$ takovou, že systému

$$x(t) = \int_0^t d\sigma(\tau), \quad y(t) = \int_0^t g(x(\tau), y(\tau)) d\sigma(\tau)$$

vyhovují řešení dvě. Podobně v kapitole IV sestrojíme funkci $f(y, t)$ a posloupnost funkcí $\varphi_n(t)$, $n = 1, 2, \dots$ tak, že řešení systému

$$\frac{dx}{dt} = \varphi_n(t), \quad \frac{dy}{dt} = f(y, t) + g(x, y) \cdot \varphi_n(t)$$

nebude mít vlastnost (0,7).

I

Nejprve sestrojíme dělení intervalu $\langle 0, Y \rangle$, $Y > 0$ (obdobné dělení intervalu při konstrukci Cantorova diskontinua), které budeme v dalším potřebovat. Zvolme čísla $a_1 > 0$, $b_1 > 0$, $a_1 \neq b_1$ tak, aby $2a_1 + 3b_1 = 1$ a sestrojme posloupnosti $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ takto: $a_n = a_1 \cdot b_1^{n-1}$, $b_n = b_1^n$. Pak zřejmě platí následující vztahy:

$$(1,1) \quad a_n : b_n = a_1 : b_1, \quad 2a_n + 3b_n = b_{n-1}, \quad 2 \cdot \sum_{n=1}^{\infty} 3^{n-1} a_n = 1, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0.$$

Nyní při prvním kroku sestrojíme body $Y_i^{(1)}$ ($i = 1, 2, 3, 4$) tak, aby platilo $Y_1^{(1)} = Y_3^{(1)} - Y_2^{(1)} = Y - Y_4^{(1)} = b_1 \cdot Y$, $Y_2^{(1)} - Y_1^{(1)} = Y_4^{(1)} - Y_3^{(1)} = a_1 \cdot Y$.

Podle (1,1) je zřejmé, že takové dělení lze provést. Rozdělili jsme tak interval $\langle 0, Y \rangle$ na pět dílů, z nichž dva jsou délky $a_1 \cdot Y$ a tři délky $b_1 \cdot Y$. Při druhém kroku vynecháme otevřené intervaly délky $a_1 \cdot Y$ a intervaly délky $b_1 \cdot Y$ rozdělíme opět na pět dílů, a to ve stejném poměru jako interval $\langle 0, Y \rangle$. Stejným způsobem postupujeme dále. Po n -tém kroku máme sestrojeny body

$$(1,2) \quad D(n) = \{0, Y; Y_1^{(1)}, \dots, Y_4^{(1)}; Y_1^{(2)}, \dots, Y_{12}^{(2)}; \dots; Y_1^{(n)}, \dots, Y_{4 \cdot 3^{n-1}}^{(n)}\}.$$

Při $n + 1$ kroku vynecháme otevřené intervaly délek $a_1 \cdot Y$, $a_2 \cdot Y$, ..., $a_n \cdot Y$ a intervaly délek $b_n \cdot Y$ budeme dělit ve stejném poměru jako interval $\langle 0, Y \rangle$; tj. sestrojíme body $Y_1^{(n+1)}, \dots, Y_{4 \cdot 3^n}^{(n+1)}$ tak, aby platilo: Jestliže $Y_*, Y^* \in D(n)$, $Y^* - Y_* = b_n Y$ (tj. koncové body intervalu délky $b_n Y$) pak

$$(1,3) \quad Y^* - Y_{4s}^{(n+1)} = Y_{4s-1}^{(n+1)} - Y_{4s-2}^{(n+1)} = Y_{4s-3}^{(n+1)} - Y_* = b_{n+1} \cdot Y, \\ Y_{4s}^{(n+1)} - Y_{4s-1}^{(n+1)} = Y_{4s-2}^{(n+1)} - Y_{4s-3}^{(n+1)} = a_{n+1} \cdot Y.$$

Podle (1,1) lze takové dělení provést. Intervalů délky $b_n \cdot Y$ je zřejmě 3^n , je tedy $s = 1, 2, \dots, 3^n$; intervalů délky $a_n \cdot Y$ je $2 \cdot 3^{n-1}$.

Snadno se dokáže následující tvrzení:

Věta 1,1. *Bud' $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{l=1}^{\infty} (Y_{2l-1}^{(n)}, Y_{2l}^{(n)})$, $B = \langle 0, Y \rangle - A$. Pak platí: množina*

A je otevřená, množina B je uzavřená, má mohutnost kontinua a míru 0.

II

Než přistoupíme ke konstrukci funkce g dokážeme následující větu:

Věta 2.1. *Nechť funkce φ, ψ mají spojitou první derivaci na intervalu $\langle a, b \rangle$ a necht' platí $\varphi(x) < \psi(x)$ pro $x \in \langle a, b \rangle$. Necht' funkce χ má spojitou první derivaci na intervalu $\langle \varphi(a), \psi(a) \rangle$ a necht' $\chi(\varphi(a)) = \varphi'(a)$, $\chi(\psi(a)) = \psi'(a)$. Necht' funkce χ^* má spojitou první derivaci na intervalu $\langle \varphi(b), \psi(b) \rangle$ a necht' $\chi^*(\varphi(b)) = \varphi'(b)$, $\chi^*(\psi(b)) = \psi'(b)$.*

Definujme množinu P takto: Bod $[x, y] \in P$, jestliže platí

$$a \leq x \leq b, \quad \varphi(x) \leq y \leq \psi(x).$$

Bud' $0 < \varepsilon < 1$. Potom na množině P existuje spojitá funkce h mající tyto vlastnosti:

$$(2,1) \quad \begin{aligned} 1. \quad h(x, \varphi(x)) &= \varphi'(x) \quad \text{pro } x \in \langle a, b \rangle, \\ h(x, \psi(x)) &= \psi'(x) \quad \text{pro } x \in \langle a, b \rangle, \\ h(a, y) &= \chi(y) \quad \text{pro } y \in \langle \varphi(a), \psi(a) \rangle, \\ h(b, y) &= \chi^*(y) \quad \text{pro } y \in \langle \varphi(b), \psi(b) \rangle. \end{aligned}$$

2. Každým bodem $[x_0, y_0] \in P$ prochází právě jedno řešení diferenciální rovnice

$$(2,2) \quad y' = h(x, y).$$

3. Buďte u_1, u_2 dvě řešení rovnice (2,2). Necht' $u_1(a) - u_2(a) = A > 0$, potom platí

$$(2,3) \quad \begin{aligned} A \cdot \frac{\psi(x) - \varphi(x)}{\psi(a) - \varphi(a)} (1 - \varepsilon) &\leq u_1(x) - u_2(x) \leq A \cdot \frac{\psi(x) - \varphi(x)}{\psi(a) - \varphi(a)} (1 + \varepsilon), \\ u_1(b) - u_2(b) &= A \cdot \frac{\psi(b) - \varphi(b)}{\psi(a) - \varphi(a)}. \end{aligned}$$

Podobně platí: Buďte v_1, v_2 dvě řešení rovnice (2,2). Necht' $v_1(b) - v_2(b) = B > 0$. Potom

$$(2,4) \quad \begin{aligned} B \cdot \frac{\psi(x) - \varphi(x)}{\psi(b) - \varphi(b)} (1 - \varepsilon) &\leq v_1(x) - v_2(x) \leq B \cdot \frac{\psi(x) - \varphi(x)}{\psi(b) - \varphi(b)} (1 + \varepsilon), \\ v_1(a) - v_2(a) &= B \cdot \frac{\psi(a) - \varphi(a)}{\psi(b) - \varphi(b)}. \end{aligned}$$

Důkaz. Označme P_1 množinu bodů $[x, y]$ pro které platí

$$a + \delta_1 \leq x \leq b - \delta_2, \quad \varphi(x) \leq y \leq \psi(x),$$

kde $0 < \delta_i < \frac{b-a}{2}$, ($i = 1, 2$). Definujme funkci h na množině P_1 takto:

$$h(x, y) = \frac{y - \varphi(x)}{\psi(x) - \varphi(x)} \cdot \varphi'(x) + \frac{\psi(x) - y}{\psi(x) - \varphi(x)} \cdot \psi'(x).$$

Zřejmě $h(x, \varphi(x)) = \varphi'(x)$, $h(x, \psi(x)) = \psi'(x)$. Funkce h je na množině P_1 spojitá a platí $|h(x, y)| \leq |\psi'(x)| + |\varphi'(x)|$.

Bud' $[\bar{x}, \bar{y}] \in P_1$. Označme $\lambda = \frac{\bar{y} - \varphi(\bar{x})}{\psi(\bar{x}) - \varphi(\bar{x})}$. Pak funkce $H(x, \lambda) = \lambda \psi(x) + (1 - \lambda) \cdot \varphi(x)$ je řešení rovnice (2,2) jdoucí bodem $[\bar{x}, \bar{y}]$. Zřejmě platí

$$(2,5) \quad H(x, \lambda_1) - H(x, \lambda_2) = (\lambda_1 - \lambda_2) (\psi(x) - \varphi(x)).$$

Nyní označme P_2 množinu bodů $[x, y]$, pro které platí

$$a \leq x \leq a + \delta_1, \quad \varphi(x) \leq y \leq \psi(x)$$

a P_3 množinu bodů $[x, y]$, pro které platí

$$b - \delta_2 \leq x \leq b, \quad \varphi(x) \leq y \leq \psi(x).$$

Na množinách P_2, P_3 nemůžeme definovat funkci h stejně jako na množině P_1 , protože by nemuselo platit $h(a, y) = \chi(y)$ resp. $h(b, y) = \chi^*(y)$.

Označme $H(x, \lambda) = \lambda \psi(x) + (1 - \lambda) \varphi(x)$ pro $x \in \langle a, a + \delta_1 \rangle$ a necht' funkce ν má spojitou první derivaci pro $x \in \langle a, a + \delta_1 \rangle$ a necht' splňuje následující podmínky

$$\nu(a) = \nu(a + \delta_1) = \nu'(a + \delta_1) = 0, \quad \nu'(a) = 1, \quad |\nu'(x)| \leq 1,$$

$$0 \leq |\nu(x)| \leq \varepsilon \cdot \frac{|\psi(x) - \varphi(x)|}{M \cdot |\psi(a) - \varphi(a)| + |\psi'(a) - \varphi'(a)|},$$

kde M je kladné a $M \geq \max_{y \in \langle \varphi(a), \psi(a) \rangle} |\chi'(y)|$.

Protože pro $0 \leq \lambda \leq 1$ je $H(a, \lambda) \in \langle \varphi(a), \psi(a) \rangle$, můžeme definovat

$$H^*(x, \lambda) = H(x, \lambda) + \nu(x) \cdot [\chi(H(a, \lambda)) - H_1'(a, \lambda)], \quad \left(H_1' = \frac{\partial H}{\partial x}, H_2' = \frac{\partial H}{\partial \lambda} \right).$$

Nyní platí

$$H^*(a, \lambda) = H(a, \lambda), \quad H^*(a + \delta_1, \lambda) = H(a + \delta_1, \lambda),$$

$$H^*(x, 0) = H(x, 0) = \varphi(x), \quad H^*(x, 1) = H(x, 1) = \psi(x).$$

Funkce H^* má spojitě parciální derivace $H_1^{*'}, H_2^{*'}$ a platí

$$H_1^{*'}(a, \lambda) = \chi(H(a, \lambda)), \quad H_1^{*'}(a + \delta_1, \lambda) = H_1'(a + \delta_1, \lambda)$$

($H_1^{*'}$ zde znamená derivaci zleva resp. zprava).

Dokážeme, že každým bodem $[x_0, y_0] \in P_2$ prochází právě jedna křivka H^* . Bud' $\lambda_1 > \lambda_2$, pak

$$\begin{aligned} & H^*(x, \lambda_1) - H^*(x, \lambda_2) = \\ & = (\lambda_1 - \lambda_2) \cdot (\psi(x) - \varphi(x)) + \nu(x) [\chi(H(a, \lambda_1)) - \chi(H(a, \lambda_2)) - \\ & \quad - H_1'(a, \lambda_1) + H_1'(a, \lambda_2)]. \end{aligned}$$

Protože $(\lambda_1 - \lambda_2) \cdot (\psi(x) - \varphi(x)) > 0$, a protože

$$\begin{aligned} & |\nu(x)| \cdot |\chi(H(a, \lambda_1)) - \chi(H(a, \lambda_2)) - H_1'(a, \lambda_1) + H_1'(a, \lambda_2)| \leq \\ & \leq |\nu(x)| \cdot [M(\lambda_1 - \lambda_2) \cdot (\psi(a) - \varphi(a)) + (\lambda_1 - \lambda_2) \cdot |\psi'(a) - \varphi'(a)|] \leq \\ & \leq \varepsilon \cdot (\lambda_1 - \lambda_2) (\psi(x) - \varphi(x)) \end{aligned}$$

je

$$(2,6) \quad H^*(x, \lambda_1) - H^*(x, \lambda_2) > 0$$

a dokonce

$$\begin{aligned} (\lambda_1 - \lambda_2) \cdot (\psi(x) - \varphi(x)) \cdot (1 - \varepsilon) &\leq H^*(x, \lambda_1) - H^*(x, \lambda_2) \leq \\ &\leq (\lambda_1 - \lambda_2) \cdot [\psi(x) - \varphi(x)] \cdot (1 + \varepsilon). \end{aligned}$$

Buď $[x_0, y_0] \in P_2$. Funkce $H^*(x, \lambda)$ je spojitá na intervalu $0 \leq \lambda \leq 1$ podle (2,6), rostoucí v λ pro každé $x \in \langle a, a + \delta_1 \rangle$ a nabývá všech hodnot od $\varphi(x)$ do $\psi(x)$. Existuje tedy právě jedno $\lambda = \lambda_0$ takové, že $y_0 = H^*(x_0, \lambda_0)$. Křivka $H^*(x, \lambda_0)$ prochází bodem $[x_0, y_0]$ a podle (2,6) žádná jiná křivka $H^*(x, \lambda)$, $\lambda \neq \lambda_0$ nemůže bodem $[x_0, y_0]$ procházet.

Funkci h na množině P_2 budeme definovat takto: nalezneme křivku H^* , která prochází bodem $[x, y] \in P_2$, sestrojíme její tečnu v tomto bodě a směrnice této tečny bude hodnota funkce h v bodě $[x, y]$.

Snadno se ukáže, že takto definovaná funkce h je na P_2 spojitá a lipschitzovská vzhledem k y , a že platí

$$\begin{aligned} h(x, H^*(x, \lambda)) &= H_1^{*'}(x, \lambda) \quad \text{pro } a \leq x \leq a + \delta_1, \quad 0 \leq \lambda \leq 1, \\ h(a, y) &= \chi(y) \quad \text{pro } \varphi(a) \leq y \leq \psi(a). \end{aligned}$$

Stejným způsobem, pomocí křivek H^{**} definujeme funkci h na množině P_3 .

Tím jsme sestrojili funkci h na celé množině P . Z konstrukce je zřejmé, že h je na P spojitá a že je splněno (2,1).

Hledáme řešení diferenciální rovnice (2,2) pro $a \leq x \leq b$. Definujeme křivku G takto:

$$\begin{aligned} G(x, \lambda) &= H^*(x, \lambda) \quad \text{pro } x \in \langle a, a + \delta_1 \rangle, \\ G(x, \lambda) &= H(x, \lambda) \quad \text{pro } x \in \langle a + \delta_1, b - \delta_2 \rangle, \\ G(x, \lambda) &= H^{**}(x, \lambda) \quad \text{pro } x \in \langle b - \delta_2, b \rangle. \end{aligned}$$

Pak tato křivka má v každém bodě intervalu $\langle a, b \rangle$ spojitou derivaci a platí

$$G_1'(x, \lambda) = h(x, G(x, \lambda)).$$

Přitom libovolným bodem $[x_0, y_0] \in P$ prochází právě jedna křivka G .

Buďte u_1, u_2 dvě řešení rovnice (2,2) taková, že $u_1(a) - u_2(a) = A > 0$. Potom $u_1(x) = G(x, \lambda_1)$, $u_2(x) = G(x, \lambda_2)$ a podle (2,5) a (2,6) je

$$\begin{aligned} &(\lambda_1 - \lambda_2) \cdot (\psi(x) - \varphi(x))(1 - \varepsilon) \leq \\ &\leq G(x, \lambda_1) - G(x, \lambda_2) \leq (\lambda_1 - \lambda_2)(\psi(x) - \varphi(x))(1 + \varepsilon). \end{aligned}$$

Protože

$$\lambda_1 - \lambda_2 = \frac{G(a, \lambda_1) - G(a, \lambda_2)}{\psi(a) - \varphi(a)} = \frac{u_1(a) - u_2(a)}{\psi(a) - \varphi(a)} = \frac{A}{\psi(a) - \varphi(a)},$$

platí

$$A \cdot \frac{\psi(x) - \varphi(x)}{\psi(a) - \varphi(a)} (1 - \varepsilon) \leq G(x, \lambda_1) - G(x, \lambda_2) \leq A \cdot \frac{\psi(x) - \varphi(x)}{\psi(a) - \varphi(a)} (1 + \varepsilon)$$

a

$$\begin{aligned} G(b, \lambda_1) - G(b, \lambda_2) &= H^{**}(b, \lambda_1) - H^{**}(b, \lambda_2) = (\lambda_1 - \lambda_2)(\psi(b) - \varphi(b)) = \\ &= A \frac{\psi(b) - \varphi(b)}{\psi(a) - \varphi(a)}. \end{aligned}$$

Stejně se dokáže (2,4). Tím je věta 2,1 úplně dokázána.

Poznámka. Z důkazu věty 2,1 plyne

Je-li $[x, y] \in P_1$ pak $|h(x, y)| \leq |\psi'(x)| + |\varphi'(x)|$. Je-li $[x, y] \in P_2$ pak $|h(x, y)| = |H_1^{*'}(x, \lambda)|$, kde λ vyhovuje rovnici $y = H^*(x, \lambda)$, a platí

$$\begin{aligned} |h(x, y)| &\leq |\psi'(x)| + |\varphi'(x)| + \max_{\nu \in \langle \varphi(a), \psi(a) \rangle} |\chi(y)| + |\psi'(a)| + |\varphi'(a)| \leq \\ &\leq |\psi'(x)| + |\varphi'(x)| + 3 \cdot \max_{\nu \in \langle \varphi(a), \psi(a) \rangle} |\chi(y)|. \end{aligned}$$

Podobně, je-li $[x, y] \in P_3$ pak

$$|h(x, y)| \leq |\psi'(x)| + |\varphi'(x)| + 3 \cdot \max_{\nu \in \langle \varphi(b), \psi(b) \rangle} |\chi^*(y)|.$$

Odtud plyne pro $[x, y] \in P$

$$(2,7) \quad |h(x, y)| \leq |\psi'(x)| + |\varphi'(x)| + 3 \cdot (\max_{\langle \varphi(a), \psi(a) \rangle} |\chi(y)| + \max_{\langle \varphi(b), \psi(b) \rangle} |\chi^*(y)|).$$

Nyní přistoupíme ke konstrukci funkce g (viz obr. 1). Definičním oborem této funkce bude interval $Q_1^{(0)} = \langle 0, \pi \rangle \times \langle 0, 1 \rangle$. Na intervalu $\langle 0, 1 \rangle$ (na ose y) sestrojíme dělení $Y_4^{(k)}$ popsané v části I (tj. položíme $Y = 1$). Přitom, jak se později ukáže, je nutné volit $\frac{1}{16} < b_1 < 2a_1$. Označme $\psi_1^{(0)}, \psi_2^{(0)}$ funkci identicky rovnou nule resp. jedné na intervalu $\langle 0, \pi \rangle$.

Při prvním kroku sestrojíme na intervalu $\langle 0, \pi \rangle$ funkce

$$\psi_1^{(1)}(x) = -\frac{1}{2}a_1 \cos x + \frac{Y_1^{(1)} + Y_2^{(1)}}{2}, \quad \psi_2^{(1)}(x) = \frac{1}{2}a_1 \cos x + \frac{Y_3^{(1)} + Y_4^{(1)}}{2},$$

a označme

$$\begin{aligned} P_1^{(1)} &= \mathcal{E}_{[x,y]} \left[\frac{\pi}{4} \leq x \leq \pi, \psi_1^{(0)}(x) \leq y \leq \psi_1^{(1)}(x) \right], \\ P_2^{(1)} &= \mathcal{E}_{[x,y]} \left[0 \leq x \leq \frac{3\pi}{4}, \psi_1^{(1)}(x) \leq y \leq \psi_2^{(1)}(x) \right], \\ P_3^{(1)} &= \mathcal{E}_{[x,y]} \left[\frac{\pi}{4} \leq x \leq \pi, \psi_2^{(1)}(x) \leq y \leq \psi_2^{(0)}(x) \right], \\ Q_1^{(1)} &= \mathcal{E}_{[x,y]} \left[0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}, \psi_1^{(0)}(x) \leq y \leq \psi_1^{(1)}(x) \right], \\ Q_2^{(1)} &= \mathcal{E}_{[x,y]} \left[\frac{3\pi}{4} \leq x \leq \pi, \psi_1^{(1)}(x) \leq y \leq \psi_2^{(1)}(x) \right], \\ Q_3^{(1)} &= \mathcal{E}_{[x,y]} \left[0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}, \psi_2^{(1)}(x) \leq y \leq \psi_2^{(0)}(x) \right]. \end{aligned}$$

Při druhém kroku budeme na množinách $Q_1^{(1)}, Q_2^{(1)}, Q_3^{(1)}$ postupovat stejně jako na celém intervalu $Q_1^{(0)} = \langle 0, \pi \rangle \times \langle 0, 1 \rangle$.

Předpokládejme, že jsme provedli n kroků. Máme sestrojeny funkce

$$\Psi(n) = \{\psi_1^{(0)}, \psi_2^{(0)}; \psi_1^{(1)}, \psi_2^{(1)}; \psi_1^{(2)}, \dots, \psi_6^{(2)}; \dots; \psi_1^{(n)}, \dots, \psi_{2 \cdot 3^{n-1}}^{(n)}\}$$

a definovány množiny

$$P_1^{(1)}, \dots, P_3^{(1)}; P_1^{(2)}, \dots, P_9^{(2)}; \dots; P_1^{(n)}, \dots, P_{3^n}^{(n)}; Q_1^{(n)}, \dots, Q_{3^n}^{(n)}$$

takové, že

$$\left(\bigcup_{r=1}^n \bigcup_{s=1}^{3^r} P_s^{(r)} \right) \cup \left(\bigcup_{s=1}^{3^n} Q_s^{(n)} \right) = \langle 0, \pi \rangle \times \langle 0, 1 \rangle.$$

Při $(n+1)$ -ním kroku budeme na množinách $Q_s^{(n)}$, $(s = 1, 2, \dots, 3^n)$ postupovat stejně jako na celém intervalu $Q_1^{(0)} = \langle 0, \pi \rangle \times \langle 0, 1 \rangle$. Buď

$$Q_s^{(n)} = \mathcal{E} [a \leq x \leq b, \psi_*(x) \leq y \leq \psi^*(x)]_{[x,y]}$$

kde $b - a = \frac{\pi}{4^n}$, ψ_* , $\psi^* \in \Psi(n)$ jsou monotonní funkce mající spojitou první derivaci. Přitom rozdíl $\psi^*(x) - \psi_*(x)$ je monotonní a nabývá minima b_n v některém koncovém bodě intervalu $\langle a, b \rangle$ — označme tento bod x_1 . Platí

$\psi_*(x) \leq \psi_*(x_1) = Y_* < Y^* = \psi^*(x_1) \leq \psi^*(x)$; $\psi'^*(x_1) = \psi'_*(x_1) = 0$,
(Y_* , $Y^* \in D(n)$, $\psi'_*(x_1)$, $\psi'^*(x_1)$ zde znamená derivaci zprava resp. zleva).
S výjimkou množiny $Q_1^{(0)}$ existuje vždy právě jeden takový bod x_1 . Buď

$$Y_* < Y_{4s-3}^{(n+1)} < Y_{4s-2}^{(n+1)} < Y_{4s-1}^{(n+1)} < Y_{4s}^{(n+1)} < Y^*, \quad (Y_s^{(n+1)} \in D(n+1)).$$

Nyní sestrojíme na intervalu $\langle a, b \rangle$ funkce

$$\psi_{2s-1}^{(n+1)}(x) = -\frac{a_{n+1}}{2} \cos 4^n(x - x_1) + \frac{1}{2} (Y_{4s-3}^{(n+1)} + Y_{4s-2}^{(n+1)}),$$

$$\psi_{2s}^{(n+1)}(x) = \frac{a_{n+1}}{2} \cos 4^n(x - x_1) + \frac{1}{2} (Y_{4s-1}^{(n+1)} + Y_{4s}^{(n+1)}).$$

Buďte dále $x_2, x_3, x_4 \in \langle a, b \rangle$ takové, že

$$|x_1 - x_2| = \frac{\pi}{4^{n+1}}, \quad |x_1 - x_3| = \frac{3\pi}{4^{n+1}}, \quad |x_1 - x_4| = \frac{\pi}{4^n}$$

(tj. x_4 je druhý koncový bod intervalu $\langle a, b \rangle$).

Označme pro $[x, y] \in Q_s^{(n)}$:

$$P_{3s-2}^{(n+1)} = \mathcal{E} [|x - x_4| \leq |x_2 - x_4|, \psi_*(x) \leq y \leq \psi_{2s-1}^{(n+1)}(x)]_{[x,y]}$$


$$P_{3s-1}^{(n+1)} = \mathcal{E} [|x - x_1| \leq |x_3 - x_1|, \psi_{2s-1}^{(n+1)}(x) \leq y \leq \psi_{2s}^{(n+1)}(x)]_{[x,y]}$$

$$P_{3s}^{(n+1)} = \mathcal{E} [|x - x_4| \leq |x_2 - x_4|, \psi_{2s}^{(n+1)}(x) \leq y \leq \psi^*(x)]_{[x,y]}$$

$$Q_{3s-2}^{(n+1)} = \mathcal{E}_{[x,y]} [|x - x_1| \leq |x_2 - x_1|, \psi_*(x) \leq y \leq \psi_{2s-1}^{(n+1)}(x)],$$

$$Q_{3s-1}^{(n+1)} = \mathcal{E}_{[x,y]} [|x - x_4| \leq |x_3 - x_4|, \psi_{2s-1}^{(n+1)}(x) \leq y \leq \psi_{2s}^{(n+1)}(x)],$$

$$Q_{3s}^{(n+1)} = \mathcal{E}_{[x,y]} [|x - x_1| \leq |x_2 - x_1|, \psi_{2s}^{(n+1)}(x) \leq y \leq \psi^*(x)].$$



Obr. 1.

Množiny $Q_{3s-2}^{(n+1)}, Q_{3s-1}^{(n+1)}, Q_{3s}^{(n+1)}$ mají zřejmě týž charakter jako množina $Q_s^{(n)}$. Protože $s = 1, 2, \dots, 3^n$ obdržíme tak při $n + 1$ kroku funkce $\psi_1^{(n+1)}, \dots, \psi_{2 \cdot 3^n}^{(n+1)}$ a množiny $P_1^{(n+1)}, \dots, P_{3^{n+1}}^{(n+1)}; Q_1^{(n+1)}, \dots, Q_{3^{n+1}}^{(n+1)}$. Z konstrukce vyplývá, že jsou-li ψ^*, ψ_* částí hranice množiny $P_{3s-2}^{(n+1)}$ resp. $P_{3s}^{(n+1)}$ a x_*, x^* body intervalu $\langle a, b \rangle$ takové, že $|x_1 - x_*| < |x_1 - x^*|$ pak

$$\psi^*(x_*) - \psi_*(x_*) < \psi^*(x^*) - \psi_*(x^*);$$

jsou-li ψ^*, ψ_* částí hranice množiny $P_{3s-1}^{(n+1)}$, pak

$$\psi^*(x_*) - \psi_*(x_*) > \psi^*(x^*) - \psi_*(x^*).$$

Dále se snadno dokáže, že jestliže $[x_4, y] \in P_{3s-2}^{(n+1)}$ nebo $[x_4, y] \in P_{3s}^{(n+1)}$, pak platí $[x_4, y] \in P_s^{(n)}$, a jestliže $[x_1, y] \in P_{3s-1}^{(n+1)}$, pak platí jedno z těchto tří tvrzení: a) $x_1 = 0$, b) $x_1 = \pi$, c) existuje dvojice (i, r) , $r \leq n - 1$ tak, že $[x_1, y] \in P_i^{(r)}$.

Funkce $\psi_i^{(n)}$ ($n = 1, 2, \dots; i = 1, 2, \dots, 2 \cdot 3^{n-1}$) rozdělí nám množinu $\langle 0, \pi \rangle \times \langle 0, 1 \rangle$ na množiny $P_s^{(n)}$ ($n = 1, 2, \dots; s = 1, 2, \dots, 3^n$). Na těchto množinách sestrojujeme postupně funkce $h_{n,s}(x, y)$ ($h_{n,s}$ je definována na množině $P_s^{(n)}$) takto: Množina $P_1^{(1)}$ má vlastnosti množiny P z věty 2,1. Její hranice se skládá z funkcí $\psi_1^{(0)}, \psi_1^{(1)}$ a ze dvou svislých úseček, delší z nich má x -ovou souřadnici rovnou π , kratší $\frac{\pi}{4}$. Můžeme tedy podle věty 2,1 sestrojit na množině

$P_1^{(1)}$ spojitou funkci $h_{1,1}(x, y)$ takovou, že splňuje body 2, 3 věty 2,1 a že

$$h_{1,1}(x, \psi_1^{(0)}(x)) = 0, \quad h_{1,1}(x, \psi_1^{(1)}(x)) = \frac{1}{2}a_1 \sin x, \quad h_{1,1}(\pi, y) = 0;$$

$h_{1,1}\left(\frac{\pi}{4}, y\right)$ necht' je funkce se spojitou první derivací podle y taková, že

$$h_{1,1}\left(\frac{\pi}{4}, 0\right) = 0, \quad h_{1,1}\left(\frac{\pi}{4}, \psi_1^{(1)}\left(\frac{\pi}{4}\right)\right) = \left[\frac{d}{dx} \psi_1^{(1)}\right]_{x=\frac{\pi}{4}};$$

$$0 \leq h_{1,1}\left(\frac{\pi}{4}, y\right) \leq \left[\frac{d}{dx} \psi_1^{(1)}\right]_{x=\frac{\pi}{4}},$$

$$h_{1,1}\left(\frac{\pi}{4}, y\right) = 0 \quad \text{pro} \quad \left[\frac{\pi}{4}, y\right] \notin P_1^{(2)} \cup P_3^{(2)} \quad (= \chi^* \text{ z věty 2,1}).$$

Stejně budeme postupovat na množinách $P_2^{(1)}, P_3^{(1)}$.

Množina $P_s^{(n)}$ ($n = 1, 2, \dots; s = 1, 2, \dots, 3^n$) má vlastnosti množiny P z věty 2,1. Její hranice se skládá z funkcí $\psi^*, \psi_* \in \mathcal{Y}(n)$ a ze dvou svislých úseček, delší z nich necht' má souřadnici \bar{x} , kratší \bar{x} . Můžeme tedy postupně podle věty 2,1 sestrojovat na množinách $P_s^{(n)}$ spojitou funkci $h_{n,s}$, které splňují body 2 a 3 věty 2,1 a že

$$h_{n,s}(x, \psi_*(x)) = \psi'_*(x), \quad h_{n,s}(x, \psi^*(x)) = \psi'^*(x), \\ h_{n,s}(\bar{x}, y) = 0 \quad \text{pro} \quad \bar{x} = 0 \quad \text{nebo} \quad \bar{x} = \pi;$$

je-li $0 \neq \bar{x} \neq \pi$, pak podle (2,8) máme již definováno $h_{r,i}(\bar{x}, y)$ ($r = 1, 2, \dots, n - 1$) a definujeme $h_{n,s}(\bar{x}, y) = h_{r,i}(\bar{x}, y)$; $h_{n,s}(\tilde{x}, y)$ nechť je funkce se spojitou první derivací dle y taková, že

$$(2,9) \quad \begin{aligned} h_{n,s}(\tilde{x}, \psi^*(\tilde{x})) &= \psi^{*'}(\tilde{x}), \quad h_{n,s}(\tilde{x}, \psi_*(\tilde{x})) = \psi'_*(\tilde{x}), \\ |h_{n,s}(\tilde{x}, y)| &\leq \max(|h_{n,s}(\tilde{x}, \psi^*(\tilde{x}))|, |h_{n,s}(\tilde{x}, \psi_*(\tilde{x}))|), \\ h_{n,s}(\tilde{x}, y) &= 0 \quad \text{pro } [\tilde{x}, y] \text{ non } \in P_{3s-2}^{(n+1)} \cup P_{3s}^{(n+1)}. \end{aligned}$$

Funkci g definujeme na $\langle 0, \pi \rangle \times \langle 0, 1 \rangle$ takto:

$$\begin{aligned} g(x, y) &= h_{n,s}(x, y) \quad \text{pro } [x, y] \in P_s^{(n)}, \\ g(x, y) &= 0 \quad \text{pro } [x, y] \in \langle 0, \pi \rangle \times \langle 0, 1 \rangle - \bigcup_{n-1}^{\infty} \bigcup_{s=1}^{3^n} P_s^{(n)}. \end{aligned}$$

Označíme-li Ψ množinu všech funkcí $\psi_l^{(n)}$, kde $n = 1, 2, \dots$; $l = 1, 2, \dots, 2 \cdot 3^{n-1}$, pak zřejmě platí

Věta 2,2. *Množina Ψ je spočetná.*

Označme C množinu těch bodů $[x, y] \in \langle 0, \pi \rangle \times \langle 0, 1 \rangle$ pro které platí: Ke každému přirozenému číslu n existuje přirozené číslo s ($1 \leq s \leq 3^n$) takové, že $[x, y] \in Q_s^{(n)}$.

Věta 2,3. *Množina C je neprázdná. Buď $[x_0, y_0] \in C$. Pak $[x, y_0] \text{ non } \in C$ pro všechna $x \neq x_0$ a $[0, y_0] \in B$, kde B je množina zavedená ve větě 1,1. Zobrazení $[x_0, y_0] \rightarrow [0, y_0]$ je prosté.*

Důkaz. Z konstrukce plyne, že všechny koncové body funkcí $\psi_k^{(n)}$ s výjimkou bodů $[\pi, 0]$, $[\pi, 1]$ patří do množiny C . Koncovým bodem funkce $\psi_k^{(n)}$, která má definiční interval $\langle x_*, x^* \rangle$ rozumíme body $[x^*, \psi_k^{(n)}(x^*)]$, $[x_*, \psi_k^{(n)}(x_*)]$.

Buď nyní $[x_0, y_0] \in C$ a buďte l_1, l_2, \dots přirozená čísla taková, že $[x_0, y_0] \in Q_{l_1}^{(1)} \cap Q_{l_2}^{(2)} \cap \dots$. Potom zřejmě platí $Q_{l_1}^{(1)} \supset Q_{l_2}^{(2)} \supset \dots$; $d(Q_{l_i}^{(i)}) \rightarrow 0$. $Q_{l_1}^{(1)} \cap Q_{l_2}^{(2)} \cap \dots$ je tedy jednobodová množina, která obsahuje právě bod $[x_0, y_0]$. Existuje proto prosté zobrazení, které přiřazuje bodu $[x_0, y_0] \in C$ posloupnost l_1, l_2, \dots .

Buď B množina na ose y , zavedená ve větě 1,1. Očíslujme intervaly délky b_n postupně od osy x číslly $1, 2, \dots, 3^n$ a označme je $B_1^{(n)}, B_2^{(n)}, \dots, B_{3^n}^{(n)}$. Pak $[0, \tilde{y}_0] \in B \Rightarrow [0, \tilde{y}_0] \in B_{k_1}^{(1)} \cap B_{k_2}^{(2)} \cap \dots$. Opět platí $B_{k_1}^{(1)} \supset B_{k_2}^{(2)} \supset \dots$, $d(B_{k_i}^{(i)}) \rightarrow 0$ a tedy do množiny $B_{k_1}^{(1)} \cap B_{k_2}^{(2)} \cap \dots$ patří právě bod $[0, \tilde{y}_0]$. Existuje tedy prosté zobrazení, které přiřazuje bodu $[0, \tilde{y}_0] \in B$ posloupnost k_1, k_2, \dots . Odtud plyne, že existuje prosté zobrazení bodů $[x_0, y_0] \in C$ na body $[0, \tilde{y}_0] \in B$.

Dokážeme, že $y_0 = \tilde{y}_0$. Vezměme bod $[x_0, \tilde{y}_0]$. Je zřejmé, že $[x_0, \tilde{y}_0]$ patří do těchže $Q_{l_i}^{(i)}$ jako $[x_0, y_0]$.

Věta 2,4. *Funkce g je na intervalu $\langle 0, \pi \rangle \times \langle 0, 1 \rangle$ spojitá.*

Důkaz. V bodech $[x_0, y_0] \text{ non } \in C$ dokážeme spojitost snadno. Je třeba vyšetřit pouze body $[x_0, y_0] \in C$.

1. Platí $[x_0, y_0] \in C \Rightarrow g(x_0, y_0) = 0$. Necht $[x_0, y_0] \in C$. Pak buď

$$[x_0, y_0] \in \langle 0, \pi \rangle \times \langle 0, 1 \rangle - \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{l=1}^{3^n} P_l^{(n)},$$

v tomto případě bylo přímo definováno $g(x_0, y_0) = 0$; nebo

$$[x_0, y_0] \text{ non } \in \langle 0, \pi \rangle \times \langle 0, 1 \rangle - \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{l=1}^{3^n} P_l^{(n)}.$$

V tomto případě existuje takové přirozené N , že $[x_0, y_0] \in \bigcup_{n=1}^N \bigcup_{l=1}^{3^n} P_l^{(n)}$, ale

$[x_0, y_0] \text{ non } \in \bigcup_{n=1}^{N-1} \bigcup_{l=1}^{3^n} P_l^{(n)}$. Necht dále $[x_0, y_0] \in Q_m^{(N-1)} \Rightarrow [x_0, y_0]$ patří do právě jedné z množin $P_{3m-2}^{(N)}, P_{3m-1}^{(N)}, P_{3m}^{(N)}$. Necht patří např. do $P_{3m-2}^{(N)}$, pak ale $[x_0, y_0] \in Q_{3m-2}^{(N)}$ a dále $[x_0, y_0] \in Q_{3(3m-2)-1}^{(N+1)}$. Z toho plyne $[x_0, y_0] \in Q_{3(3m-2)-1}^{(N+1)} \cap P_{3m-2}^{(N)}$ a podle (2,9) plyne, že $g(x_0, y_0) = 0$. Stejně pro $[x_0, y_0] \in P_{3m-1}^{(N)}$ a $[x_0, y_0] \in P_{3m}^{(N)}$.

2. Dokážeme, že $[x, y] \in P_l^{(n)} \Rightarrow |g(x, y)| \leq \Phi(n)$, kde $\lim_{n \rightarrow \infty} \Phi(n) = 0$. Z konstrukce plyne, že buď

$$P_l^{(n)} = \mathcal{E}_{[x,y]} \left[x_* + \frac{\pi}{4^n} \leq x \leq x_* + \frac{\pi}{4^{n-1}}, \quad \psi_*(x) \leq y \leq \psi^*(x) \right],$$

nebo

$$P_l^{(n)} = \mathcal{E}_{[x,y]} \left[x_* - \frac{\pi}{4^{n-1}} \leq x \leq x_* - \frac{\pi}{4^n}, \quad \psi_*(x) \leq y \leq \psi^*(x) \right],$$

kde $\psi^*, \psi_* \in \Psi(n)$, derivace $\psi_*'(x_*) = \psi_*'(x_*) = 0$. Dále alespoň jedna z funkcí ψ^*, ψ_* , např. $\psi_* = \psi_{i_1}^{(n)}$, a necht $\psi^* = \psi_{i_k}^{(k)}$, kde $1 \leq k \leq n$. Potom podle poznámky za větou 2,1 je

$$(2,10) \quad |g(x, y)| \leq |\psi_*'(x)| + |\psi^{*'}(x)| + 3 \left[\max \left(\left| \psi_*' \left(x_* + \frac{\pi}{4^n} \right) \right|; \left| \psi^{*'} \left(x_* + \frac{\pi}{4^n} \right) \right| \right) + \max \left(\left| \psi_*' \left(x_* + \frac{\pi}{4^{n-1}} \right) \right|; \left| \psi^{*'} \left(x_* + \frac{\pi}{4^{n-1}} \right) \right| \right) \right],$$

resp.

$$(2,11) \quad |g(x, y)| \leq |\psi_*'(x)| + |\psi^{*'}(x)| + 3 \left[\max \left(\left| \psi_*' \left(x_* - \frac{\pi}{4^{n-1}} \right) \right|; \left| \psi^{*'} \left(x_* - \frac{\pi}{4^{n-1}} \right) \right| \right) + \max \left(\left| \psi_*' \left(x_* - \frac{\pi}{4^n} \right) \right|; \left| \psi^{*'} \left(x_* - \frac{\pi}{4^n} \right) \right| \right) \right].$$

Odhadneme výraz (2,10). Odhad výrazu (2,11) je zřejmě zcela obdobný. Protože podle předpokladu je $\frac{1}{4} < 4b_1 < 2a_1 + 3b_1 = 1$ platí

$$|\psi_*'(x)| \leq \frac{a_n}{2} \cdot 4^{n-1} = \frac{a_1}{2} (4b_1)^{n-1} \rightarrow 0 \quad \text{pro } n \rightarrow \infty,$$

$$|\psi^{*'}(x)| \leq \frac{a_n}{2} \cdot 4^{n-1} = \frac{a_1}{2} (4b_1)^{n-1} \rightarrow 0 \quad \text{pro } n \rightarrow \infty, \quad k = n,$$

$$|\psi^{*'}(x)| \leq \left| \frac{a_k}{2} 4^{k-1} \cdot \sin 4^{k-1} \cdot x \right| \leq \left| \frac{a_k}{2} 4^{k-1} \cdot \sin 4^{k-1} \left(x_* + \frac{\pi}{4^{n-1}} \right) \right| =$$

$$= \left| \frac{a_1}{2} (4b_1)^{k-1} \cdot \sin \frac{\pi}{4^{n-k}} \right| = \frac{a_1}{2} \cdot (4b_1)^{n-1} \cdot \frac{\sin \frac{\pi}{4^{n-k}}}{\frac{\pi}{4^{n-k}}} \cdot \frac{\pi}{(16b_1)^{n-k}} \rightarrow 0$$

pro $n \rightarrow \infty$ a $k = 1, 2, \dots, n-1$,

a tedy zřejmě existuje zmíněná funkce $\Phi(n)$.

Z těchto dvou výsledků se již snadno dokáže, že funkce g je v $[x_0, y_0] \in C$ spojitá.

Věta 2.5. *Diferenciální rovnice*

$$(2,12) \quad y' = g(x, y)$$

má právě jedno řešení jdoucí bodem $[x_0, y_0] \in \langle 0, \pi \rangle \times \langle 0, 1 \rangle$.

Důkaz. Existence takového řešení plyne ze spojitosti funkce g . Jestliže $[x_0, y_0]$ není $\in C$, pak máme lokální jednoznačnost zaručenu větou 2.1. Stačí opět vyšetřovat pouze body množiny C .

1. Nechť $[x_0, y_0]$ je koncový bod funkce $\psi_{2l-1}^{(n+1)}$. Z konstrukce funkce g víme, že body $[x, \psi_{2l-1}^{(n+1)}(x)] \in Q_l^{(n)}$. Použijeme-li označení, které jsme zavedli při konstrukci funkce g , potom platí $|x - x_1| \leq |x_4 - x_1| = \frac{\pi}{4^n}$ a $\psi_{2l-1}^{(n+1)}(x) \in \langle Y_{4l-3}^{(n+1)}, Y_{4l-2}^{(n+1)} \rangle$. Vyšetřujme bod $[x_1, \psi_{2l-1}^{(n+1)}(x_1)]$; při vyšetřování bodu $[x_4, \psi_{2l-1}^{(n+1)}(x_4)]$ a také bodů $[x_1, \psi_{2l-1}^{(n+1)}(x_1)]$, $[x_4, \psi_{2l-1}^{(n+1)}(x_4)]$ bychom postupovali stejně.

Buď u libovolné řešení rovnice (2,12) takové, že $u(x_1) = \psi_{2l-1}^{(n+1)}(x_1)$. Potom zřejmě není možné, aby $u(x) > \psi_{2l-1}^{(n+1)}(x)$ pro $|x - x_1| \leq |x_3 - x_1|$, protože

$$\mathcal{E}_{[x,y]} [|x - x_1| \leq |x_3 - x_1|, \psi_{2l-1}^{(n+1)}(x) \leq y \leq \psi_{2l-1}^{(n+1)}(x)] = P_{3l-1}^{(n+1)}.$$

Dokážeme, že není možné ani aby $u(x) < \psi_{2l-1}^{(n+1)}(x)$. Vybereme posloupnost funkcí $\psi_s^{(n+k+1)}$, kde $s = 2 \cdot 3^{(k-1)} \cdot (3l-2)$ a $k = 1, 2, \dots$. Z konstrukce funkce g je zřejmé, že pro $|x - x_1| \leq \frac{\pi}{4^{n+k}}$ je

$$\psi_s^{(n+k+1)}(x) = \frac{1}{2} a_{n+k+1} \cdot \cos 4^{n+k}(x - x_1) + \frac{1}{2} (Y_{2s-1}^{(n+k+1)} + Y_{2s}^{(n+k+1)}).$$

Zřejmě pro $k \rightarrow \infty$ je

$$(2,13) \quad \psi_{2l-1}^{(n+1)}(x_1) - \psi_s^{(n+k+1)}(x_1) = Y_{4l-3}^{(n+1)} - Y_{2s}^{(n+k+1)} = b_{n+k+1} \rightarrow 0,$$

$$\psi_{2l-1}^{(n+1)}(\bar{x}) - \psi_s^{(n+k+1)}(\bar{x}) = \frac{a_{n+1}}{2} \left(1 - \cos \frac{\pi}{4^k} \right) + a_{n+k+1} + b_{n+k+1},$$

kde $|\bar{x} - x_1| = \frac{\pi}{4^{n+k}}$.

Dále: Existuje jediné řešení rovnice (2,12) pro $\frac{\pi}{4^{n+k}} \leq |x - x_1| \leq x_4$, které prochází bodem $[\bar{x}, \psi_s^{(n+k+1)}(\bar{x})]$, neboť toto řešení prochází množinami $P_{3k-1, (3l-2)}^{(n+k)}$, $P_{3k-2, (3l-2)}^{(n+k-1)}$, ..., $P_{3l-2}^{(n+1)}$. Nazveme toto řešení prodloužením funkce $\psi_s^{(n+k+1)}$ na celou množinu $Q_l^{(n)}$ a takto prodlouženou funkci $\psi_s^{(n+k+1)}$ označíme v_k .

Je patrné, že u nemůže protnout žádnou funkci v_k uvnitř $Q_l^{(n)}$. Ale v_k konverguje na $Q_l^{(n)}$ stejnoměrně k $\psi_{2l-1}^{(n+1)}$, neboť: Buď $|x - x_1| \leq \frac{\pi}{4^{n+k}}$, pak podle (2,13)

$$\text{je } (\psi_{2l-1}^{(n+1)}(x) - v_k(x)) \leq (\psi_{2l-1}^{(n+1)}(\bar{x}) - v_k(\bar{x})) \leq \left[\frac{1}{2} a_{n+1} \left(1 - \cos \frac{\pi}{4^k} \right) + a_{n+k+1} + \right. \\ \left. + b_{n+k+1} \right] \cdot \frac{a_{n+k} + b_{n+k} + \frac{1}{2} a_{n+1} \left(1 - \cos \frac{\pi}{4^{k-1}} \right)}{b_{n+k}} \dots \frac{a_{n+1} + b_{n+1} + \psi_*(x_4)}{b_{n+1}} (1 + \varepsilon),$$

nebo

$$\frac{\pi}{4^{n+k-m+1}} \leq |x - x_1| \leq \frac{\pi}{4^{n+k-m}} \quad (m = 1, 2, \dots, k),$$

pak $[x, v_k(x)] \in P_{3k-m, (3l-2)}^{(n+k-m+1)}$ a platí podle (2,3) resp. (2,4)

$$(2,14) \quad \psi_{2l-1}^{(n+1)}(x) - v_k(x) \leq \left[a_{n+k+1} + b_{n+k+1} + \frac{1}{2} a_{n+1} \left(1 - \cos \frac{\pi}{4^k} \right) \right] \cdot \\ \frac{a_{n+k} + b_{n+k} + \frac{1}{2} a_{n+1} \left(1 - \cos \frac{\pi}{4^{k-1}} \right)}{b_{n+k}} \dots \frac{a_{n+2} + b_{n+2} + \frac{1}{2} a_{n+1} \left(1 - \cos \frac{\pi}{4} \right)}{b_{n+2}} \cdot \\ \frac{a_{n+1} + b_{n+1} + \psi_*(x_4)}{b_{n+1}} (1 + \varepsilon).$$

Snadno zjistíme, že pro $\frac{1}{16} < b_1 < \frac{1}{4}$ je $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos \pi \cdot 4^{-x}}{b_1^x} = 0$. Existuje tedy

k_0 takové, že pro $k \geq k_0$ je $\left(1 - \cos \frac{\pi}{4^k} \right) < b_1^k$ a $\frac{1}{2} a_{n+1} \left(1 - \cos \frac{\pi}{4^k} \right) < a_{n+k+1}$.

Můžeme tedy pro $k \geq k_0$ přepsat (2,14) takto:

$$\psi_{2l-1}^{(n+1)}(x) - v_k(x) \leq [2a_{n+k+1} + b_{n+k+1}] \cdot \frac{2a_{n+k} + b_{n+k}}{b_{n+k}} \dots \frac{2a_{n+k_0+1} + b_{n+k_0+1}}{b_{n+k_0+1}} \cdot \\ \frac{a_{n+k_0} + b_{n+k_0} + \frac{1}{2} a_{n+1} \left(1 - \cos \frac{\pi}{4^{k_0-1}} \right)}{b_{n+k_0}} \dots \frac{a_{n+2} + b_{n+2} + \frac{1}{2} a_{n+1} \left(1 - \cos \frac{\pi}{4} \right)}{b_{n+2}} \cdot \\ \frac{a_{n+1} + b_{n+1} + \psi_*(x_4)}{b_{n+1}} (1 + \varepsilon) = (2a_1 \cdot b_1^{n+k_0} + b_1^{n+k_0+1}) \cdot b_1^{k-k_0} \cdot \left(1 + 2 \frac{a_1}{b_1} \right)^{k-k_0} \cdot \\ \frac{a_{n+k_0} + b_{n+k_0} + \frac{1}{2} a_{n+1} \left(1 - \cos \frac{\pi}{4^{k_0-1}} \right)}{b_{n+k_0}} \dots \frac{a_{n+2} + b_{n+2} + \frac{1}{2} a_{n+1} \left(1 - \cos \frac{\pi}{4} \right)}{b_{n+2}}.$$

$$\begin{aligned} & \frac{a_{n+1} + b_{n+1} + \psi_*(x_4)}{b_{n+1}} \cdot (1 + \varepsilon) = (2a_1 b_1^{n+k_0} + b_1^{n+k_0+1}) \cdot \\ & \frac{a_{n+k_0} + b_{n+k_0} + \frac{1}{2} a_{n+1} \left(1 - \cos \frac{\pi}{4^{k_0-1}}\right)}{b_{n+k_0}} \cdot \\ & \dots \frac{a_{n+2} + b_{n+2} + \frac{1}{2} a_{n+1} \left(1 - \cos \frac{\pi}{4}\right)}{b_{n+2}} \cdot \frac{a_{n+1} + b_{n+1} + \psi_*(x_4)}{b_{n+1}} \cdot \\ & \cdot (b_1 + 2a_1)^{k-k_0} \rightarrow 0 \quad \text{pro } k \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Musí tedy být $u(x) = \psi_{2l-1}^{(n+1)}$ a to je jediné řešení rovnice (2,12) vyhovující dané počáteční podmínce pro $x \in Q_i^{(4)}$.

Není-li $x_1 = 0$ nebo $x_1 = \pi$ pak na opačnou stranu (tj. mimo množinu $Q_i^{(n)}$) vychází z bodu $[x_1, \psi_{2l-1}^{(n+1)}(x_1)]$ právě jedno řešení, protože $Q_i^{(n)}$ „sousedí“ s množinou $P_s^{(n)}$, kde r je některé přirozené číslo $0 \leq r \leq n-1$.

2. Necht $[x_0, y_0] \in C$ a není koncovým bodem žádné z funkcí množiny Ψ .

Necht $[x_0, y_0] \in \bigcap_{n=1}^{\infty} Q_n^{(n)}$ a necht

$$Q_n^{(n)} = \mathcal{E}_{[x,y]} \left[x_n^* \leq x \leq x_n^* + \frac{\pi}{4^n}, \quad \psi_n^*(x) \leq y \leq \psi_n^{**}(x) \right],$$

kde $\psi_n^*, \psi_n^{**} \in \Psi(n)$. Buďte u_1, u_2 řešení rovnice (2,12) jdoucí bodem $[x_0, y_0]$. Podobně jako v první části důkazu prodloužíme funkce ψ_n^*, ψ_n^{**} na celý interval $\langle 0, \pi \rangle$. Označíme-li prodloužení těchto funkcí v_n resp. w_n pak zřejmě $\{v_n\}$ je rostoucí, $\{w_n\}$ je klesající posloupnost funkcí a stejně jako v první části dokážeme, že $|v_n(x) - w_n(x)| \rightarrow 0$ stejnoměrně pro $n \rightarrow \infty$.

Řešení u_1 a u_2 nemohou, jak plyne z první části důkazu, žádnou z funkcí v_n, w_n protnout a tedy $|u_1(x) - u_2(x)| < |v_n(x) - w_n(x)|$ pro všechna n . Musí platit $u_1(x) = u_2(x)$ a tedy bodem $[x_0, y_0]$ prochází právě jedno řešení rovnice (2,12).

Poznámka. Je zřejmé, že pro $[x, y] \in E_2 - \langle 0, \pi \rangle \times \langle 0, 1 \rangle$ můžeme položit $g(x, y) = 0$ a spojitost a jednoznačnost řešení rovnice $y' = g(x, y)$ zůstane zachována.

III

Nyní sestrojíme na intervalu $\langle 0, 8\pi \rangle$ funkce σ a η . Na definičním intervalu $\langle 0, 8\pi \rangle$ sestrojíme nejprve dělení popsané v kap. I takové, že za první členy posloupností zvolíme $\frac{1}{8}$ resp. $\frac{1}{4}$.

Bud $T_l^{(n)}$, ($l = 1, 2, \dots, 4 \cdot 3^{n-1}$) dělicí body vzniklé při n -tém kroku. Pak intervaly $\langle T_{4k-3}^{(n)}, T_{4k-2}^{(n)} \rangle$, $\langle T_{4k-1}^{(n)}, T_{4k}^{(n)} \rangle$, $k = 1, 2, \dots, 3^{n-1}$ mají délku $\frac{\pi}{4^{n-1}}$.

Definujeme funkci σ' takto

$$\begin{aligned}\sigma'(t) &= (-1)^{k-1} \quad \text{pro } t \in (T_{4k-3}^{(n)}, T_{4k-2}^{(n)}), \\ \sigma'(t) &= (-1)^k \quad \text{pro } t \in (T_{4k-1}^{(n)}, T_{4k}^{(n)}).\end{aligned}$$

Podle věty 1,1 máme tímto předpisem definovanou funkci σ' skoro všude na intervalu $\langle 0, 8\pi \rangle$. Podle známých vět z integrálního počtu platí následující věty:

Věta 3,1. *Funkce σ' má Lebesgueův integrál v intervalu $\langle 0, 8\pi \rangle$.*

Věta 3,2. *Funkce σ definovaná vztahem $\sigma(t) = \int_0^t \sigma'(\tau) d\tau$ pro $t \in \langle 0, 8\pi \rangle$ je absolutně spojitá, lipschitzovská s konstantou jedna a platí $\frac{d}{dt} \sigma(t) = \sigma'(t)$ skoro všude v $\langle 0, 8\pi \rangle$.*

Z definice funkce σ dokážeme následující větu:

Věta 3,3. *Bud' $\langle T_*, T^* \rangle$ interval délky $\frac{2\pi}{4^{n-2}}$ sestrojený při dělení intervalu $\langle 0, 8\pi \rangle$, $T_{4r-3}^{(n)}$, $T_{4r-2}^{(n)}$, $T_{4r-1}^{(n)}$, $T_{4r}^{(n)}$ jeho dělicí body. Pak platí*

$$(3,1) \quad \sigma(T_*) = \sigma(T_{4r-3}^{(n)}) = \sigma(T_{4r}^{(n)}) = \sigma(T^*),$$

$$\sigma(T_{4r-2}^{(n)}) - \sigma(T_{4r-3}^{(n)}) = \sigma(T_{4r-1}^{(n)}) - \sigma(T_{4r}^{(n)}) = (-1)^{r-1} \cdot \frac{\pi}{4^{n-1}}.$$

Důkaz.

$$\begin{aligned}\sigma(T_{4r-3}^{(n)}) &= \sigma(T_*) + \int_{T_*}^{T_{4r-3}^{(n)}} \sigma'(\tau) d\tau = \sigma(T_*) + (-1)^{r-1} \int_0^{T_1^{(n)}} \sigma'(\tau) d\tau = \\ &= \sigma(T_*) + \sum_{m=n+1}^{\infty} \sum_{l=1}^{2 \cdot 3^{m-n-1}} (-1)^{r-1} \cdot \left(\int_{T_{4l-3}^{(m)}}^{T_{4l-2}^{(m)}} \sigma'(\tau) d\tau + \int_{T_{4l-1}^{(m)}}^{T_{4l}^{(m)}} \sigma'(\tau) d\tau \right) = \sigma(T_*).\end{aligned}$$

Stejně se spočte, že $\sigma(T^*) = \sigma(T_{4r}^{(n)})$ a $\sigma(T_{4r}^{(n)}) = \sigma(T_{4r-3}^{(n)})$. Vztahy (3,1) plynou přímo z definice funkce σ .

Nyní stejným způsobem budeme definovat funkci η na intervalu $\langle 0, 8\pi \rangle$ takto

$$\eta'(t) = \frac{a_n}{2} \cdot 4^{n-1} \cdot \sin 4^{n-1}(t - T_{2k-1}^{(n)}) \quad \text{pro } t \in (T_{2k-1}^{(n)}, T_{2k}^{(n)}),$$

kde a_n bylo zavedeno při konstrukci funkce g . Stejně jako v předcházejícím máme funkci η' definovanou v intervalu $\langle 0, 8\pi \rangle$ skoro všude a platí:

Věta 3,4. *Funkce η' má v intervalu $\langle 0, 8\pi \rangle$ Lebesgueův integrál.*

Věta 3,5. *Funkce η definovaná vztahem $\eta(t) = \int_0^t \eta'(\tau) d\tau$ pro $t \in \langle 0, 8\pi \rangle$ je absolutně spojitá, rostoucí a skoro všude v $\langle 0, 8\pi \rangle$ je $\frac{d}{dt} \eta(t) = \eta'(t)$.*

Nyní dokážeme některé vlastnosti funkce η :

Věta 3,6. Platí $\eta(T_k^{(n)}) = Y_k^{(n)}$, kde $k = 1, 2, \dots, 4 \cdot 3^{n-1}$ ($Y_k^{(n)} \in D(n)$) provedeného na interval $\langle 0, 1 \rangle$ při konstrukci funkce g .

Důkaz. Nejprve dokážeme, že platí

$$(3,2) \quad \eta(T_{2l}^{(n)}) - \eta(T_{2l-1}^{(n)}) = \\ = \int_{T_{2l-1}^{(n)}}^{T_{2l}^{(n)}} \eta'(\tau) d\tau = \frac{1}{2} a_n \cdot 4^{n-1} \int_{T_{2l-1}^{(n)}}^{T_{2l}^{(n)}} \sin 4^{n-1}(\tau - T_{2l-1}^{(n)}) d\tau = a_n.$$

Důkaz dokončíme úplnou indukcí. Pro $n = 1$ platí

$$\eta(T_1^{(1)}) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{l=1}^{2 \cdot 3^{n-1}} \int_{T_{2l-1}^{(n+1)}}^{T_{2l}^{(n+1)}} \eta'(\tau) d\tau = \sum_{n=1}^{\infty} 2 \cdot 3^{n-1} a_{n+1} = b_1 = Y_1^{(1)}.$$

Podobně

$$\eta(T_2^{(1)}) = Y_2^{(1)}, \quad \eta(T_3^{(1)}) = Y_3^{(1)} \quad \text{a} \quad \eta(T_4^{(1)}) = Y_4^{(1)}.$$

Buď nyní $\langle T_*, T^* \rangle$ interval délky $\frac{2\pi}{4^{n-1}}$ sestrojený při dělení intervalu $\langle 0, 8\pi \rangle$ a $T_{4k-3}^{(n+1)}, \dots, T_{4k}^{(n+1)}$ dělicí body tohoto intervalu. Platí

$$\eta(T_*) = Y_*, \quad \eta(T^*) = Y^*, \quad Y^* - Y_* = b_n; \quad Y_*, Y^* \in D(n)$$

a

$$\eta(T_{4k-3}^{(n+1)}) = \int_0^{T_{4k-3}^{(n+1)}} \eta'(\tau) d\tau = \eta(T_*) + \int_{T_*}^{T_{4k-3}^{(n+1)}} \eta'(\tau) d\tau = \eta(T_*) + \int_0^{T_1^{(n+1)}} \eta'(\tau) d\tau = \\ = \eta(T_*) + \sum_{m=n+2}^{\infty} \sum_{l=1}^{2 \cdot 3^{m-n-2}} \int_{T_{2l-1}^{(m)}}^{T_{2l}^{(m)}} \eta'(\tau) d\tau = \eta(T_*) + \sum_{m=n+2}^{\infty} \sum_{l=1}^{2 \cdot 3^{m-n-2}} a_m = \\ = \eta(T_*) + \sum_{m=n+2}^{\infty} 2 \cdot 3^{m-n-2} \cdot a_m = \eta(T_*) + b_{n+1} = Y_{4k-3}^{(n+1)}.$$

Podle (1,3) a (3,2) plyne $\eta(T_{4k-2}^{(n+1)}) = Y_{4k-2}^{(n+1)}$ a podobně se dokáží další rovnosti.

Věta 3,7. Buď $t \in \langle T_{2k-1}^{(n)}, T_{2k}^{(n)} \rangle$. Pak platí $\eta(t) = \varphi_k^{(n)}(\sigma(t))$, kde $\varphi_k^{(n)}$ bylo definováno v kap. II.

Důkaz. Buď $t \in \langle T_{2k-1}^{(n)}, T_{2k}^{(n)} \rangle$. Pak jest

$$\eta(t) = \eta(T_{2k-1}^{(n)}) + \int_{T_{2k-1}^{(n)}}^t \frac{a_n}{2} 4^{n-1} \sin 4^{n-1}(x - T_{2k-1}^{(n)}) dx = \\ = Y_{2k-1}^{(n)} + \frac{a_n}{2} - \frac{a_n}{2} \cos 4^{n-1}(t - T_{2k-1}^{(n)}) = \frac{1}{2} (Y_{2k-1}^{(n)} + Y_{2k}^{(n)}) - \\ - \frac{a_n}{2} \cos 4^{n-1}(t - T_{2k-1}^{(n)}), \\ \sigma(t) = \sigma(T_{2k-1}^{(n)}) + \int_{T_{2k-1}^{(n)}}^t \sigma'(x) dx = \sigma(T_{2k-1}^{(n)}) + (-1)^{\frac{k(k-1)}{2}} (t - T_{2k-1}^{(n)}).$$

Dále je $\sigma(T_{2k-1}^{(n)}) = \varepsilon_1\pi + \varepsilon_2 \cdot \frac{\pi}{4} + \dots + \varepsilon_n \frac{\pi}{4^{n-1}}$, $\varepsilon_i = 0, 1, -1$; přitom $\varepsilon_n \neq 0$ pro k sudé, $\varepsilon_n = 0$ pro k liché, a $x_1 = m \frac{\pi}{4^{n-2}}$, kde m je vhodné číslo. Odtud

$$\begin{aligned} \psi_k^{(n)}(\sigma(t)) &= (-1)^k \frac{a_n}{2} \cos 4^{n-1}(\sigma(t) - x_1) + \frac{1}{2}(Y_{2k-1}^{(n)} + Y_{2k}^{(n)}) = \\ &= (-1)^k \frac{a_n}{2} \cos 4^{n-1} \left[\varepsilon_1\pi + \dots + \varepsilon_n \frac{\pi}{4^{n-1}} + \right. \\ &\quad \left. + (t - T_{2k-1}^{(n)}) \cdot (-1)^{\frac{k(k-1)}{2}} - m \frac{\pi}{4^{n-2}} \right] + \frac{1}{2}(Y_{2k-1}^{(n)} + Y_{2k}^{(n)}) = \\ &= (-1)^k \frac{a_n}{2} \cos \left\{ 4^{n-1}(t - T_{2k-1}^{(n)})(-1)^{\frac{k(k-1)}{2}} + \varepsilon_n\pi \right\} + \frac{1}{2}(Y_{2k-1}^{(n)} + Y_{2k}^{(n)}) = \eta(t). \end{aligned}$$

Mějme nyní funkci g , definovanou v kap. II. Mějme systém diferenciálních rovnic

$$(3,4) \quad \frac{dx}{dt} = 1, \quad \frac{dy}{dt} = g(x, y)$$

$([x, y] \in \langle 0, \pi \rangle \times \langle 0, 1 \rangle)$.

Tento systém je ekvivalentní s rovnicí (2,12) a tedy počátečními podmínkami $x(t_0) = x_0$, $y(t_0) = y_0$ je dáno právě jedno řešení. Přepíšme systém rovnic (3,4) na systém integrálních rovnic

$$(3,5) \quad x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t d\tau, \quad y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t g(x(\tau), y(\tau)) d\tau.$$

Také tento systém má právě jedno řešení $[x(t), y(t)]$. Avšak platí:

Věta 3,8. *Buďte σ, η funkce definované v této kapitole. Potom systém integrálních rovnic*

$$(3,6) \quad x(t) = \int_0^t d\sigma(\tau), \quad y(t) = \int_0^t g(x(\tau), y(\tau)) d\sigma(\tau)$$

řeší na intervalu $\langle 0, 8\pi \rangle$ jednak $[\sigma(t), 0]$, jednak $[\sigma(t), \eta(t)]$.

Důkaz. Z konstrukce funkce g plyne, že $g(x, 0) = 0$ a tedy $[\sigma(t), 0]$ je řešením (3,6). Dále ze vztahu

$$\psi_k^{(n)}(\sigma(t)) - \psi_k^{(n)}(\sigma(T_{2k-1}^{(n)})) = \int_{\sigma(T_{2k-1}^{(n)})}^{\sigma(t)} g(x, \psi_k^{(n)}(x)) dx$$

vyplývá podle vět 3,6 a 3,7

$$\eta(t) - \eta(T_{2k-1}^{(n)}) = \int_{\sigma(T_{2k-1}^{(n)})}^{\sigma(t)} g(x, \psi_k^{(n)}(x)) dx = \int_{T_{2k-1}^{(n)}}^t g(\sigma(\tau), \eta(\tau)) d\sigma(\tau).$$

Odtud plyne $\eta(t) = \int_0^t g(\sigma(\tau), \eta(\tau)) d\sigma(\tau)$. Tím je důkaz proveden.

IV

Buďte $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ posloupnosti, $Y_k^{(n)}$ body a $\psi_k^{(n)}$ funkce zavedené v kapitole II tohoto článku.

Položme $d = \frac{3b_1}{2a_1 + 2b_1}$. Nejprve sestrojíme na ose t body A_n ($n = 1, 2, \dots$)

takto: $A_1 = -\frac{3b_1}{2a_1 - b_1}$, $A_{n+1} - A_n = d^n$. Zřejmě platí

$$(4,1) \quad A_1 + \sum_{n=1}^{\infty} (A_{n+1} - A_n) = A_1 + \sum_{n=1}^{\infty} d^n = 0.$$

Každý interval $\langle A_n, A_{n+1} \rangle$ budeme dále dělit. Při prvním kroku rozdělíme tento interval na tři stejné díly a tak obdržíme body $T_1^{(1)}, T_3^{(1)}$ (index n , který by označoval, že se jedná o body intervalu $\langle A_n, A_{n+1} \rangle$ pro jednodušší psaní vynecháme). Při druhém kroku každý z intervalů $\langle A_n, T_1^{(1)} \rangle$, $\langle T_1^{(1)}, T_3^{(1)} \rangle$, $\langle T_3^{(1)}, A_{n+1} \rangle$ opět rozdělíme na tři stejné díly. Tak obdržíme body $T_1^{(2)}, T_3^{(2)}, \dots, T_{11}^{(2)}$. Tak postupujeme dále, až naposledy při n -tém kroku obdržíme body $T_1^{(n)}, T_3^{(n)}, \dots, T_{4 \cdot 3^{n-1}-1}^{(n)}$. Takto vzniklé intervaly mají délku $\frac{d^n}{3^n}$. Dále označme $T_{2l}^{(r)} = T_{2l-1}^{(r)} + \frac{d^n}{2 \cdot 3^n}$ ($r = 1, 2, \dots, n; l = 1, 2, \dots, 2 \cdot 3^{r-1}$). Tímto způsobem jsme původní interval $\langle A_n, A_{n+1} \rangle$ rozdělili na interval délky $\frac{d^n}{3^n}$ a na $(3^n - 1) \cdot 2$ intervalů délky $\frac{d^n}{2 \cdot 3^n}$.

Nyní sestrojíme posloupnosti funkcí $\varphi_n(t)$, $\eta_n(t)$, ($n = 1, 2, \dots$) a funkci $f(y, t)$ pro $t \in \langle A_1, -A_1 \rangle$, $y \in (-\infty, \infty)$.

Nechť φ_n ($n = 1, 2, 3, \dots$) je spojitá funkce taková, že platí:

$$\begin{aligned} \varphi_n(t) &= 0 && \text{pro } t \in \langle A_1, A_n \rangle \cup \langle 0, -A_1 \rangle, \\ \varphi_n(t) &> 0 && \text{pro } t \in (A_{n+1}, 0), \\ (-1)^{s-1} \cdot \varphi_n(t) &> 0 && \text{pro } t \in (T_{4s-3}^{(r)}, T_{4s-2}^{(r)}), \\ (-1)^s \cdot \varphi_n(t) &> 0 && \text{pro } t \in (T_{4s-1}^{(r)}, T_{4s}^{(r)}), \end{aligned}$$

kde $T_{4s-3}^{(r)}, \dots, T_{4s}^{(r)} \in \langle A_n, A_{n+1} \rangle$; $r = 1, \dots, n$; $s = 1, \dots, 3^{r-1}$. Pro ostatní body intervalu $\langle A_n, A_{n+1} \rangle$ buď $\varphi_n(t) = 0$. Dále nechť platí

$$(4,2) \quad \int_{T_{4s-3}^{(r)}}^{T_{4s-2}^{(r)}} \varphi_n(\tau) d\tau = - \int_{T_{4s-1}^{(r)}}^{T_{4s}^{(r)}} \varphi_n(\tau) d\tau = (-1)^{s-1} \cdot \frac{\pi}{4^r}, \quad \int_{A_{n+1}}^0 \varphi_n(\tau) d\tau = 1.$$

Ukážeme, že takto definovaná posloupnost funkcí φ_n konverguje k Diracově funkci podle definice 5,1 článku [2], tj. dokážeme, že jsou splněny podmínky (0,2)–(0,6) tohoto článku.

Platí

$$\int_{A_1}^{-A_1} |\varphi_n(\tau)| d\tau = \sum_{r=1}^n \sum_{s=1}^{3r-1} \left[(-1)^{s-1} \int_{T_{4s-3}^{(r)}}^{T_{4s-2}^{(r)}} \varphi_n(\tau) d\tau + (-1)^s \int_{T_{4s-1}^{(r)}}^{T_{4s}^{(r)}} \varphi_n(\tau) d\tau \right] + \int_{A_{n+1}}^0 \varphi_n(\tau) d\tau = \sum_{r=1}^n \sum_{s=1}^{3r-1} 2 \cdot \frac{\pi}{4^r} + 1 = \frac{\pi}{2} \sum_{r=1}^n \left(\frac{3}{4}\right)^{r-1} + 1,$$

a tedy

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_{A_1}^{-A_1} |\varphi_n(\tau)| d\tau = \frac{\pi}{2} \sum_{r=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^{r-1} + 1 = 2\pi + 1 = L < \infty.$$

Podmínky (0,3), (0,4) a (0,5) jsou zřejmě splněny, neboť jak plyne z (4,1), od jistého n je $\varphi_n(\tau) = 0$ pro $\tau \in \langle A_1, t \rangle$ resp. je $\varphi_n(\tau) = 0$ pro $\tau \in \langle 0, -A_1 \rangle$.

Pro $t \in \langle 0, -A_1 \rangle$ platí

$$\int_{A_1}^t \varphi_n(\tau) d\tau = \int_{A_1}^0 \varphi_n(\tau) d\tau = \sum_{r=1}^n \sum_{s=1}^{3r-1} \left[\int_{T_{4s-3}^{(r)}}^{T_{4s-2}^{(r)}} \varphi_n(\tau) d\tau + \int_{T_{4s-1}^{(r)}}^{T_{4s}^{(r)}} \varphi_n(\tau) d\tau \right] + \int_{A_{n+1}}^0 \varphi_n(\tau) d\tau = \int_{A_{n+1}}^0 \varphi_n(\tau) d\tau = 1,$$

a odtud plyne podmínka (0,6).

Obdobným způsobem jako věta 3,3 dokáže se následující tvrzení:

Věta 4.1. *Buď $\Phi_n(t) = \int_{A_1}^t \varphi_n(\tau) d\tau$ a necht $T_k^{(r)}$ jsou dělicí body intervalu $\langle A_n, A_{n+1} \rangle$. Potom platí*

$$\begin{aligned} \Phi_n(T_1^{(r)}) &= \Phi_n(T_4^{(r+1)}) = \Phi_n(T_1^{(r)}) = 0, \\ \Phi_n(T_{4 \cdot 3r-3}^{(r+1)}) &= \Phi_n(T_{4 \cdot 3r}^{(r+1)}) = \Phi_n(T_{4 \cdot 3r-1}^{(r)}) = 0, \end{aligned}$$

Buďte $T_, T^* \in \{T_1^{(1)}, \dots, T_4^{(1)}, T_1^{(2)}, \dots, T_{12}^{(2)}, \dots, T_1^{(r)}, \dots, T_{4 \cdot 3r-1}^{(r)}\}$ takové, že $T_{4s-4}^{(r+1)} < T_* < T_{4s-3}^{(r+1)} < \dots < T_{4s}^{(r-1)} < T^* < T_{4s+1}^{(r+1)}$. Potom*

$$\begin{aligned} \Phi_n(T_*) &= \Phi_n(T_{4s-3}^{(r+1)}) = \Phi_n(T_{4s}^{(r+1)}) = \Phi_n(T^*), \\ \Phi_n(T_{4s-2}^{(r+1)}) &= \Phi_n(T_{4s-1}^{(r+1)}). \end{aligned}$$

Na základě této věty a vztahů (4,2) můžeme definovat funkce η_n ($n = 1, 2, \dots$) takto (viz obr. 2):

$$\begin{aligned} \eta_1(A_1) &= Y_1^{(1)}, \quad \eta_1(t) = \psi_1^{(2)}(\Phi_1(t)) \quad \text{pro } t \in \langle T_1^{(1)}, T_2^{(1)} \rangle, \\ \eta_1(t) &= \psi_2^{(2)}(\Phi_1(t)) \quad \text{pro } t \in \langle T_3^{(1)}, T_4^{(1)} \rangle, \quad \text{kde } T_1^{(1)}, \dots, T_4^{(1)} \in \langle A_1, A_2 \rangle, \\ \eta_1(t) &= \psi_1^{(1)}(\Phi_1(t)) \quad \text{pro } t \in \langle A_2, -A_1 \rangle. \end{aligned}$$


Na zbytku intervalu $\langle A_1, A_2 \rangle$ doplníme funkci η_1 tak, aby měla spojitou první

derivaci a aby pro $t \in \langle T_*, T^* \rangle$ platilo $|\eta_1'(t)| \leq 2 \cdot \frac{\eta_1(T^*) - \eta_1(T_*)}{T^* - T_*}$. Jestliže nyní máme již definovanou funkci η_{n-1} , pak položíme $\eta_n(t) = \eta_{n-1}(t)$ pro $t \in \langle A_1, A_{n-1} + \left(\frac{d}{3}\right)^{n-1} \rangle$, $\eta_n(t) = Y_1^{(n)}$ pro $t \in \langle A_{n-1} + \left(\frac{d}{3}\right)^{n-1}, A_n \rangle$. Na intervalu $\langle A_n, A_{n+1} \rangle$ definujeme funkci η_n takto:

$$\eta_n(t) = \psi_{2s-1}^{(r+1)}(\Phi_n(t)) \quad \text{pro } t \in \langle T_{4s-3}^{(r)}, T_{4s-2}^{(r)} \rangle,$$

$$\eta_n(t) = \psi_{2s}^{(r+1)}(\Phi_n(t)) \quad \text{pro } t \in \langle T_{4s-1}^{(r)}, T_{4s}^{(r)} \rangle,$$

kde $r = 1, 2, \dots, n$; $s = 1, 2, \dots, 3^{r-1}$. Na intervalu $\langle A_{n+1}, -A_1 \rangle$ definujeme $\eta_n(t) = \psi_1^{(1)}(\Phi_n(t))$ a na zbytku intervalu $\langle A_n, A_{n+1} \rangle$ doplníme funkci η_n tak, aby



Obr. 2.

měla spojitou první derivaci a aby pro $t \in \langle T^*, T_* \rangle$ platilo $|\eta'_n(t)| \leq \leq 2 \frac{\eta_n(T^*) - \eta_n(T_*)}{T^* - T_*}$. Zřejmě pro všechna n platí

$$\eta_n(A_1) = Y_1^{(1)}, \quad \eta_n(t) = \psi_1^{(1)}(1) \quad \text{pro } t \in \langle 0, -A_1 \rangle.$$

Věta 4.2. *Buď $T_1^{(n)} \in \langle A_n, A_{n+1} \rangle$, potom platí $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\eta_n(A_n) - \eta_n(T_1^{(n)})}{A_n - T_1^{(n)}} = 0$. Buď $\langle T_*, T^* \rangle \subset \langle A_n, A_{n+1} \rangle$ interval, kde φ_n je identicky rovno nule. Potom platí*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\eta_n(T^*) - \eta_n(T_*)}{T^* - T_*} = 0.$$

Důkaz. Protože platí $\eta_n(A_n) = Y_1^{(n)}$ a $\eta_n(T_1^{(n)}) = \psi_1^{(n+1)}(\Phi_n(T_1^{(n)})) = Y_1^{(n+1)}$, je

$$\frac{\eta_n(A_n) - \eta_n(T_1^{(n)})}{A_n - T_1^{(n)}} = \frac{2a_{n+1} + 2b_{n+1}}{\left(\frac{d}{3}\right)^n} = (2a_1 + 2b_1)^{n+1},$$

což konverguje k nule pro $n \rightarrow \infty$. Dále z konstrukce plyne, že $\eta_n(T^*) - \eta_n(T_*) = b_{n+1}$. Tedy

$$\frac{\eta_n(T^*) - \eta_n(T_*)}{T^* - T_*} = \frac{b_{n+1}}{\frac{1}{2} \left(\frac{d}{3}\right)^n} = 2b_1(2a_1 + 2b_1)^n$$

a

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\eta_n(T^*) - \eta_n(T_*)}{T^* - T_*} = 0.$$

Z definice funkce η_n přímo plyne

Věta 4.3. *Buď T dělicí bod intervalu $\langle A_n, A_{n+1} \rangle$ ($n = 1, 2, \dots$). Potom platí*

$$\left[\frac{d\eta_n}{dt} \right]_{t=T} = \left[\frac{d\eta_n}{dt} \right]_{t=A_{n+1}} = 0.$$

Funkci $f(y, t)$ budeme definovat na množině $y \in (-\infty, \infty)$, $t \in \langle A_1, -A_1 \rangle$. Položme $f(y, t) = \frac{d\eta_1}{dt}$ pro $t \in \langle A_1, A_1 + \frac{d}{3} \rangle$.

Předpokládejme, že máme funkci f definovanou pro všechna y a pro $t \in \langle A_1, A_n + \left(\frac{d}{3}\right)^n \rangle$. Na intervalu $J_n = \langle A_n + \left(\frac{d}{3}\right)^n, A_{n+1} + \left(\frac{d}{3}\right)^{n+1} \rangle$ budeme definovat funkci f takto:

Buď $\langle T_*, T^* \rangle \subset J_n$ takový interval, kde $\varphi_n(t) \neq 0$. Potom pro $t \in \langle T_*, T^* \rangle$ definujeme $f(y, t) = 0$.

Bud' $J_n \supset (T_*, T^*) \neq \left\langle A_{n+1}, A_{n+1} + \left(\frac{d}{3}\right)^{n+1} \right\rangle$ takový interval, kde φ_n je identicky rovno nule. Potom pro $t \in (T_*, T^*)$ definujeme

$$\begin{aligned} f(y, t) &= 0 && \text{pro } y \leq Y_1^{(n+1)} \text{ nebo } y \geq Y_1^{(1)}, \\ f(y, t) &= \frac{d\eta_n}{dt} \cdot \frac{y - Y_1^{(n+1)}}{\eta_n(t) - Y_1^{(n+1)}} && \text{pro } y \in \langle Y_1^{(n+1)}, \eta_n(t) \rangle, \\ f(y, t) &= \frac{d\eta_n}{dt} \cdot \frac{y - Y_1^{(1)}}{\eta_n(t) - Y_1^{(1)}} && \text{pro } y \in \langle \eta_n(t), Y_1^{(1)} \rangle. \end{aligned}$$

Bud' $t \in \left\langle A_{n+1}, A_{n+1} + \left(\frac{d}{3}\right)^{n+1} \right\rangle$. Potom definujeme

$$\begin{aligned} f(y, t) &= 0 && \text{pro } y \leq 0 \text{ nebo } y \geq Y_1^{(1)}, \\ f(y, t) &= \frac{d\eta_{n+1}}{dt} \cdot \frac{y - Y_1^{(1)}}{\eta_{n+1}(t) - Y_1^{(1)}} && \text{pro } y \in \langle \eta_{n+1}(t), Y_1^{(1)} \rangle, \\ f(y, t) &= \frac{d\eta_{n+1}}{dt} \cdot y && \text{pro } y \in \langle 0, \eta_{n+1}(t) \rangle. \end{aligned}$$

Bud' T dělicí bod intervalu $\langle A_n, A_{n+1} \rangle$. Potom položíme $f(y, T) = f(y, A_{n+1}) = f\left(y, A_{n+1} + \left(\frac{d}{3}\right)^{n+1}\right) = 0$. Na intervalu $\langle 0, -A_1 \rangle$ definujeme $f(y, t) = 0$.

Z konstrukce funkce f a z vět 4,2 a 4,3 vyplývá

Věta 4,4. *Funkce $f(y, t)$ je pro $y \in (-\infty, \infty)$, $t \in \langle A_1, -A_1 \rangle$ spojitá.*

Nyní vyslovíme čtyři věty, jejichž důkazy triviálně plynou z předcházejícího.

Věta 4,5. *Bud' $u(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \eta_n(t)$ pro $t \in \langle A_1, 0 \rangle$, $u(0) = 0$. Potom funkce $[0, u(t)]$ je jediné řešení soustavy diferenciálních rovnic*

$$\frac{dx}{dt} = 0, \quad \frac{dy}{dt} = f(y, t)$$

pro $t \in \langle A_1, 0 \rangle$ s počáteční podmínkou $x(A_1) = 0$, $y(A_1) = Y_1^{(1)}$.

Věta 4,6. *Funkce $[t + \frac{1}{2}, 0]$ je jediné řešení soustavy diferenciálních rovnic*

$$\frac{dx}{dt} = 1, \quad \frac{dy}{dt} = g(x, y)$$

s počáteční podmínkou $x(-\frac{1}{2}) = 0$, $y(-\frac{1}{2}) = 0$.

Věta 4,7. *Funkce $[1, 0]$ je jediné řešení soustavy diferenciálních rovnic*

$$\frac{dx}{dt} = 0, \quad \frac{dy}{dt} = f(y, t)$$

pro $t \in \langle 0, -A_1 \rangle$ s počáteční podmínkou $x(0) = 1$, $y(0) = 0$.

Věta 4,8. Funkce $[\Phi_n(t), \eta_n(t)]$ je řešení soustavy diferenciálních rovnic

$$\frac{dx}{dt} = \varphi_n(t), \quad \frac{dy}{dt} = f(y, t) + \varphi_n(t) \cdot g(x, y)$$

pro $t \in \langle A_1, -A_1 \rangle$ s počáteční podmínkou $x(A_1) = 0, y(A_1) = Y_1^{(1)}$.

Z těchto vět 4,5 až 4,8 vyplývá, že není možné, aby byla splněna podmínka (0,7) tohoto článku.

Literatura

- [1] J. Kurzweil: Generalized Ordinary Differential Equations and Continuous Dependence on a Parameter. Czech. Math. Journal 7 (82), 1957, 418—449.
 [2] J. Kurzweil: Generalized Ordinary Differential Equations. Czech. Math. Journal 8 (83), 1958, 360—388.

Резюме

О НЕОДНОЗНАЧНОСТИ РЕШЕНИЙ СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

ВЛАДИМИР ДОЛЕЖАЛ (Vladimír Doležal), Прага

Вопросы, рассмотренные в настоящей статье, появились при изучении обобщенных дифференциальных уравнений, понятие которых было введено Я. Курцвейлем в [1], особенно при изучении функции Дирака в нелинейных дифференциальных уравнениях в [2], § 5.

Я. Курцвейль в лемме 5,1 доказывает следующее предложение: Пусть $\chi(\eta)$, $\eta \geq 0$ — возрастающая непрерывная функция, $\chi(0) = 0$, $\int_0^1 \frac{d\eta}{\chi(\eta)} = \infty$.

Пусть $\sigma(t)$, $t \in \langle 0, S \rangle$, — непрерывная вещественная функция с ограниченным изменением. Пусть $g(x) = [g_1(x_1, \dots, x_m), \dots, g_m(x_1, \dots, x_m)]$ — непрерывная векторная функция на открытом множестве $D \subset E_m$ такая, что

$$(0,1) \quad \|g(x_*) - g(x^*)\| \leq \chi(\|x_* - x^*\|) \quad \text{для } x_*, x^* \in D.$$

Пусть $x_0 \in D$, $t_0 \in \langle 0, S \rangle$. Тогда уравнение

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t g(x(\tau)) d\sigma(\tau)$$

имеет самое больше одно решение.

В этой статье на примере показано, что условие (0,1), которое должна выполнять функция $g(x)$, нельзя заменить более слабым условием: Пусть $g(x)$ — непрерывная, векторная функция на множестве $D \subset E_n$ такая, что

уравнение $x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t g(x(\tau)) d\tau$ имеет для $x_0 \in D$, $t_0 \in \langle 0, S \rangle$ одно и только одно решение.

В главе II мы построим на множестве $\langle 0, \pi \rangle \times \langle 0, 1 \rangle$ функцию $g(x, y)$ такую, что для $t_0 \in \langle 0, 8\pi \rangle$, $x_0 \in \langle 0, \pi \rangle$, $y_0 \in \langle 0, 1 \rangle$ система

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t d\tau, \quad y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t g(x(\tau), y(\tau)) d\tau$$

имеет одно и только одно решение. В главе III мы построим непрерывно вещественную функцию $\sigma(t)$, $t \in \langle 0, 8\pi \rangle$ с ограниченным изменением такую, что системе

$$x(t) = \int_0^t d\sigma(\tau), \quad y(t) = \int_0^t g(x(\tau), y(\tau)) d\sigma(\tau)$$

удовлетворяют два решения.

В дальнейшем Я. Курцвейль в теореме 5,1 доказывает следующее предложение: Пусть $f(x, t) = [f_1(x_1, \dots, x_m, t), \dots, f_m(x_1, \dots, x_m, t)]$ — непрерывная векторная функция для $x \in D$, $t \in \langle -T_1, T_1 \rangle$. Пусть $g(x)$ — функция, которая выполняет условия леммы 5,1. Пусть $\varphi_n(t)$, $n = 1, 2, 3, \dots$ — непрерывная вещественная функция для $t \in \langle -T_1, T_1 \rangle$, $\Phi_n(t) = \int_{-T_1}^t \varphi_n(\tau) d\tau$.

Пусть последовательность функций φ_n выполняет следующие условия:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sup \int_{-T_1}^{T_1} |\varphi_n(\tau)| d\tau &= L < \infty, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-T_1}^t |\varphi_n(\tau)| d\tau &= 0 \quad \text{для} \quad -T_1 \leq t < 0, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \int_t^{T_1} |\varphi_n(\tau)| d\tau &= 0 \quad \text{для} \quad 0 < t \leq T_1, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \Phi_n(t) &= 0 \quad \text{для} \quad -T_1 \leq t < 0, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \Phi_n(t) &= 1 \quad \text{для} \quad 0 < t \leq T_1. \end{aligned}$$

Пусть решение $u(t)$, $t \in \langle -T_0, 0 \rangle$, $\langle 0 < T_0 < T_1 \rangle$, уравнения

$$(*) \quad \frac{dx}{dt} = f(x, t)$$

однозначно определяется начальным условием $u(-T_0) = y_0$. Пусть решение $v(t)$, $t \in \langle -\frac{L}{2}, \frac{L}{2} \rangle$, уравнения $\frac{dx}{dt} = g(x)$ однозначно определяется начальным условием $v(-\frac{1}{2}) = u(0)$ и пусть, наконец, решение $w(t)$, $t \in \langle 0, T_0 \rangle$, уравнения (*) однозначно определяется начальным условием $w(0) = v(\frac{1}{2})$. Пусть $y_n \rightarrow y_0$ для $n \rightarrow \infty$.

Тогда для достаточно больших n существует решение $x_n(t)$ уравнения

$$\frac{dx}{dt} = f(x, t) + g(x) \cdot \varphi_n(t), \quad x_n(-T_0) = y_n,$$

и

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t) = u(t) \quad \text{для} \quad -T_0 \leq t < 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t) = w(t) \quad \text{для} \quad 0 < t \leq T_0.$$

В статье мы покажем на примере, что при более слабом условии о функции $g(x)$ это утверждение неправильно.

Summary

ON NON-UNICITY OF SOLUTIONS OF A SYSTEM OF DIFFERENTIAL EQUATIONS

VĽADIMÍR DOLEŽAL, Praha

The problems considered in this paper have their origin in the theory of generalized ordinary differential equations introduced by J. KURZWEIL in [1], especially in the part concerning the theory of Dirac functions, Chapter 2 of paper [2].

J. Kurzweil has proved, l. c. Lemma 5,1, the following proposition: Let

$$\chi(\eta), \eta \geq 0 \text{ be an increasing and continuous function, } \chi(0) = 0, \int_{t_0}^t \frac{d\eta}{\chi(\eta)} = \infty.$$

Let $\sigma(t), t \in \langle 0, S \rangle$ be a real continuous function with bounded variation. Let $g(x) = [g_1(x_1, \dots, x_m), \dots, g_m(x_1, \dots, x_m)]$ be a vector function, continuous on the open set $D \subset E_m$ and such that

$$(0,1) \quad \|g(x_*) - g(x^*)\| \leq \chi(\|x_* - x^*\|) \quad \text{for } x_*, x^* \in D.$$

Let $x_0 \in D, t_0 \in \langle 0, S \rangle$. Then the equation $x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t g(x(\tau)) d\sigma(\tau)$ has at most one solution.

In this paper an example is contained showing that the condition (0,1) on the function $g(x)$ cannot be replaced by the weaker condition: Let $g(x)$ be a vector function continuous on the set $D \subset E_m$ such that the equation

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t g(x(\tau)) d\tau$$

has a unique solution for $x_0 \in D, t_0 \in \langle 0, S \rangle$. In Chapter II we construct a function $g(x, y)$ on the set $\langle 0, \pi \rangle \times \langle 0, 1 \rangle$, such that the system

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t d\tau, \quad y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t g(x(\tau), y(\tau)) d\tau$$

has a unique solution for $t_0 \in \langle 0, 8\pi \rangle$, $x_0 \in \langle 0, \pi \rangle$, $y_0 \in \langle 0, 1 \rangle$. In Chapter III we construct a continuous real function $\sigma(t)$, $t \in \langle 0, 8\pi \rangle$ with bounded variation such that the system

$$x(t) = \int_0^t d\sigma(\tau), \quad y(t) = \int_0^t g(x(\tau), y(\tau)) d\sigma(\tau).$$

has two distinct solutions.

Further, in theorem 5.1, J. Kurzweil proves the following proposition: Let $f(x, t) = [f_1(x_1, \dots, x_m, t), \dots, f_m(x_1, \dots, x_m, t)]$ be a continuous vector function for $x \in D$, $t \in \langle -T_1, T_1 \rangle$. Let $g(x)$ be a function satisfying the conditions of Lemma 5.1.

Let the sequence of real continuous functions $\varphi_n(t)$, $n = 1, 2, 3, \dots$, $t \in \langle -T_1, T_1 \rangle$, fulfil the following conditions:

$$\begin{aligned} \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_{-T_1}^{T_1} |\varphi_n(\tau)| d\tau &= L < \infty, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-T_1}^t |\varphi_n(\tau)| d\tau &= 0 \quad \text{for } -T_1 \leq t < 0, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \int_t^{T_1} |\varphi_n(\tau)| d\tau &= 0 \quad \text{for } 0 < t \leq T_1, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \Phi_n(t) &= 0 \quad \text{for } -T_1 \leq t < 0, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \Phi_n(t) &= 1 \quad \text{for } 0 < t \leq T_1, \end{aligned}$$

where $\Phi_n(t) = \int_{T_1}^t \varphi_n(\tau) d\tau$.

Let $u(t)$, $t \in \langle -T_0, 0 \rangle$, ($0 < T_0 < T_1$) be a unique solution of

$$(*) \quad \frac{dx}{dt} = f(x, t); \quad u(-T_0) = y_0;$$

let the solution $v(t)$ of $\frac{dx}{dt} = g(x)$, $v(-\frac{1}{2}) = u(0)$ be defined for $t \in \langle -\frac{L}{2}, \frac{L}{2} \rangle$,

and let the solution $w(t)$, $t \in \langle 0, T_0 \rangle$ of (*) be unique. Let $y_n \rightarrow u(-T_0)$ with $n \rightarrow \infty$.

Then there exists a solution $x_n(t)$, $t \in \langle -T_0, T_0 \rangle$ of

$$\frac{dx}{dt} = f(x, t) + g(x) \cdot \varphi_n(t)$$

$x_n(-T_0) = y_n$, (not necessarily unique) for n sufficiently large and such that

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t) = u(t) \quad \text{for } -T_0 \leq t < 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t) = w(t) \quad \text{for } 0 < t \leq T_0.$$

In this article we show an example proving that this proposition is wrong under some weaker conditions on the function $g(x)$.