

Miloslav Jůza

Jednparametrické systémy projektivních prostorů dimenze n v prostoru dimenze $3n + 1$

Časopis pro pěstování matematiky, Vol. 98 (1973), No. 3, 225--232

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/117793>

Terms of use:

© Institute of Mathematics AS CR, 1973

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

JEDNOPARAMETRICKÉ SYSTÉMY PROJEKTIVNÍCH PROSTORŮ DIMENSE n V PROSTORU DIMENSE $3n + 1$

MILOSLAV JŮZA, Praha

(Došlo dne 5. srpna 1971)

Základní věty o jednoparametrických systémech projektivních prostorů S_n v projektivním prostoru S_m byly odvozeny v práci [7]. Již dříve byly tyto systémy podrobněji studovány pro některé dimense. Kromě přímkových ploch ($n = 1$) byl studován případ $m = kn + k - 1$, zvláště $m = 2n + 1$. (Viz práce [1], [2], [4], [5], [6]) a případ $n = 2$, $m = 6$ (viz [3]). V tomto článku je studován případ $m = 3n + 1$.

1. Mějme v prostoru S_{3n+1} jednoparametrický systém (monosystém) projektivních prostorů

$$S_n(t) = [y_0(t), y_1(t), \dots, y_n(t)].$$

Předpokládejme, že platí

$$(1) \quad [y_0, y_1, \dots, y_n, y'_0, y'_1, \dots, y'_n, y''_0, y''_1, \dots, y''_{n-1}] \neq 0.$$

Z (1) plyne, že monosystém neleží v prostoru dimense nižší než $3n + 1$.

Vzhledem k tomu, že $m = 3n + 1$ a platí (1), můžeme psát

$$y''_n = \sum_{j=0}^{n-1} a^j y''_j + \sum_{j=0}^n b^j y'_j + \sum_{j=0}^n c^j y_j,$$

kde a^j, b^j, c^j jsou funkce t . Provedeme-li změnu řídících křivek

$$\bar{y}_i = y_i, \quad i = 0, 1, \dots, n-1,$$

$$\bar{y}_n = y_n - \sum_{j=0}^{n-1} a^j y_j,$$

můžeme dosáhnout toho, že $a^j = 0$, $j = 0, 1, \dots, n-1$. Budeme tedy nadále předpokládat, že platí (1) a

$$(2) \quad y''_n = \sum_{j=0}^n b^j y'_j + \sum_{j=0}^n c^j y_j.$$

2. Označme $T_1(t_0) = [y_0(t_0), \dots, y_n(t_0), y_0'(t_0), \dots, y_n'(t_0)]$ tečný prostor monosystému podél tvořícího prostoru $[y_0(t_0), \dots, y_n(t_0)]$. Máme-li na monosystému křivku

$$(3) \quad x(t) = \sum_{i=0}^n \alpha^i(t) y_i(t),$$

je ovšem $x'(t_0) \in T_1(t_0)$. Je-li dokonce $x''(t_0), x'''(t_0), \dots, x^{(1+k)}(t_0) \in T_1(t_0)$, nazveme bod $x(t_0)$ *poloasymptotickým bodem řádu k* křivky $x(t)$ (viz [7]).

Derivováním (3) a úpravou podle (2) dostaneme

$$(4) \quad x'' = \sum_{i=0}^{n-1} \alpha^i y_i'' + \sum_{i=0}^n (2\alpha^{i'} + \alpha^n b^i) y_i' + \sum_{i=0}^n (\cdot) y_i.$$

Vzhledem k (1) je tehdy bod $x(t_0)$ *poloasymptotickým bodem řádu 1* křivky $x(t)$ právě tehdy, je-li $\alpha^0(t_0) = \alpha^1(t_0) = \dots = \alpha^{n-1}(t_0) = 0$, tj. leží-li $x(t_0)$ na křivce $y_n(t)$. Křivka $y_n(t)$ je jedinou *poloasymptotickou křivkou řádu 1* na monosystému.

3. Zjistíme, kdy na křivce $y_n(t)$ leží *poloasymptotické body řádu 2*. Derivováním a opětným použitím (2) dostaneme

$$y_n''' = \sum_{j=0}^{n-1} b^j y_j'' + \sum_{j=0}^n ((\cdot) y_j' + (\cdot) y_j).$$

Aby tedy bod $y_n(t_0)$ byl *poloasymptotický řádu 2*, je nutné a stačí, aby $b^0(t_0) = b^1(t_0) = \dots = b^{n-1}(t_0) = 0$.

4. Označme $T_1(\alpha^i(t_0), t_0) = [y_0(t_0), \dots, y_n(t_0), \sum_{i=0}^n \alpha^i(t_0) y_i'(t_0)]$ tečný prostor monosystému v bodě $\sum_{i=0}^n \alpha^i(t_0) y_i(t_0)$. Bod $x(t_0)$ nazveme *asymptotickým bodem* křivky (3), jestliže $x''(t_0) \in T_1(\alpha^i(t_0), t_0)$.

Aby bod $x(t_0)$ byl *asymptotickým bodem* křivky $x(t)$, je podle (4) nutné a stačí, aby

$$(A) \quad \alpha^0(t_0) = \alpha^1(t_0) = \dots = \alpha^{n-1}(t_0) = 0;$$

(B) matice

$$\begin{pmatrix} \alpha^0 & \alpha^1 & \dots & \alpha^{n-1} & \alpha^n \\ 2(\alpha^0)' + \alpha^n b^0 & 2(\alpha^1)' + \alpha^n b^1 & \dots & 2(\alpha^{n-1})' + \alpha^n b^{n-1} & 2(\alpha^n)' + \alpha^n b^n \end{pmatrix}$$

měla pro $t = t_0$ hodnotu 1. Odtud plyne (viz [7]), že bod $x(t_0)$ je *asymptotickým bodem* křivky (3), když a jen když $x(t_0)$ leží na *poloasymptotické křivce* $y_n(t)$ a tečnou křivky $x(t)$ v tomto bodě je přímka

$$(5) \quad [x(t_0), \alpha^n(t_0) y_n'(t_0) - \frac{1}{2} \sum_{i=0}^n \alpha^n(t_0) b^i(t_0) y_i(t_0)].$$

Aby křivka $x(t)$ byla asymptotická, musí být poloasymptotická, tj. splynout s poloasymptotickou křivkou $y_n(t)$. Ale aby křivka $y_n(t)$ byla asymptotická, musí přímka (5) býti její tečnou, což znamená, že bod $\alpha^n y'_n - \frac{1}{2} \sum_{i=0}^n \alpha^i b^i y_i$ musí pro každé t ležet na přímce $[y_n, y'_n]$. Vzhledem k lineární nezávislosti bodů y_0, \dots, y_n, y'_n to nastává právě tehdy, když $b^1 = b^2 = \dots = b^{n-1} = 0$. Křivka (3) je tedy asymptotická právě tehdy, je-li poloasymptotická řádu 2.

5. Nechť pro monosystém $S_n(t) = [y_0(t), y_1(t), \dots, y_n(t)]$ v S_{3n+1} opět platí (1) a řídicí křivka $y_n(t)$ nechť je zvolena tak, že platí též (2). Vzhledem k (1) existují funkce m_i^j, n_i^j, p_i^j tak, že platí

$$(6) \quad y_i''' = \sum_{j=0}^{n-1} m_i^j y_j'' + \sum_{j=0}^n n_i^j y_j' + \sum_{j=0}^n p_i^j y_j, \quad i = 0, 1, \dots, n-1.$$

Provedeme změnu řídicích křivek

$$(7) \quad \bar{y}_i = \sum_{j=0}^{n-1} \mu_i^j y_j, \quad i = 0, 1, \dots, n-1, \quad \det(\mu_i^j) \neq 0, \\ \bar{y}_n = y_n.$$

Určíme-li funkce v_j^k ($j, k = 0, 1, \dots, n-1$) tak, aby $\sum_{j=0}^{n-1} \mu_i^j v_j^k = \delta_i^k$, bude

$$y_j = \sum_{k=0}^{n-1} v_j^k \bar{y}_k, \quad j = 0, 1, \dots, n-1, \quad \det(v_j^k) \neq 0, \\ y_n = \bar{y}_n.$$

Derivováním (7) a použitím (6) a (2) dostaneme pro $i = 0, 1, \dots, n-1$:

$$\begin{aligned} \bar{y}_i''' &= \sum_{j=0}^{n-1} \mu_i^j y_j''' + \sum_{j=0}^{n-1} 3(\mu_i^j)' y_j'' + \sum_{j=0}^{n-1} ((\cdot) y_j' + (\cdot) y_j) = \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} (3(\mu_i^k)' + \sum_{j=0}^{n-1} \mu_i^j m_j^k) y_k'' + \sum_{k=0}^n ((\cdot) y_k' + (\cdot) y_k) = \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{k=0}^{n-1} (3(\mu_i^k)' + \sum_{j=0}^{n-1} \mu_i^j m_j^k) v_k^i \bar{y}_i'' + \sum_{i=0}^n ((\cdot) \bar{y}_i' + (\cdot) \bar{y}_i). \end{aligned}$$

Zvolíme-li za funkce μ_i^k řešení systému diferenciálních rovnic

$$3(\mu_i^k)' + \sum_{j=0}^{n-1} \mu_i^j m_j^k = 0, \quad \mu_i^k(t_0) = \delta_i^k; \quad i, k = 0, 1, \dots, n-1;$$

budou mezi křivkami $\bar{y}_0, \dots, \bar{y}_n$ platit vztahy obdobné (6), ale bude $m_i^j = 0$, $i, j = 0, 1, \dots, n-1$. Přitom (2) zůstane zachováno. Tedy za předpokladu, že platí (1),

můžeme zvolit řídicí křivky tak, že bude platit

$$(8) \quad y_i''' = \sum_{j=0}^n n^j y_j' + \sum_{j=0}^n p^j y_j, \quad i = 0, 1, \dots, n-1,$$

$$y_n'' = \sum_{j=0}^n b^j y_j' + \sum_{j=0}^n c^j y_j.$$

6. Mějme opět na monosystému křivku (3). Označme

$$T_2(\alpha^i(t_0), t_0) = [y_0(t_0), \dots, y_n(t_0), y_0'(t_0), \dots, y_n'(t_0), \sum_{i=0}^{n-1} \alpha^i(t_0) y_i''(t_0)]$$

2-oskulační prostor monosystému v bodě $\sum_{i=0}^n \alpha^i(t_0) y_i(t_0)$. Body $x(t_0), x'(t_0), x''(t_0)$ leží v $T_2(\alpha^i(t_0), t_0)$. Je-li též $x'''(t_0) \in T_2(\alpha^i(t_0), t_0)$, nazveme bod $x(t_0)$ *kvasiasymptotickým bodem indexu 2* křivky (3) (viz [7]).

Derivováním (3) a použitím (8) dostaneme

$$x' = \sum_{i=0}^n \alpha^i y_i' + \sum_{i=0}^n (\alpha^i)' y_i,$$

$$x'' = \sum_{i=0}^{n-1} \alpha^i y_i'' + \sum_{i=0}^n (2(\alpha^i)' + \alpha^n b^i) y_i' + \sum_{i=0}^n (\cdot) y_i,$$

$$x''' = \sum_{i=0}^{n-1} (3(\alpha^i)' + \alpha^n b^i) y_i'' + \sum_{i=0}^n ((\cdot) y_i' + (\cdot) y_i).$$

Aby $x'''(t_0) \in T_2(\alpha^i(t_0), t_0)$, je nutné a stačí, aby matice

$$\begin{pmatrix} 3(\alpha^0)' + \alpha^n b^0, & \dots, & 3(\alpha^{n-1})' + \alpha^n b^{n-1} \\ \alpha^0 & , & \dots, & \alpha^{n-1} \end{pmatrix}$$

měla pro $t = t_0$ hodnotu 1, tj. aby pro $t = t_0$ byla splněna soustava rovnic

$$(3(\alpha^i)' + \alpha^n b^i) \alpha^j - (3(\alpha^j)' + \alpha^n b^j) \alpha^i = 0, \quad i, j = 0, \dots, n-1,$$

tj. soustava

$$(9) \quad (\alpha^i)' \alpha^j - (\alpha^j)' \alpha^i = \frac{1}{3} \alpha^n (\alpha^i b^j - \alpha^j b^i), \quad i, j = 0, \dots, n-1.$$

Aby tedy bod $x(t_0)$ byl *kvasiasymptotickým bodem indexu 2* křivky (3), je nutné a stačí, aby pro $t = t_0$ byla splněna soustava rovnic (9). Křivka (3) je *kasiasymptotická indexu 2* tehdy a jen tehdy, splňuje-li soustavu diferenciálních rovnic (9).

Splňují-li funkce $\alpha^0, \alpha^1, \dots, \alpha^n$ soustavu (9) a je-li ϱ libovolná diferencovatelná funkce, splňují zřejmě i funkce $\varrho \alpha^0, \varrho \alpha^1, \dots, \varrho \alpha^n$ soustavu (9).

7. Zjistíme nyní, jak vypadají kvasisymptotické křivky indexu 2 procházející daným bodem $x(t_0) = \sum_{i=0}^n \alpha^i(t_0) y_i(t_0)$. Budeme přitom předpokládat, že $x(t_0)$ neleží na poloasymptotické křivce, takže není současně $\alpha^0(t_0) = \alpha^1(t_0) = \dots = \alpha^{n-1}(t_0) = 0$. Existuje tedy q , $0 \leq q \leq n-1$, tak, že $\alpha^q(t_0) \neq 0$. Vhodnou volbou skalárního faktoru můžeme dosáhnout toho, že ve vyjádření křivky (3) je $\alpha^q \equiv 1$ v okolí t_0 . Napíšeme soustavu diferenciálních rovnic

$$(10) \quad (\alpha^i)' = \frac{1}{3} \alpha^n (\alpha^i b^q - b^i), \quad i = 0, 1, \dots, q-1, q+1, \dots, n-1.$$

Jestliže funkce $\alpha^0, \dots, \alpha^n$ splňují (9) a $\alpha^q \equiv 1$, pak funkce $\alpha^0, \dots, \alpha^{q-1}, \alpha^{q+1}, \dots, \alpha^n$ splňují (10). Ale také naopak, jestliže funkce $\alpha^0, \dots, \alpha^{q-1}, \alpha^{q+1}, \dots, \alpha^n$ splňují (10), pak funkce $\alpha^0, \dots, \alpha^{q-1}, 1, \alpha^{q+1}, \dots, \alpha^n$ splňují (9). To je zřejmé u těch rovnic (9), u nichž $i = q$ nebo $j = q$. Budiž tedy $i \neq q \neq j$ a necht' je splněno (10). Potom

$$\begin{aligned} (\alpha^i)' \alpha^j - (\alpha^j)' \alpha^i &= \frac{1}{3} \alpha^n (\alpha^i b^q - b^i) \alpha^j - \frac{1}{3} \alpha^n (\alpha^j b^q - b^j) \alpha^i = \\ &= \frac{1}{3} \alpha^n (b^j \alpha^i - b^i \alpha^j), \end{aligned}$$

tedy i rovnice (9), u nichž $i \neq q \neq j$, jsou splněny.

V soustavě (10) můžeme zvolit libovolně funkci α^n a soustava pak má při daných počátečních podmínkách právě jedno řešení $\alpha^0, \dots, \alpha^{q-1}, \alpha^{q+1}, \dots, \alpha^{n-1}$. To znamená, že v soustavě (9) můžeme libovolně zvolit funkci α^n a soustava má pak při daných počátečních podmínkách právě jedno řešení $\alpha^0, \dots, \alpha^{n-1}$ takové, že $\alpha^q \equiv 1$. Řešení soustavy (9) jsou pak právě všechny soustavy funkcí tvaru $\varrho \alpha^0, \varrho \alpha^1, \dots, \varrho \alpha^n$. Odtud plyne:

Každým bodem $x(t_0) = \sum_{i=0}^n \gamma^i y_i(t_0)$ monosystému, který neleží na poloasymptotické křivce, prochází nekonečně mnoho kvasisymptotických křivek indexu 2. Dostaneme je tak, že bod $x(t_0)$ normujeme tak, aby $\gamma^q = 1$ pro nějaké q , $0 \leq q \leq n-1$, pak v (3) zvolíme libovolně funkci α^n tak, že $\alpha^n(t_0) = \gamma^q$ a ostatní α^i v (3) zvolíme jako (jediné) řešení soustavy (9), při kterém $\alpha^q \equiv 1$.

8. Zjistíme, jak vypadají tečny kvasisymptotických křivek indexu 2 procházejících bodem $x(t_0)$.

Je-li (3) kvasisymptotická křivka indexu 2 procházející bodem $x(t_0)$, je její tečnou přímkou $[x(t_0), x'(t_0)]$, při čemž

$$x'(t_0) = \sum_{i=0}^n \alpha^i(t_0) y_i'(t_0) + \sum_{i=0}^n (\alpha^i)'(t_0) y_i(t_0).$$

Funkce α^i splňují soustavu (9). Vidíme, že hodnoty $\alpha^0(t_0), \dots, \alpha^{n-1}(t_0)$ nezávisí na tom, jak zvolíme $(\alpha^n)'(t_0)$. Číslo $(\alpha^n)'(t_0)$ můžeme zvolit zcela libovolně. Tečnami

kvasiasymptotických křivek indexu 2 jsou tedy přímky $[x(t_0), z(t_0) + uy_n(t_0)]$, kde

$$(11) \quad z = \sum_{i=0}^n \alpha^i y'_i + \sum_{i=0}^{n-1} (\alpha^i)' y_i$$

a u je libovolné číslo. Vidíme, že tečny kvasiasymptotických křivek indexu 2 jdoucích bodem $x(t_0)$ vyplní rovinu $[x(t_0), z(t_0), y_n(t_0)]$, kde bod z je dán vztahem (11).

Poznámka. Pro $n = 1$ je soustava (9) splněna, ať jsou funkce α^0, α^1 jakékoliv. Tedy na přímkové ploše v S_4 je každá křivka kvasiasymptotická indexu 2 (platí-li (1)). To je ostatně vidět i přímo, neboť prostor $T_2(\alpha^i(t_0), t_0)$ vyplní celý S_4 .

9. Mějme na monosystému kromě křivky (3) ještě křivku

$$\bar{x}(t) = \sum_{i=0}^n \bar{\alpha}^i(t) y_i(t)$$

a nechť tato křivka prochází bodem $x(t_0)$ a má v něm s křivkou $x(t)$ společnou tečnu. Potom, je-li $x(t_0)$ kvasiasymptotickým bodem indexu 2 na křivce $x(t)$, je $\bar{x}(t_0)$ kvasiasymptotickým bodem indexu 2 na křivce $\bar{x}(t)$.

Skutečně, protože $x(t), \bar{x}(t)$ mají společnou tečnu v bodě $x(t_0)$, existují čísla ϱ, σ, τ tak, že

$$\begin{aligned} \bar{x}(t_0) &= \varrho x(t_0), \quad \varrho \neq 0, \\ \bar{x}'(t_0) &= \tau x'(t_0) + \sigma x(t_0). \end{aligned}$$

Z první z těchto rovnic plyne

$$(12) \quad \bar{\alpha}^i(t_0) = \varrho \alpha^i(t_0)$$

a z druhé dostaneme v bodě $t = t_0$:

$$\begin{aligned} \bar{x}' &= \sum_{i=0}^n \bar{\alpha}^i y'_i + \sum_{i=0}^n (\bar{\alpha}^i)' y_i = \tau \left(\sum_{i=0}^n \alpha^i y'_i + \sum_{i=0}^n (\alpha^i)' y_i \right) + \sigma \sum_{i=0}^n \alpha^i y_i = \\ &= \sum_{i=0}^n \tau \alpha^i y'_i + \sum_{i=0}^n (\tau (\alpha^i)' + \sigma \alpha^i) y_i. \end{aligned}$$

Odtud na základě (1) plyne

$$\bar{\alpha}^i(t_0) = \tau \alpha^i(t_0), \quad (\bar{\alpha}^i)'(t_0) = \tau (\alpha^i)'(t_0) + \sigma \alpha^i(t_0),$$

takže srovnáním s (12) dostaneme $\varrho = \tau$ a

$$(13) \quad (\bar{\alpha}^i)'(t_0) = \varrho (\alpha^i)'(t_0) + \sigma \alpha^i(t_0).$$

Ale bod $x(t_0)$ je kvasisymptotickým bodem indexu 2 na křivce $x(t)$, tedy $\alpha^i(t_0)$, $(\alpha^i)'(t_0)$ splňují soustavu (9). Odtud na základě (12) a (13) dostaneme v bodě $t = t_0$ pro $i, j = 0, 1, \dots, n-1$:

$$\begin{aligned}(\bar{\alpha}^i)' \bar{\alpha}^j - (\bar{\alpha}^j)' \bar{\alpha}^i &= (\varrho(\alpha^i)' + \sigma\alpha^i) \varrho\alpha^j - (\varrho(\alpha^j)' + \sigma\alpha^j) \varrho\alpha^i = \\ &= \varrho^2((\alpha^i)' \alpha^j - (\alpha^j)' \alpha^i) = \varrho^2 \cdot \frac{1}{3} \alpha^n (\alpha^i b^j - \alpha^j b^i) = \\ &= \frac{1}{3} \bar{\alpha}^n (\bar{\alpha}^i b^j - \bar{\alpha}^j b^i).\end{aligned}$$

Tedy čísla $\bar{\alpha}^i(t_0)$ $(\bar{\alpha}^i)'(t_0)$ rovněž splňují soustavu (9) a bod $\bar{x}(t_0)$ je kvasisymptotickým bodem indexu 2 křivky $\bar{x}(t)$.

Odtud na základě odst. 8 dostaneme větu:

Bod $x(t_0)$ je kvasisymptotickým bodem indexu 2 křivky

$$x(t) = \sum_{i=0}^n \alpha^i(t) y_i(t),$$

právě když tečna této křivky v bodě $x(t_0)$ leží v rovině $[x(t_0), z(t_0), y_n(t_0)]$, kde bod $z(t_0)$ je dán vzorcem (11).

Literatura

- [1] E. Čech: Nová metoda projektivní geometrie zborčených ploch. Časopis pro přest. mat. a fys., 53, 1924, 31–37.
- [2] M. Jůza: Sur les variétés représentant une généralisation des surfaces réglées. Czech. Mat. Journal, 10 (85), 1960, 440–456.
- [3] M. Jůza: Jednparametrické systémy rovin v prostoru S_6 . Mat.-fyz. čas. SAV, 13, 1963, 125–136.
- [4] M. Jůza: Les monosystèmes d'espaces projectifs dont les lignes asymptotiques sont des droites. Czech. Mat. Journal 14 (89), 1964, 582–592.
- [5] M. Jůza: Styk monosystémů projektivních prostorů. Mat.-fyz. čas. SAV, 16, 1966, 218–228.
- [6] M. Jůza: Généralisation à plusieurs dimensions de la quadrique osculatrice. Mat. čas. SAV, 17, 1967, 64–75.
- [7] M. Jůza: Systèmes monoparamétriques des espaces projectifs. Czech. Mat. Journal, 19 (94), (1969), 363–367.

Adresa autora: 130 66 Praha 3, Olšanská 9 (Ústředí výpočetní techniky dopravy).

Résumé

SYSTÈMES MONOPARAMÉTRIQUES DES ESPACES PROJECTIFS DE LA DIMENSION n DANS UN ESPACE DE LA DIMENSION $3n + 1$

MILOSLAV JŮZA, Praha

Soit $S_n(t) = [y_0(t), y_1(t), \dots, y_n(t)]$ un système monoparamétrique (monosystème) des espaces projectifs dans un espace projectif S_{3n+1} . Supposons que les points $y_0(t), y_1(t), \dots, y_n(t), y'_0(t), y'_1(t), \dots, y'_n(t)$ sont linéairement indépendants pour chaque t et que la matrice

$$[y_0, y_1, \dots, y_n, y'_0, y'_1, \dots, y'_n, y''_0, y''_1, \dots, y''_n]$$

est de rang $3n + 2$.

Une courbe $x(t) = \sum_{i=0}^n \alpha^i(t) y_i(t)$ est appelée asymptotique si, pour chaque t , le point $x''(t)$ est placé dans l'espace tangent du monosystème au point $x(t)$. Elle est appelée semiasymptotique d'ordre k si, pour chaque t , les points $x''(t), x'''(t), \dots, x^{(1+k)}(t)$ sont placés dans l'espace

$$[y_0(t), y_1(t), \dots, y_n(t), y'_0(t), y'_1(t), \dots, y'_n(t)].$$

Sur le monosystème, il y a une et une seule courbe semiasymptotique d'ordre 1. Cette courbe est semiasymptotique d'ordre 2 si et seulement si elle est asymptotique.

Une courbe $x(t) = \sum_{i=0}^n \alpha^i(t) y_i(t)$ est appelée quasiasymptotique d'indice 2 si, pour chaque t , le point $x'''(t)$ est placé dans l'espace osculateur du monosystème au point $x(t)$, c'est-à-dire dans l'espace

$$[y_0(t), \dots, y_n(t), y'_0(t), \dots, y'_n(t), \sum_{i=0}^n \alpha^i(t) y''_i(t)].$$

Par chaque point du monosystème qui n'est pas placé sur la courbe semiasymptotique, il passe l'infinité des courbes quasiasymptotiques d'indice 2. Leurs droites tangentes à ce point forment un plan (de la dimension 2). Ainsi, un plan correspond à chaque point du monosystème qui n'est pas placé sur la courbe semiasymptotique. Une courbe sur le monosystème est quasiasymptotique d'indice 2 si et seulement si, à chaque point, sa droite tangente est placée dans ce plan.