

# Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

---

Ota Setzer

O kuželosečkách majících společné ohnisko

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 62 (1933), No. 3, R29--R34

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/121797>

## Terms of use:

© Union of Czech Mathematicians and Physicists, 1933

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

# ROZHLEDY MATEMATICKO-PŘÍRODOVĚDECKÉ.

ROČNÍK 12 (1932/33).

ČÍSLO 2.

## O kuželosečkách majících společné ohnisko.

Prof. Ota Setzer, Kralupy n. Vlt.

1. Z elementární teorie kuželoseček víme, že každou kuželosečku lze považovati za geometrické místo středů kružnic, jež procházejí pevným bodem  $F$  a dotýkají se pevné „řídící“ kružnice  $d$  opsané kolem středu  $G$  poloměrem  $r$ . Body  $F$ ,  $G$  jsou ohniska kuželosečky a poloměr  $r$  délkou hlavní osy.

Pro  $\left\{ \begin{array}{l} \text{elipsu} \\ \text{hyperbolu} \end{array} \right\}$  leží bod  $F$   $\left\{ \begin{array}{l} \text{uvnitř} \\ \text{vně} \end{array} \right\}$  kružnice  $d$ . Je-li bod  $G$  bodem úběžným, přechází řídící kružnice  $d$  v řídící přímku  $d'$  paraboly.

Dvě kuželosečky nazveme unikonfokálními, mají-li jedno ohnisko společné.

Mějme dvě unikonfokální kuželosečky  $k_1, k_2$  o ohniscích  $F, G_1$  resp.  $F, G_2$  a délce hlavní poloosy  $a_1$  resp.  $a_2$ . Hledejme jejich společné body.

Budiž bod  $P$  jeden takový průsečík. Ježto leží na  $k_1$ , jest středem kružnice  $l_1$ , jež prochází bodem  $F$  a dotýká se kružnice  $d_1$  opsané poloměrem  $r_1 = 2a_1$  kolem  $G_1$ ; protože však  $P$  leží i na  $k_2$ , jest středem kružnice  $l_2$ , jež jdouc bodem  $F$  dotýká se kružnice  $d_2$  opsané poloměrem  $r_2 = 2a_2$  kolem  $G_2$ ; kružnice  $l_1, l_2$  majíce společný střed  $P$  a jeden bod  $F$ , jsou totožné. Dostaneme tedy průsečíky  $P$ , kuželoseček  $k_1, k_2$  jako středy kružnic, jež se dotýkají řídících kružnic  $d_1, d_2$  a jdou společným ohniskem  $F$ . To však jest úloha Apolloniova, kterou lze řešit inverzí.

Budiž  $z$  základní kružnice opsaná kolem středu  $O$  poloměrem  $k$  a  $B$  libovolný bod. Pak k bodu  $B$  inverzním rozumíme\* bod  $B'$ , ležící na spojnici  $\overline{BO}$ , pro nějž platí

$$\overline{OB} \cdot \overline{OB'} = k^2.$$

V inverzi odpovídá kružnici nejduoucí středem  $O$  opět kružnice, kružnici procházející středem — přímka neprocházející středem. Úhly se při inverzi zachovávají (příbuznost isogonální).

Aplikujeme to na danou úlohu. Společné ohnisko  $F$  zvolme za střed inverse, poloměr základní kružnice z budíž libovolný. Inversními útvary k řídicím kružnicím  $d_1, d_2$  jsou kružnice  $d'_1, d'_2$ . Hledané kružnici  $l$  jdoucí středem inverse odpovídá přímka  $l'$ , jež se dotýká kružnic  $d'_1, d'_2$ . Sestrojíme proto společné tečny  $l'_i$  kružnic  $d'_1, d'_2$ , k nim inverzní kružnice  $l_i$  a jejich středy  $P_i$  jsou hledanými průsečíky našich dvou unikonfokálních kuželoseček.

Protože existují obecně 4 společné tečny kružnic  $d'_1, d'_2$ , jsou obecně i čtyři průsečíky dvou kuželoseček, jak víme odjinud.

Je-li jedna z kuželoseček hyperbola, zvolíme pro zjednodušení poloměr základní kružnice z roven délce tečny z  $F$  k příslušné řídicí kružnici hyperboly. Potom inverzí přejde tato kružnice v sebe samu.

Tažme se nyní po společných tečnách unikonfokálních kuželoseček.

Při řešení této úlohy uijeme fundamentální ohniskové vlastnosti kuželoseček: Body s jedním ohniskem středové kuželosečky souměrně položené podle všech jejich tečen, vyplňují kružnici opsanou kolem druhého ohniska poloměrem hlavní osy. U paraboly přechází tato kružnice v přímku řídicí.

U našich dvou unikonfokálních kuželoseček  $k_1 (F, G_1; a_1)$ ,  $k_2 (F, G_2; a_2)$  budíž bod  $F$  společným ohniskem a  $t$  společnou tečnou. Bod  $F'$  s ním souměrně položený podle  $t$  leží na řídicí kružnici  $d_1$  kuželosečky  $k_1$ , současně i na řídicí kružnici  $d_2$  druhé kuželosečky. Vyhledáme proto průsečíky  $F'_1, F'_2$  kružnic  $d_1, d_2$  a symetrály úseček  $\overline{FF'_1}, \overline{FF'_2}$  jsou hledané společné tečny  $t_1, t_2$  kuželoseček  $k_1, k_2$ .

Dvě kuželosečky mají obecně 4 společné tečny. Jsou-li unikonfokální, pak dvě ze společných tečen jsou vždy imaginární.

Jsou to samodružné paprsky pravoúhlé involuce, již ve společném ohnisku indukují obě unikonfokální kuželosečky. Reálnost ostatních dvou tečen závisí na vzájemné poloze ohnisek a délce hlavních os. V případě dvou nesouosých unikonfokálních parabol jest v konečnu vždy jen jedna reálná společná tečna.

O unikonfokálních kuželosečkách lze odvoditi řadu vět. Jako příklad uvádím:

„Buďtež  $e_1 (F_2, F_3; a_1)$ ,  $e_2 (F_1, F_3; a_2)$  dvě unikonfokální elipsy. Pak hyperbola  $h (\overline{F}_1, F_2; a_3)$  s oběma unikonfokální a jdoucí jedním jejich průsečíkem  $X$  prochází nutně i dalším průsečíkem  $Y$  obou elips. Bod  $Y$  jest druhé ohnisko jedné ze čtyř kuželoseček  $k$  určených ohniskem  $X$  a body  $F_1, F_2, F_3$ .“


Protože jeden průsečík elips  $e_1, e_2$  —  $X$  jest reálný, jest nutně reálný i druhý jejich průsečík  $Y$ . Vyjádřeme, že oba tyto body leží na elipsách:

$$\left. \begin{aligned} \overline{F_2X} + \overline{F_3X} &= \overline{F_2Y} + \overline{F_3Y} \\ \overline{F_1X} + \overline{F_3X} &= \overline{F_1Y} + \overline{F_3Y} \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

Odečtením těchto rovnic plyne

$$\overline{F_1X} - \overline{F_2X} = \overline{F_1Y} - \overline{F_2Y} \quad (2)$$

což značí, že hyperbola  $h$  s ohnisky  $F_1, F_2$  a procházející bodem  $X$



Obr. 1.

jde i bodem  $Y$ , který leží na téže její větvi. Pišeme-li rovnice (2), (1) ve tvaru

$$\overline{F_1X} - \overline{F_1Y} = \overline{F_2X} - \overline{F_2Y} = \overline{F_3Y} - \overline{F_3X} \quad (3)$$

vidíme, že  $X, Y$  jsou ohniska kuželosečky  $k$ , jež jde body  $F_1, F_2, F_3$ .

Tento speciální případ dvou elips lze poněkud zevšeobecnit, což přenechávám plii čtenáři.

2. Vytkněme si nyní za úkol vyhledati společné elementy dvou parabol o témže ohnisku.


a) Společné body:

Přímky  $d_1, d_2$  buďtež řídicími přímkami parabol  $P_1, P_2$  o společném ohnisku  $F$ . Hledané průsečíky  $X, Y$ , ležící na obou parabolách, musí býti od obou řídicích přímek i společného ohniska stejně

vzdáleny. Jsou to tedy středy kružnic  $k_1, k_2$ , jdoucích bodem  $F$  a dotýkajících se přímek  $d_1, d_2$ . Elementární jejich konstrukce (na základě homotetrie) plyne z obr. 1.

b) Věta o chordálách:

Předchozí úloha má dvě řešení:  $X, Y$ . Spojnici těchto průsečíků nazveme — analogicky jako u dvou kružnic — *chordálou*. Tato chordála púli zřejmě úhel řídících přímek  $d_1, d_2$ . Jsou-li nyní  $P_1, P_2, P_3$  paraboly o společném ohnisku  $F$  a řídících přímkách  $d_1, d_2, d_3$ .



Obr. 2.

jest osa úhlu  $\widehat{d_1 d_2}$  ( $\widehat{d_2 d_3}$ ,  $\widehat{d_3 d_1}$ ) chordálou  $ch_{1,2}$  ( $ch_{2,3}$ ,  $ch_{3,1}$ ) parabol  $P_1 P_2$  ( $P_2 P_3$ ,  $P_3 P_1$ ). Z os úhlů volme vždy ty, které púli úhel obsahující ohnisko  $F$ .

Chordály  $ch_{1,2}$ ,  $ch_{2,3}$ ,  $ch_{3,1}$ , jsouce osami úhlů trojúhelníku, procházejí jedním bodem. Odtud věta:

„Chordály tří parabol o společném ohnisku protínají se v jednom bodě.“

c) Společné tečny:

Při sestrojování společných tečen užijeme elementární věty:

„Body souměrně položené s ohniskem paraboly podle všech jejich tečen vyplňují přímku řídící.“

Bod  $F'$  souměrně položený s ohniskem  $F$  podle společné tečny  $t$  leží na řídící přímce  $d_1$  a současně na  $d_2$ , tedy v jejich průsečíku. Jediná společná tečna  $t$  jest osou souměrnosti úsečky  $\overline{FF'}$ .

d) Pomocná věta:

Hledejme geometrické místo bodů souměrně sdružených s ohniskem paraboly podle všech jejích normál!

V libovolném bodě  $B$  paraboly  $P(d, F)$  sestrojme normálu  $n$ , která púli vnitřní úhel průvodičů! (Obr. 2.) Bod  $F'$  souměrně položený s ohniskem  $F$  podle normály  $n$  leží na průvodiči bodu  $B$ .

$\triangle BFF'$  jest rovnoramenný:  $\alpha_1 = \alpha_2$ ,  $\overline{FK} = \overline{F'K}$ , proto:  
 $\overline{BF} = \overline{BF'}$ .

Z vlastnosti paraboly:

$$\overline{BF} = \overline{BB'}$$

Přirovnáním pravých stran:

$$\overline{BB'} = \overline{BF'}$$

neboli

$$\overline{B'F'} = 2 \cdot \overline{B'B}$$

Geometrickým místem bodů  $F'$  jest proto křivka afinní k dané parabole podle osy  $d$ , směru  $o$  a poměru  $2 : 1$ . Z obr. 2 plyne

$$\operatorname{tg} \varphi_1 : \operatorname{tg} \varphi_2 = \frac{\overline{B'T}}{\overline{B'B}} : \frac{\overline{B'T}}{\overline{B'F'}} = \overline{B'F'} : \overline{BB'} = 2 : 1.$$

Subnormála paraboly se rovná parametru, proto

$$\operatorname{tg} \varphi_1 : \operatorname{tg} \varphi_2 = \frac{\overline{B_1N}}{\overline{BB_1}} : \frac{\overline{F_1N'}}{\overline{BB_1}} = p_1 : p_2.$$

Srovnáním

$$p_1 : p_2 = 2 : 1.$$

Jest proto geom. místem bodů  $F'$  parabola, jejímž vrcholem jest bod  $F$  a řídicí přímkou symetrála úsečky  $\overline{VF}$ .

e) Společné normály:


Užijme věty právě odvozené pro konstrukci společných normál parabol  $P_1(d_1, F)$ ,  $P_2(d_2, F)$ !

Sestrojíme parabolu  $P'_1$  bodů souměrně sdružených s ohniskem  $F$  podle normál paraboly  $P_1$  a analogickou křivku  $P'_2$  (o témž vrcholu) pro parabolu  $P_2$ . Jejich průsečíky buďtež  $F, G_1, G_2, G_3$  ( $G_2, G_3$  mohou býti imaginární). Společná normála  $n_i$  jest symetrálou úsečky  $\overline{FG_i}$ .

f) Tečna jedné normálou druhé paraboly:

Hledejme přímky  $m$ , které se dotýkají paraboly  $P_1(d_1, F)$  a jsou normálami paraboly  $P_2(d_2, F)$ ! Užijeme opět geometrických míst  $d_1$  resp.  $P'_2$  bodů souměrně položených s ohniskem  $F$  podle tečen paraboly  $P_1$  resp. podle normál paraboly  $P_2$ . Vyšetříme průsečíky  $X, Y$  (reálné nebo imaginární) přímky  $d_1$  s pomocnou parabolu  $P'_2$ . Symetrály úseček  $\overline{FX}, \overline{FY}$  jsou hledané přímky.

Tuto úlohu lze řešiti pouhým pravítkem a kružítkem takto (obr. 3): Parabole  $P'_2$  ( $d'_2, F'$ ) přiřadíme kolineární kružnici  $P_0$  o středu  $F'$  a poloměru  $\overline{F'D'}$ . Středem kolineace jest  $F'$ , osou přímka  $o[F' \parallel d_2]$  a jednou družinou body  $F, D'$ . K přímce  $d_1$  sestrojíme kolineární přímku  $d_0$ , vyhledáme její průsečíky  $X_0, Y_0$



Obr. 3.

s kružnicí  $P_0$  a k nim kolineárně sdružené body  $X, Y$  jsou hledanými průsečíky přímky  $d_1$  s parabolou  $P'_2$ .

#### g) Analogie v prostoru:

Úvahy o společných bodech, tečnách, normálách lze aplikovati i na průsečíky, společné tečné roviny i normály tří rotačních paraboloidů o společném ohnisku, což přenechávám pílí laskavého čtenáře.