

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

František Josef Studnička

Nový důkaz poučky o poměrech mezi původními a přidruženými determinanty a subdeterminanty

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 1 (1872), No. 1, 6--10

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/123427>

Terms of use:

© Union of Czech Mathematicians and Physicists, 1872

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

a Janu Dostálovi. U věci té pokračoval tak pilně, že za několik měsíců první část dfla toho, obsahující „*Počátky aritmetiky*“, byla dokončena a nezbývalo ničehož, leč aby je ještě někdo přehledl a vludivé se chyby a nedopatření opravil, v kteroužto práci se později uvázal k přimlouvání kanovníka Lenharta bývalý žák Vydrův a nástupce na stoličce učitelské Ladislav Jandera, načež spis ten r. 1806 nákladem c. k. normální školy vtištěn byl co „*Počátkové aritmetiky*“ od *St. Vydry*.

Skončiv první část umění mathematického v jazyku českém, dal se Vydra ihned do diktování *algebry* v témže jazyku, avšak neskončil ji; neboť v srpnu r. 1804 začal patrně na celém těle slábnouti a tak silně kašlati, že i sluchu svého téměř pozbyl, takže všeliké ústní jednání a rozmlouvání s ním stalo se nemožným. Slábnuv co den více a více ulehl dne 2. prosince t. r. jak obyčejně na lože své, z něhož však nepovstal více; byv v noci dne 3. prosince raněn mrtvicí, vypustil u večer téhož dne šlechetného ducha svého, načež mrtvé tělo jeho pochováno jest dne 6. prosince 1804 na volšanském svatém poli v přítvodu tak četném a slavném, jakého na drahé časy nebylo viděti v městech pražských.

(Dokončení.)

Nový důkaz poučky o poměrech

mezi původními a přidruženými determinanty a subdeterminanty.

(Podává dr. F. J. Studnička.)

Poměr mezi původním determinantem stupně n tého

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1, b_1, \dots, l_1 \\ a_2, b_2, \dots, l_2 \\ \vdots \\ a_n, b_n, \dots, l_n \end{vmatrix} = (a_1 b_2 \dots l_n)$$

a přidruženým k němu

$$\Delta' = \begin{vmatrix} A_1, B_1, \dots, L_1 \\ A_2, B_2, \dots, L_2 \\ \vdots \\ A_n, B_n, \dots, L_n \end{vmatrix} = (A_1 B_2 \dots L_n)$$

vyjadřuje, jak známo, *) vzorec

$$\Delta' = \Delta^{n-1}, \quad (1)$$

kterýž obdržíme, znásobíme-li oba determinanty, čímž povstane

$$\Delta\Delta' = \begin{vmatrix} \Sigma a_k A_k, \Sigma b_k A_k, \dots, \Sigma l_k A_k \\ \Sigma a_k B_k, \Sigma b_k B_k, \dots, \Sigma l_k B_k \\ \vdots \\ \Sigma a_k L_k, \Sigma b_k L_k, \dots, \Sigma l_k L_k \end{vmatrix},$$

aneb považíme-li, že všeobecně

$$\begin{aligned} \Sigma k_k K_k &= \Delta, \\ \Sigma h_k K_k &= 0, \\ \Delta\Delta' &= \begin{vmatrix} \Delta, 0, \dots, 0 \\ 0, \Delta, \dots, 0 \\ \vdots \\ 0, 0, \dots, \Delta \end{vmatrix} = \Delta^n, \end{aligned}$$

z kteréžto rovnice bezprostředně plyne vzorec (1).

Abychom si další sem patřící vzorce jednoduchým způsobem **), což jest účelem tohoto pojednání, ustanovili, znásobme známý vzorec rozkladný

$$\Delta = a_1 A_1 + b_1 B_1 + \dots + l_1 L_1.$$

na obou stranách Δ^{n-2} a zjednejme si tudíž

$$\Delta^{n-1} = A_1 a_1 \Delta^{n-2} + B_1 b_1 \Delta^{n-2} + \dots + L_1 l_1 \Delta^{n-2};$$

porovnáme-li pak s tímto vzorcem

$$\Delta^{n-1} = A_1 \mathfrak{A}_1 + B_1 \mathfrak{B}_1 + \dots + L_1 \mathfrak{L}_1,$$

kterýž obdržíme, rozložíme-li i přidružený determinant stejným způsobem, poznáme snadno, že

*) Viz „O determinantech“ sepsal dr. F. J. Studnička pag. 40.

***) Borchardtův důkaz, jež uvádí Baltzer v „Theorie und Anwendung der Determinanten“, jest pro začátečníka příliš nepřístupný.

$$\begin{aligned} a_1 \mathcal{A}^{n-2} &= \mathfrak{A}_1 = (B_2 C_3 D_4 \dots L_n), \\ b_1 \mathcal{A}^{n-2} &= \mathfrak{B}_1 = (C_2 D_3 E_4 \dots A_n), \\ &\vdots \end{aligned} \tag{2}$$

$$l_1 \mathcal{A}^{n-2} = \mathfrak{L}_1 = (A_2 B_3 C_4 \dots K_n),$$

čímž vyjádřen poměr subdeterminantu stupně prvního soustavy přidružené k determinantu původnímu.

Použijeme-li tohoto výsledku a sestavíme-li podle vzorce (2)

$$a_1 \mathcal{A}^{n-2} = (B_2 C_3 \dots L_n) = B_2 (C_3 D_4 \dots L_n) + \dots,$$

$$b_1 \mathcal{A}^{n-2} = (A_1 C_3 \dots L_n) = A_1 (C_3 D_4 \dots L_n) + \dots,$$

a vedle toho podobně

$$a_2 \mathcal{A}^{n-2} = (B_1 C_3 \dots L_n) = B_1 (C_3 D_4 \dots L_n) + \dots,$$

$$b_1 \mathcal{A}^{n-2} = (A_2 C_3 \dots L_n) = A_2 (C_3 D_4 \dots L_n) + \dots,$$

obdržíme snadno, odečteme-li součin posledních dvou rovnic od součinu předcházejících dvou

$$(a_1 b_2) \mathcal{A}^{2n-4} = (A_1 B_2) (C_3 D_4 \dots L_n)^2 + \dots;$$

o přidruženém determinantu ale platí

$$\mathcal{A}^{n-1} = (A_1 B_2 C_3 \dots L_n) = (A_1 B_2) (C_3 D_4 \dots L_n) + \dots,$$

aneb znásobíme-li na obou stranách $(a_1 b_2) \mathcal{A}^{n-3}$,

$$(a_1 b_2) \mathcal{A}^{2n-4} = (A_1 B_2) (a_1 b_2) \mathcal{A}^{n-3} (C_3 D_4 \dots L_n) + \dots;$$

porovnáme-li tedy oba výsledky, poznáme, že

$$(A_1 B_2) (C_3 D_4 \dots L_n)^2 + \dots = (A_1 B_2) (a_1 b_2) \mathcal{A}^{n-3} (C_3 D_4 \dots L_n) + \dots$$

z čehož jde, jelikož na obou stranách jest spořádáno podle stejných podřízených determinantů soustavy přidružené,

$$(a_1 b_2) \mathcal{A}^{n-3} = (C_3 D_4 \dots L_n); \tag{3}$$

podobně bychom obdrželi

$$(a_1 c_2) \mathcal{A}^{n-3} = (B_3 D_4 \dots L_n)$$

\vdots

$$(k_1 l_2) \mathcal{A}^{n-3} = (A_3 B_4 \dots J_n) \text{ atd.,}$$

z čehož patrné, jak souvisí subdeterminant stupně druhého soustavy přidružené s determinantem původním a jeho subdeterminantem stupně $(n-2)$ ho.

Abychom přišli ku vzorci

$$(a_1 b_2 c_3) \mathcal{A}^{n-4} = (D_4 E_5 \dots L_n) = \mathfrak{D}_4,$$

použijme obou předcházejících a sestavme si

$$\begin{aligned} (a_1 \ b_2) \mathcal{A}^{n-3} &= (C_3 \ D_4 \ \dots \ L_n) = C_3 \vartheta_4 + \dots, \\ c_3 \mathcal{A}^{n-2} &= (A_1 \ B_2 \ D_4 \ \dots \ L_n) = (A_1 \ B_2) \vartheta_4 + \dots; \end{aligned}$$

a mimo to podobně

$$\begin{aligned} (a_1 \ c_2) \mathcal{A}^{n-3} &= (B_3 \ D_4 \ \dots \ L_n) = B_3 \vartheta_4 + \dots, \\ b_3 \mathcal{A}^{n-2} &= (A_1 \ C_2 \ D_4 \ \dots \ L_n) = (A_1 \ C_2) \vartheta_4 + \dots \end{aligned}$$

a konečně ještě

$$\begin{aligned} (b_1 \ c_2) \mathcal{A}^{n-3} &= (A_3 \ D_4 \ \dots \ L_n) = A_3 \vartheta_4 + \dots, \\ a_3 \mathcal{A}^{n-2} &= (B_1 \ C_2 \ D_4 \ \dots \ L_n) = (B_1 \ C_2) \vartheta_4 + \dots; \end{aligned}$$

znásobíme-li vždy dvě pod sebou stojící rovnice a sečteme-li pak příslušným způsobem, obdržíme především

$$(a_1 \ b_2 \ c_3) \mathcal{A}^{2n-5} = (A_1 \ B_2 \ C_3) \vartheta_4^2 + \dots;$$

o přidruženém determinantu však víme, že

$$\mathcal{A}^{n-1} = (A_1 \ B_2 \ \dots \ L_n) = (A_1 \ B_2 \ C_3) \vartheta_4 + \dots,$$

aneb znásobíme-li na obou stranách stejným součinem,

$$(a_1 \ b_2 \ c_3) \mathcal{A}^{2n-5} = (A_1 \ B_2 \ C_3) (a_1 \ b_2 \ c_3) \mathcal{A}^{n-4} \vartheta_4 + \dots;$$

porovnáme-li tedy oba výsledky, obdržíme snadno

$$(A_1 \ B_2 \ C_3) \vartheta_4^2 + \dots = (A_1 \ B_2 \ C_3) (a_1 \ b_2 \ c_3) \mathcal{A}^{n-4} \vartheta_4 + \dots,$$

a jelikož na obou stranách jsou členové seřadění podle subdeterminantů stupně třetího soustavy přidružené, konečně

$$(a_1 \ b_2 \ c_3) \mathcal{A}^{n-4} = (D_4 \ E_5 \ \dots \ L_n), \quad (4)$$

atd., z čehož patrno, že subdeterminant stupně třetího soustavy přidružené rovná se $(n-4)$ té mocnině determinantu původního, znásobenému s příslušným subdeterminantem stupně $(n-3)$ ho.

Porovnáme-li dosavadní výsledky, sestavíme podle analogie snadno soustavu vzorců tuto:

$$\begin{aligned} \mathcal{A}^{n-1} &= (A_1 \ B_2 \ C_3 \ D_4 \ E_5 \ \dots \ K_{n-1} \ L_n), \\ \mathcal{A}^{n-2} a_1 &= (B_2 \ C_3 \ D_4 \ E_5 \ \dots \ K_{n-1} \ L_n), \\ \mathcal{A}^{n-3} (a_1 \ b_2) &= (C_3 \ D_4 \ E_5 \ \dots \ K_{n-1} \ L_n), \\ \mathcal{A}^{n-4} (a_1 \ b_2 \ c_3) &= (D_4 \ E_5 \ \dots \ K_{n-1} \ L_n), \\ \mathcal{A}^{n-5} (a_1 \ b_2 \ c_3 \ d_4) &= (E_5 \ \dots \ K_{n-1} \ L_n), \\ &\vdots \\ &\vdots \\ &\vdots \end{aligned}$$

$$\mathcal{A} (a_1 \ b_2 \ c_3 \ \dots \ i_{n-2}) = (K_{n-1} \ L_n),$$

$$\mathcal{A}^0 (a_1 \ b_2 \ c_3 \ \dots \ i_{n-2} \ k_{n-1}) = L_n,$$

aneb všeobecně jedním vzorcem, označíme-li prvky determinantu jedním znakem s dvěma ukazovateli,

$$\mathcal{A}^{n-k-1} (a_{11} \ a_{22} \ \dots \ a_{kk}) = (A_{k+1, k+1} \ \dots \ A_{nn}), \quad (6)$$

z čehož patrně, že *subdeterminant soustavy přidružené stupně $(n-k)$ tého rovná se $(n-k-1)$ ní mocnině determinantu původního, znásobené s příslušným determinantem doplňkovým.*

P o z n á m k a. Použijeme-li počtu diferenciálního, můžeme tyto výsledky ještě kratším způsobem vyjádřit a sice soustavu vzorců (5) jednoduše nahraditi vzorci

$$\begin{aligned} \Delta^{n-1} &= \Delta', \\ a_1 \Delta^{n-2} &= \frac{\partial \Delta'}{\partial A_1}, \\ (a_1 \ b_2) \Delta^{n-3} &= \frac{\partial^2 \Delta'}{\partial A_1 \partial B_2}, \\ (a_1 \ b_2 \ c_3) \Delta^{n-4} &= \frac{\partial^3 \Delta'}{\partial A_1 \partial B_2 \partial C_3}, \\ &\vdots \\ &\vdots \\ (a_1 \ b_2 \ c_3 \ \dots \ i_{n-2}) \Delta &= \frac{\partial^{n-2} \Delta'}{\partial A_1 \partial B_2 \dots \partial I_{n-2}}, \end{aligned} \quad (7)$$

a všeobecný vzorec (6) jednoduše

$$(a_{11} \ a_{22} \ \dots \ a_{kk}) \Delta^{n-k-1} = \frac{\partial^k \Delta'}{\partial A_{11} \partial A_{22} \dots \partial A_{kk}}; \quad (8)$$

povážíme-li konečně, že

$$(a_{11} \ a_{22} \ \dots \ a_{kk}) = \frac{\partial^{n-k} \Delta}{\partial a_{k+1, k+1} \dots \partial a_{n, n}},$$

obdržíme z posledního vzorce ještě

$$\frac{\partial^k \Delta'}{\partial A_{11} \partial A_{22} \dots \partial A_{kk}} = \Delta^{n-k-1} \frac{\partial^{n-k} \Delta'}{\partial a_{k+1, k+1} \dots \partial a_{n, n}}, \quad (9)$$

z čehož ještě zřejměji vysvítá poměr mezi původním determinantem a přidruženým.

Začátky mathematické krystallografie.

(Píše prof. Jan Krejčí.)

Mnohý horlivý učeň věd přírodních byl hned při prvním vstoupení do oboru mathematické krystallografie odstrašen překážkami pro něj zdánlivě nepřemožitelnými, poněvadž knihy