

Matematicko-fyzikálny časopis

Jiří Sedláček

Několik poznámek k problému W. Mnicha

Matematicko-fyzikálny časopis, Vol. 13 (1963), No. 2, 97--102

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/126497>

Terms of use:

© Mathematical Institute of the Slovak Academy of Sciences, 1963

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

NĚKOLIK POZNÁMEK K PROBLÉMU W. MNICHA

JIŘÍ SEDLÁČEK, Praha

Je známé, že neexistují tři racionální čísla x_1, x_2, x_3 tak, aby platilo

$$x_1 + x_2 + x_3 = 1, \quad x_1 x_2 x_3 = 1. \quad (1)$$

Označme R těleso všech racionálních čísel, C obor integrity všech celých racionálních čísel. W. Mnich položil před časem otázku, zda v C existují čísla x, y, z tak, aby platilo:

$$\frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x} = 1.$$

Je znám snadný důkaz, že tato úloha je ekvivalentní s otázkou řešitelnosti soustavy (1) v R .

Všimněme si nejprve řešitelnosti soustavy (1) v některých „širších“ oborech, zejména v kvadratických tělesech.⁽¹⁾ V tzv. Gassově tělese $R(i)$ lze najít tato řešení:

a) $x_{1,2} = \pm i, \quad x_3 = 1;$

b) $x_{1,2} = \frac{1}{2}(-1 \pm i), \quad x_3 = 2;$

c) $x_{1,2} = \frac{1}{26}(9 \pm 46i), \quad x_3 = \frac{4}{13};$

d) $x_{1,2} = \frac{1}{333}(-198 \pm 107i), \quad x_3 = \frac{81}{37};$

e) $x_{1,2} = \frac{1}{6710}(693 \pm 7501i), \quad x_3 = \frac{242}{105}.$

Také v tělese $R(\sqrt{2})$ se snadno nahlédne, že zde soustava (1) má několik řešení. Uvádím zde tyto výsledky

f) $x_{1,2} = 1 \pm \sqrt{2}, \quad x_3 = -1;$

g) $x_{1,2} = \frac{1}{2}(-3 \pm 2\sqrt{2}), \quad x_3 = 4;$

⁽¹⁾ Výsledky c), d), e), h), ch) uvádím podle výpočtů P. Bartoše, M. Hlaváčka a V. Kučery.

$$\text{h) } x_{1,2} = \frac{1}{1808} (1928 \pm 1817\sqrt{2}), \quad x_3 = -\frac{128}{113};$$

$$\text{ch) } x_{1,2} = \frac{1}{35} (-45 \pm 29\sqrt{2}), \quad x_3 = \frac{25}{7}.$$

V tělese $R(i\sqrt{31})$ jsem našel tři řešení:

$$\text{j) } x_{1,2} = \frac{1}{4} (1 \pm i\sqrt{31}), \quad x_3 = \frac{1}{2};$$

$$\text{k) } x_{1,2} = \frac{1}{10} (1 \pm 2i\sqrt{31}), \quad x_3 = \frac{4}{5};$$

$$\text{l) } x_{1,2} = \frac{1}{56} (27 \pm 53i\sqrt{31}), \quad x_3 = \frac{1}{28}.$$

V tělese $R(i\sqrt{26})$ jsem našel dvě trojice, které vyhovují rovnicím (1):

$$\text{m) } x_{1,2} = \frac{1}{3} (1 \pm i\sqrt{26}), \quad x_3 = \frac{1}{3};$$

$$\text{n) } x_{1,2} = \frac{1}{6} (-1 \pm i\sqrt{26}), \quad x_3 = \frac{4}{3}.$$

Není ovšem známé, zda v uvedených kvadratických tělesech má soustava (1) konečný nebo nekonečný počet řešení. Všimneme-li si vzorců a)–n), vidíme, že z čísel x_1, x_2, x_3 vždy jedno patří do R . Nepodařilo se mi sestavit kvadratické těleso $R(\sqrt{d})$ tak, aby v něm soustava (1) byla řešitelná čísla $\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{x}_3$, při čemž žádné z čísel $\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{x}_3$ by nepatřilo do R .

Dále vzniká otázka, zda existuje konečný nebo nekonečný počet kvadratických těles, v nichž je soustava (1) řešitelná. Odpověď je snadným důsledkem jedné věty, kterou odvodil P. Erdős:

Budiž $f(x) = a_0x^3 + a_1x^2 + a_2x + a_3$ polynom, jehož koeficienty patří do C a nechť $a_0 > 0$, $(a_0, a_1, a_2, a_3) = 1$; nechť dále rovnice $f(x) = 0$ nemá dvojnásobný kořen. Potom existuje nekonečně mnoho přirozených čísel m tak, že $f(m)$ je bezčtercové číslo.⁽²⁾

Nyní dokážeme tuto větu:

Věta 1. *Existuje nekonečně mnoho imaginárních kvadratických těles $R(i\sqrt{d})$, (kde $d > 0$ je bezčtercové číslo), v nichž je soustava (1) řešitelná.*

Důkaz. Položme $f_0(x) = 16x^3 + 20x^2 + 16x + 1$. Polynom $f_0(x)$ zřejmě splňuje

⁽²⁾ Český název „číslo bezčtercové“ používáme podle K. Rychlíka (viz str. 48 jeho *Úvodu do elementární číselné teorie*, II. vyd).

všechny předpoklady z citované podmínky P. Erdőse, takže existuje nekonečně mnoho přirozených čísel m tak, že $f_0(m)$ je bezčtvercové.⁽³⁾ Pro každé číslo t vyhovující vztahu $f_0(x) = t$ nejvýše tři přirozená čísla x , takže máme zaručenu existenci nekonečně mnoha bezčtvercových hodnot $f_0(m)$. Položme

$$x_{1,2} = \frac{1}{2(2m+1)} \cdot (2m-1 \pm i\sqrt{f_0(m)}), \quad x_3 = \frac{2}{2m+1}.$$

V nekonečně mnoha imaginárních kvadratických tělesech $R(i\sqrt{f_0(m)})$ je tedy soustava (1) řešitelná. Důkaz věty 1 je tím podán.

Poznamenejme, že obdobnou větu lze dokázat i pro reálná kvadratická tělesa.

Rozšířme nyní ještě dále původní těleso R . Nechť T je nekomutativní těleso kvaternionů nad tělesem R . Pak v T můžeme dokázat silnější tvrzení, jak ukazuje další věta.

Věta 2. *Pro každé $r \in R$ má soustava*

$$x_1 + x_2 + x_3 = r, \quad x_1 x_2 x_3 = r \quad (2)$$

nekonečně mnoho řešení v T .

Důkaz. Zvolme libovolné přirozené číslo n a položme

$$x_{1,2} = \pm \frac{1}{2^{2n-1} + 1} (2^{2n-1} i_1 + 2^n i_2 + i_3), \quad x_3 = r.$$

Snadno nahlédneme, že soustava (2) je splněna a že uvažovaných trojic x_1, x_2, x_3 je nekonečně mnoho. Důkaz je podán.⁽⁴⁾

Závěrem si všimněme řešitelnosti soustavy (1) v některých tělesech, jež nejsou číselná. Je-li p prvočíslo, označme C_p těleso zbytkových tříd (mod p). Rovnítko v soustavě (1) budeme ovšem chápat jako kongruenci (mod p). Zabýváme se tedy nyní řešitelností soustavy ⁽⁵⁾

$$x_1 + x_2 + x_3 \equiv 1 \pmod{p}, \quad x_1 x_2 x_3 \equiv 1 \pmod{p}. \quad (3)$$

Věta 3. *Je-li $p \equiv 1 \pmod{4}$, pak soustava (3) má řešení.*

⁽³⁾ V korespondenci s V. A. Goluběvem jsme konstatovali, že uvedený polynom $f_0(x)$ nabývá pro $x = 1, 2, 3, \dots, 64$ bezčtvercových hodnot, zatímco $f_0(65)$ není už bezčtvercové. Viz Goluběvovu poznámku *Kubický polynom, který nabývá mnoha bezčtvercových hodnot*, Časopis pro pěstování matematiky 87 (1962), 496.

⁽⁴⁾ Důkaz lze opřít i o vzorce jiného druhu, např.

$$x_{1,2} = \pm \frac{1}{n^2 + 1} (2n i_1 + (n^2 - 1) \cdot i_2), \quad x_3 = r.$$

⁽⁵⁾ Budeme uvažovat jen lichá prvočísla p , neboť případ $p = 2$ je triviální.

Důkaz. Je známé, že při $p \equiv 1 \pmod{4}$ je -1 kvadratickým zbytkem $(\text{mod } p)$. Zvolme tedy b tak, že $b^2 \equiv -1 \pmod{p}$ a položme $x_1 \equiv b, x_2 \equiv -b, x_3 \equiv 1 \pmod{p}$. Takto sestrojená trojice (x_1, x_2, x_3) zřejmě vyhovuje soustavě (3) a důkaz je tím podán.

Kromě řešení uvedeného v důkazu věty 3 mohou ovšem existovat i řešení jiná. Pro $p = 5$ vyhovuje soustavě (3) jediné trojice (1, 2, 3), jež odpovídá sestrojenému řešení; avšak již pro $p = 13$ dostáváme jednak trojici (1, 5, 8), kterou lze sestroit pomocí čísla b , jednak ještě trojice (2, 2, 10), (9, 9, 9).

Věta 4. *Je-li $p \equiv 7 \pmod{8}$, pak soustava (3) má řešení.*

Důkaz. Víme, že při $p \equiv 7 \pmod{8}$ je 2 kvadratickým zbytkem $(\text{mod } p)$. Zvolme tedy c tak, že $c^2 \equiv 2 \pmod{p}$ a položme $x_1 \equiv 1 + c, x_2 \equiv 1 - c, x_3 \equiv -1 \pmod{p}$. Jedno řešení je tím sestrojeno a důkaz je podán.

Opět poznamenejme, že konstrukcí popsanou v předcházející větě nemusí být všechna řešení vyčerpána. Pro $p = 7$ existuje sice jediná trojice (4, 5, 6), k níž se dojde právě uvedeným postupem, avšak případ $p = 23$ je již složitější. Podle důkazu věty 4 najdeme trojici (6, 19, 22), avšak vyhovují též trojice (3, 3, 18); (4, 5, 15); (11, 16, 20).

Zbývá ještě probrat lichá prvočísla, která jsou kongruentní s číslem 3 $(\text{mod } 8)$. Tu platí věta:

Věta 5. *Existuje prvočíslo $p \equiv 3 \pmod{8}$, pro něž soustava (3) není řešitelná. Existují však v této zbytkové třídě též prvočísla p , pro něž soustava (3) řešitelná je.*

Důkaz. Snadno nahlédneme, že pro $p = 3$ soustava (3) nemá řešení. Pro $p = 11$ vyhovuje trojice (7, 7, 9). Tím je důkaz podán.⁽⁶⁾

A. Schinzel dokázal, že pro $s > 3$ soustava

$$\sum_{j=1}^s x_j = 1, \quad \prod_{j=1}^s x_j = 1 \quad (4)$$

má v R vždy nekonečný počet řešení. Bylo by možné také tuto problematiku přenést do C_p . Tak např. se dá dokázat, že pro $s \geq 4$ soustava (4) má v C_3 vždy řešení.

LITERATURA

- [1] Cassels J. W. S., *On a diophantine equation*, Acta Arithmetica VI, (1960), 47–52.
 [2] Erdős P., *Arithmetical properties of polynomials*, Journal of the London math. Soc., 28 (1953), 416–425.

⁽⁶⁾ Pro $p = 19$ lze najít trojice (3, 7, 10); (5, 17, 17); (8, 15, 16).

[3] Mnich W., *Úloha čís. 495*, Matematika X, 1 (45), 55.

[4] Sierpiński W., *Teoria liczb II*, Warszawa 1959.

Došlo 22. 6. 1962.

*Matematický ústav
Československé akademie věd v Praze*

НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ ПО ПРОБЛЕМЕ В. МНИХА

Иржи Седлачек

Резюме

Пусть задана система уравнений

$$x_1 + x_2 + x_3 = 1, \quad x_1 x_2 x_3 = 1. \quad (1)$$

В настоящей заметке мы занимаемся, в первую очередь, решаемостью системы (1) в некоторых квадратичных полях. Более общая система

$$x_1 + x_2 + x_3 = r, \quad x_1 x_2 x_3 = r$$

(где r — данное рациональное число) имеет бесконечное число решений в некоммутативном поле кватернионов над полем рациональных чисел.

В заключение мы занимаемся системой сравнений

$$x_1 + x_2 + x_3 \equiv 1 \pmod{p}, \quad x_1 x_2 x_3 \equiv 1 \pmod{p}, \quad (2)$$

где p — данное нечетное простое число. Если $p \equiv 1 \pmod{4}$ или $p \equiv 7 \pmod{8}$, то система (2) имеет решение. Остаются еще простые числа $p \equiv 3 \pmod{8}$. В случае $p = 3$ система (2) не имеет решения, в то время как, например, для $p = 11$ и $p = 19$ решение существует.

EINIGE BEMERKUNGEN ZUM PROBLEME VON W. MNICH

Jiří Sedláček

Zusammenfassung

Es sei das Gleichungssystem

$$x_1 + x_2 + x_3 = 1, \quad x_1 x_2 x_3 = 1 \quad (1)$$

gegeben. In diesem Beitrag wird zuerst die Lösbarkeit des Systems (1) in einigen quadratischen Zahlkörpern untersucht.

Das allgemeinere System

$$x_1 + x_2 + x_3 = r, \quad x_1 x_2 x_3 = r$$

(wo r eine gegebene rationale Zahl ist) hat unendlich viele Lösungen in dem nichtkommutativen Quaternionenkörper über dem Körper aller rationalen Zahlen.

Schließlich wird das Kongruenzsystem

$$x_1 + x_2 + x_3 \equiv 1 \pmod{p}, \quad x_1 x_2 x_3 \equiv 1 \pmod{p}, \quad (2)$$

wo p eine gegebene ungerade Primzahl ist, untersucht. Für $p \equiv 1 \pmod{4}$ und für $p \equiv 7 \pmod{8}$ ist das System (2) lösbar. Es bleiben noch die Primzahlen $p \equiv 3 \pmod{8}$. Für $p = 3$ besitzt das System (2) keine Lösung, aber für $p = 11$ und für $p = 19$ z. B., ist das System (2) lösbar.