

Matematicko-fyzikálny časopis

Tibor Šalát

O súčtoch istých konvergentných radov

Matematicko-fyzikálny časopis, Vol. 4 (1954), No. 4, 203--211

Persistent URL: <http://dml.cz/dmlcz/126861>

Terms of use:

© Mathematical Institute of the Slovak Academy of Sciences, 1954

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these *Terms of use*.



This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project *DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library* <http://project.dml.cz>

O SÚČTOCH ISTÝCH KONVERGENTNÝCH RADOV

TIBOR ŠALÁT, Bratislava

Nech

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots \quad (1)$$

je konvergentný rad a nech $a_n > 0$ pre všetky prirodzené n .

Definícia 1. *Znamienkovou schémou budeme nazývať postupnosť:*

$$[\alpha] \equiv \varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \dots, \varepsilon_n, \dots,$$

kde $\varepsilon_n = 1$ alebo -1 . Rad (1) budeme nazývať základným radom.

Definícia 2. *Budeme hovoriť, že rad*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon_n a_n = \varepsilon_1 a_1 + \varepsilon_2 a_2 + \dots + \varepsilon_n a_n + \dots$$

vznikol aplikovaním schémy

$$[\alpha] \equiv \varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \dots, \varepsilon_n, \dots$$

na rad (1).

Znakom X označíme množinu radov, vzniknutých aplikovaním všetkých možných znamienkových schém na rad (1). Množina X je zrejme nespočetná mohutnosti kontinua. Do množiny X patrí aj základný rad (1) pri schéme:

$$[\alpha] \equiv +1, +1, +1, \dots, +1, \dots$$

Všetky rady množiny X sú zrejme konvergentné.

Predmetom tejto práce je vyšetovanie vlastností množiny súčtov radov z X .

Nech je

$$x, y \in X, x = \sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon_n a_n, y = \sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon'_n a_n.$$

Definujme na množine $X \times X$ reálnu funkciu $\varrho(x, y)$ takto:

1 Ak $x = y$, položme $\varrho(x, y) = 0$.

2. Ak $x \neq y$, nech $\varrho(x, y) = \frac{1}{\lambda}$, kde λ je prvý index taký, že $\varepsilon_\lambda \neq \varepsilon'_\lambda$.

Ukážeme, že takto definovaná funkcia je metrikou na X . K tomu stačí ukázať, že:

1. $\varrho(x, y) \geq 0$ a $\varrho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$. To je zrejmé.
2. $\varrho(x, y) = \varrho(y, x)$. To je tiež zrejmé.
3. Nech $x, y, z \in X$.

$$x = \varepsilon_1 a_1 + \varepsilon_2 a_2 + \dots + \varepsilon_n a_n + \dots$$

$$y = \varepsilon'_1 a_1 + \varepsilon'_2 a_2 + \dots + \varepsilon'_n a_n + \dots$$

$$z = \varepsilon''_1 a_1 + \varepsilon''_2 a_2 + \dots + \varepsilon''_n a_n + \dots$$

Treba ukázať, že: $\varrho(x, z) \leq \varrho(x, y) + \varrho(y, z)$.

Ak aspoň dva z pomedzi radov x, y, z sú totožné, potom zrejme vlastnosť 3.

platí. Nech sú teda všetky tri rady rôzne a nech $\varrho(x, y) = \frac{1}{l}$, $\varrho(y, z) = \frac{1}{n}$.

Sú tu tri možnosti:

a) $l = n$. Potom vidieť, že $\varrho(x, z) = \frac{1}{l}$ a vlastnosť 3. je splnená.

b) $l < n$. Potom je $\varepsilon'_i = \varepsilon''_i$ pre $1 \leq i \leq n - 1$, teda tiež pre $i = l \leq n - 1$ a vlastnosť 3. je splnená.

c) $l > n$. Dôkaz platnosti vlastnosti 3. v tomto prípade sa dostane z b), ak rady berieme v poradí z, y, x .

V ďalšom sa budeme zaoberať vlastnosťami priestoru X opatreného metrikou ϱ .

Veta 1. Priestor (X, ϱ) je úplný.

Dôkaz. Nech $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ je cauchyovská postupnosť bodov z X . Teda:

$$x_n = \varepsilon_1^{(n)} a_1 + \varepsilon_2^{(n)} a_2 + \varepsilon_3^{(n)} a_3 + \dots + \varepsilon_k^{(n)} a_k + \dots,$$

kde $\varepsilon_k^{(n)} = 1$ alebo -1 . K ľubovoľnému $\varepsilon > 0$ existuje $N(\varepsilon)$ tak, že pre $m, n \geq N(\varepsilon)$ platí: $\varrho(x_m, x_n) < \varepsilon$. Položme za ε postupne: $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{k}, \dots$

Ku každému $\varepsilon = \frac{1}{k}$ teda existuje $N\left(\frac{1}{k}\right)$ tak, že pre $m, n \geq N\left(\frac{1}{k}\right)$ je $\varrho(x_m, x_n) < \frac{1}{k}$. Označme $N\left(\frac{1}{k}\right) = N_k$. Keďže pre $m, n \geq N_{k+1} \Rightarrow \varrho(x_m, x_n) < \frac{1}{k+1} < \frac{1}{k}$, bude $N_{k+1} \geq N_k$.

Takto dostávame postupnosť prirodzených čísel:

$$N_1 \leq N_2 \leq N_3 \leq \dots \leq N_k \leq \dots \quad (2)$$

Ak množina členov tejto postupnosti je konečná a napr. N_k je najväčší jej prvok, potom pre $m, n \geq N_k$ zrejme bude $\varrho(x_m, x_n) < \varepsilon$, kde ε je ľubovoľné kladné číslo a potom N_k -ty rad je limitou danej postupnosti, t. j. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_{N_k}$.

Ak však množina členov postupnosti (2) je nekonečná, zostrojme tento rad:

$$x = \varepsilon_1 a_1 + \varepsilon_2 a_2 + \varepsilon_3 a_3 + \dots + \varepsilon_n a_n + \dots,$$

kde $\varepsilon_i = \varepsilon_i^{N_k}$, pre $i = 1, 2, 3, \dots, k$. Ukážeme, že $\varrho(x_n, x) \rightarrow 0$. Skutočne, nech je dané $\varepsilon > 0$. Zvolíme si prirodzené k také veľké, aby $\frac{1}{k} < \varepsilon$. Potom pre $n \geq N_k$ bude $\varrho(x_n, x) < \frac{1}{k} < \varepsilon$. Tým je dôkaz hotový.

Veta 2. *Priestor (X, ϱ) je relatívne kompaktný.*

Dôsledok: Vzhľadom na vetu 1 teda (X, ϱ) je kompaktný metrický priestor.

Dôkaz. Stačí ukázať, že k ľubovoľnému $\varepsilon > 0$ existuje konečná ε -ová sieť priestoru X , t. j. konečná množina $A(\varepsilon) \subset X$ tak, že pre každé $x \in X$ je $\varrho[x, A(\varepsilon)] < \varepsilon$. Nech je teda dané ľubovoľné $\varepsilon > 0$. Zvolíme si prirodzené N tak, aby $\frac{1}{N} < \varepsilon$. Zostrojme všetky možné rady tvaru:

$$\varepsilon'_1 a_1 + \varepsilon'_2 a_2 + \dots + \varepsilon'_N a_N + \varepsilon'_{N+1} a_{N+1} + \varepsilon'_{N+2} a_{N+2} + \dots,$$

kde $\varepsilon'_i = 1$ alebo -1 pre $i = 1, 2, 3, \dots, N$ a $\varepsilon'_i = 1$ pre všetky $i = N+1, N+2, N+3, \dots, N+k, \dots$

Množina všetkých týchto radov je konečná a má 2^N prvkov. Označíme ju $A(\varepsilon)$. Nech $x \in X$, $x = \sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon_n a_n$. V množine $A(\varepsilon)$ existuje prvok $y = \sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon'_n a_n$

taký, že $\varepsilon'_i = \varepsilon_i$ pre $i = 1, 2, 3, \dots, N$. Teda $\varrho(x, y) < \frac{1}{N} < \varepsilon \Rightarrow \varrho[x, A(\varepsilon)] < \varepsilon$.

Predošlé vety nám ukazujú najzákladnejšie vlastnosti priestoru (X, ϱ) , ktoré v ďalšom použijeme.

Definícia 3. *Funkciou $S(x)$ definovanou na priestore (X, ϱ) budeme v ďalšom rozumiť súčet radu x .*

Označenie. Množinu všetkých funkčných hodnôt funkcie $S(x)$ označme znakom W . Množina W je teda akási množina reálnych čísel a naším cieľom je vyšetrovanie vlastností množiny W .

Veta 3. *Funkcia $S(x)$ je spojitá na celom priestore X .*

Dôkaz. Nech $x \in X$. Máme ukázať, že funkcia $S(x)$ je spojitá v bode x . Znakom R_n označíme zvyšok po n -tom člene v rade (1). Nech ε je ľubovoľné kladné číslo. Zvolíme prirodzené N tak, aby $R_N < \frac{\varepsilon}{2}$. Potom pre $\varrho(x, y) < \frac{1}{N}$ je $|S(x) - S(y)| \leq 2R_N < \varepsilon$.

Dôsledok: Keďže priestor X je kompaktný, množina W je tiež kompaktná v E_1 . Teda W je uzavretá a ohraničená. Zrejme je $\sup W = S(\xi)$,

kde $\xi = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots$ a $\inf W = S(\bar{\xi})$, kde $\bar{\xi} = -a_1 - a_2 - a_3 - \dots - a_n - \dots$. Platí $\sup W = -\inf W$. V ďalšom označme $A = \sup W$. Množina W sa teda dostane, vzhľadom na známe vety o štruktúre lineárnych uzavrených množín, z intervalu $\langle -A, A \rangle$ vynechaním spočetného systému otvorených dizjunktných intervalov (tzv. styčných intervalov).

Označenie. V ďalšom základný rad (1) budeme sústavne značiť znakom ξ .
Rad

$$\varepsilon_1 a_1 + \varepsilon_2 a_2 + \varepsilon_3 a_3 + \dots + \varepsilon_n a_n + \dots,$$

vzniknutý aplikovaním schémy:

$$[\alpha] \equiv \varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \dots, \varepsilon_n, \dots$$

na rad ξ budeme pre stručnosť značiť znakom $[\alpha]\xi$. Jeho súčet teda je $S([\alpha]\xi)$.

Veta 4. *Množina W je husto rozložená.*

Dôsledok. Keďže W je uzavretá (pozri dôsledok vety 3), W je perfektná množina.

Dôkaz. Máme ukázať, že každý prvok $S([\alpha]\xi) \in W$ je pre ňu hromadným bodom. Nech teda $S([\alpha]\xi) \in W$, nech $[\alpha]\xi = \sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon_n a_n$. Keďže rad (1) konverguje, je $a_n \rightarrow 0$. Nech ε je ľubovoľné kladné číslo. Existuje prirodzené n tak, že $a_n < \frac{\varepsilon}{2}$. Nech $\varepsilon'_i = \varepsilon_i$ pre $i \neq n$ a $\varepsilon'_n = -\varepsilon_n$. Utvoríme schému:

$$[\alpha'] \equiv \varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \varepsilon'_3, \dots, \varepsilon'_n, \dots$$

a zostrojme rad $[\alpha']\xi = \sum_{i=1}^{\infty} \varepsilon'_i a_i$. Potom:

$$|S([\alpha]\xi) - S([\alpha']\xi)| = |2\varepsilon_n a_n| < \varepsilon,$$

z čoho vyplýva tvrdenie vety.

Veta 5. *Množina W je symetrická podľa bodu O .*

Dôkaz. Nech $S([\alpha]\xi) \in W$. Potom ku schéme:

$$[\alpha] \equiv \varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \dots, \varepsilon_n, \dots$$

zostrojme schému:

$$[-\alpha] \equiv \varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \varepsilon'_3, \dots, \varepsilon'_n, \dots$$

tak, aby $\varepsilon'_n \neq \varepsilon_n$ pre každé prirodzené n . Vidieť, že

$$S([\alpha]\xi) = -S([-\alpha]\xi).$$

Poznámka. Ďalšie vety nám ukážu, že v špeciálnych prípadoch v ďalšom uvažovaných štruktúra systému styčných intervalov množiny W podstatne závisí od pomeru veľkosti členov základného radu (1) k zvyškom k nim príslušným.

Vyšetrovanie štruktúry systému styčných intervalov vykonáme pre dva špeciálne prípady. V prvom prípade budeme predpokladať, že pre každé prirodzené k v základnom rade (1) platí: $a_k > R_k$; v druhom prípade zase, že pre každé prirodzené k platí: $a_k \leq R_k$.

Príkladom pre prvý prípad môže slúžiť rad:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^5} + \dots + \frac{1}{2^{2k+1}} + \dots,$$

alebo všeobecnejší g -adický rad tvaru $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{2n+1}}{g^{2n+1}}$, kde g celé ≥ 2 , $0 < a_{2n+1} < g$.

Skutočne pre každé $k \geq 1$ platí:

$$R_{2k-1} = \frac{a_{2k+1}}{g^{2k+1}} + \frac{a_{2k+3}}{g^{2k+3}} + \dots \leq \frac{g-1}{g^{2k+1}} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{g^2}} = \frac{1}{g+1} \frac{1}{g^{k-1}} < \frac{a_{2k-1}}{g^{k-1}}.$$

Príkladom pre druhý prípad môže slúžiť geometrický rad:

$$1 + q + q^2 + q^3 + \dots + q^n + \dots$$

s kvocientom q , $\frac{1}{2} \leq q < 1$. Skutočne pri tejto voľbe kvocienta je:

$$R_k = q^k + q^{k+1} + q^{k+2} + \dots = q^{k-1} \frac{q}{1-q} \geq q^{k-1}.$$

Najprv sa budeme zaoberať prípadom prvým.

Označenie. Nech n je prirodzené číslo. Znakom $I_{\varepsilon_1 \varepsilon_2 \dots \varepsilon_n}$ označíme otvorený interval so stredom v bode $\varepsilon_1 a_1 + \varepsilon_2 a_2 + \dots + \varepsilon_n a_n$, s pravým koncovým bodom $S([\alpha_1] \xi)$, kde

$$[\alpha_1] \xi = \varepsilon_1 a_1 + \varepsilon_2 a_2 + \dots + \varepsilon_n a_n + a_{n+1} - a_{n+2} - a_{n+3} - \dots$$

a s ľavým koncovým bodom $S([\alpha_2] \xi)$, kde

$$[\alpha_2] \xi = \varepsilon_1 a_1 + \varepsilon_2 a_2 + \dots + \varepsilon_n a_n - a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3} + \dots$$

Ak znamienka ε_i volíme ľubovoľne, dostávame takto celkom 2^n takýchto intervalov. Nech n prebieha všetky prirodzené čísla, t. j. nech $n = 1, 2, 3, \dots$. Potom uvedené intervaly tvoria určitý spočetný systém otvorených intervalov, ktorý označíme znakom γ .

Veta 6. Nech v základnom rade (1) pre všetky prirodzené k platí: $a_k > R_k$. Potom systém γ predstavuje systém styčných intervalov množiny W v intervale $\langle -A, A \rangle$, kde A je súčet základného radu (1).

Dôkaz. 1. Napred ukážeme, že intervaly systému γ sú dizjunktné s množinou W , t. j. pre každé $I_{\varepsilon_1 \varepsilon_2 \dots \varepsilon_n} \in \gamma$ platí:

$$I_{\varepsilon_1 \varepsilon_2 \dots \varepsilon_n} \cap W = \emptyset.$$

Nech nejaký prvok $S([\alpha']\xi) \in W$ patrí do $I_{\varepsilon_1\varepsilon_2 \dots \varepsilon_n}$.

Nech $[\alpha']\xi = \varepsilon'_1 a_1 + \varepsilon'_2 a_2 + \varepsilon'_3 a_3 + \dots + \varepsilon'_n a_n + \dots$

Ukážeme, že potom musí byť $\varepsilon'_i = \varepsilon_i$ pre $i = 1, 2, \dots, n$.

Nech totiž existuje aspoň jedno $\varepsilon'_i \neq \varepsilon_i$ pre nejaké $i = 1, 2, \dots, n$.

Nech ε'_i je prvé tohto druhu a nech $\varepsilon'_i = +1$, avšak $\varepsilon_i = -1$ (v opačnom prípade je úvaha rovnaká). Uvážme, že je:

$$2R_i = 2a_{i+1} + 2a_{i+2} + 2a_{i+3} + \dots \geq (\varepsilon_{i+1}a_{i+1} - \varepsilon'_{i+1}a_{i+1}) + \\ + (\varepsilon_{i+2}a_{i+2} - \varepsilon'_{i+2}a_{i+2}) + \dots + (\varepsilon_n a_n - \varepsilon'_n a_n) + (a_{n+1} - \varepsilon'_{n+1}a_{n+1}) + \\ + (-a_{n+2} - \varepsilon'_{n+2}a_{n+2}) + (-a_{n+3} - \varepsilon'_{n+3}a_{n+3}) + (-a_{n+4} - \varepsilon'_{n+4}a_{n+4}) + \dots$$

Keďže $2a_i > 2R_i$, z toho vyplýva:

$$2a_i > (\varepsilon_{i+1}a_{i+1} - \varepsilon'_{i+1}a_{i+1}) + (\varepsilon_{i+2}a_{i+2} - \varepsilon'_{i+2}a_{i+2}) + \dots + (\varepsilon_n a_n - \varepsilon'_n a_n) + \\ + (a_{n+1} - \varepsilon'_{n+1}a_{n+1}) + (-a_{n+2} - \varepsilon'_{n+2}a_{n+2}) + (-a_{n+3} - \varepsilon'_{n+3}a_{n+3}) + \\ + (-a_{n+4} - \varepsilon'_{n+4}a_{n+4}) + \dots$$

Z toho vyplýva $S([\alpha']\xi) > S([\alpha_1]\xi)$, t. j. $S([\alpha']\xi)$ leží napravo od pravého koncového bodu intervalu $I_{\varepsilon_1\varepsilon_2 \dots \varepsilon_n}$, teda $S([\alpha']\xi) \notin I_{\varepsilon_1\varepsilon_2 \dots \varepsilon_n}$. Musí teda byť $\varepsilon'_i = \varepsilon_i$ pre $i = 1, 2, \dots, n$. Potom však zpomedi prvkov množiny W je k číslu $\varepsilon_1 a_1 + \varepsilon_2 a_2 + \dots + \varepsilon_n a_n$ sprava najbližší prvok $S([\alpha_1]\xi)$, kde

$$[\alpha_1]\xi = \varepsilon_1 a_1 + \varepsilon_2 a_2 + \dots + \varepsilon_n a_n + a_{n+1} - a_{n+2} - a_{n+3} - \dots$$

čo je pravý koncový bod intervalu a zľava najbližší je $S([\alpha_2]\xi)$, kde

$$[\alpha_2]\xi = \varepsilon_1 a_1 + \varepsilon_2 a_2 + \dots + \varepsilon_n a_n - a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3} + \dots,$$

čo je ľavý koncový bod intervalu.

2. Ďalej ukážeme, že intervaly systému γ sú po dvoch dizjunktné. Nech teda $I_{\varepsilon_1\varepsilon_2 \dots \varepsilon_n}, I_{\varepsilon'_1\varepsilon'_2 \dots \varepsilon'_k} \in \gamma$. Máme ukázať, že platí:

$$I_{\varepsilon_1\varepsilon_2 \dots \varepsilon_n} \cap I_{\varepsilon'_1\varepsilon'_2 \dots \varepsilon'_k} = \emptyset,$$

pričom však predpokladáme, že tieto intervaly nie sú totožné, t. j., že

$$\varepsilon_1 a_1 + \varepsilon_2 a_2 + \dots + \varepsilon_n a_n \neq \varepsilon'_1 a_1 + \varepsilon'_2 a_2 + \dots + \varepsilon'_k a_k.$$

Najprv ukážeme, že rovnosť:

$$\varepsilon_1 a_1 + \dots + \varepsilon_n a_n = \varepsilon'_1 a_1 + \dots + \varepsilon'_k a_k \quad (3)$$

môže nastať v tom a len v tom prípade, ak $k = n$ a $\varepsilon_i = \varepsilon'_i$ pre $i = 1, 2, \dots, n$. Skutočne musí byť $\varepsilon'_1 = \varepsilon_1$, pretože v opačnom prípade by vzhľadom na predpoklad $a_1 > R_1$ jedna strana rovnosti (3) bola kladná a druhá záporná. Je teda $\varepsilon'_1 = \varepsilon_1$ a rovnosť (3) prejde v rovnosť:

$$\varepsilon_2 a_2 + \varepsilon_3 a_3 + \dots + \varepsilon_n a_n = \varepsilon'_2 a_2 + \varepsilon'_3 a_3 + \dots + \varepsilon'_k a_k.$$

Z toho analogicky vyplýva, že $\varepsilon'_2 = \varepsilon_2$, atď. Týmto postupom po konečnom počte krokov sa presvedčíme, že $k = n$ a $\varepsilon'_i = \varepsilon_i$ pre $1 \leq i \leq k$. Ak naopak $k = n$ a $\varepsilon'_i = \varepsilon_i$ pre $i = 1, 2, 3, \dots, n$, potom rovnosť (3) zrejme platí. Nech je teraz $I_{\varepsilon_1 \varepsilon_2 \dots \varepsilon_n} \cap I_{\varepsilon'_1 \varepsilon'_2 \dots \varepsilon'_k} \neq \emptyset$. Potom tento prenik je nejaký otvorený interval. V dôsledku toho musí aspoň jeden koncový bod jedného z uvažovaných intervalov (napr. intervalu $I_{\varepsilon'_1 \varepsilon'_2 \dots \varepsilon'_k}$) patriť do druhého intervalu (do $I_{\varepsilon_1 \varepsilon_2 \dots \varepsilon_n}$). Avšak tento koncový bod je prvkom množiny W , teda $I_{\varepsilon_1 \varepsilon_2 \dots \varepsilon_n} \cap W \neq \emptyset$, čo je vo spore s 1.

3. Ukážeme, že každý styčný interval množiny W splyva s nejakým intervalom systému γ . Nech teda $J = (i_2, i_1)$ je styčný interval množiny W v intervale $\langle -A, A \rangle$. Teda: $i_1 = S([\alpha_1] \xi) \in W$, $i_2 = S([\alpha_2] \xi) \in W$. Nech:

$$[\alpha_1] \xi = \varepsilon_1 a_1 + \varepsilon_2 a_2 + \dots + \varepsilon_n a_n + \varepsilon_{n+1} a_{n+1} + \varepsilon_{n+2} a_{n+2} + \dots \quad (4)$$

Ukážeme, že existuje index k tak, že pre $n > k$ je $\varepsilon_n = -1$. Nech by tomu tak nebolo, potom rad (4) by obsahoval nekonečne mnoho členov $\varepsilon_n a_n$ takých, že $\varepsilon_n = +1$. Označme $\varepsilon = i_1 - i_2 > 0$. K číslu $\frac{\varepsilon}{2}$ nájdeme také veľké n , aby $\varepsilon_n = +1$ a $a_n < \frac{\varepsilon}{2}$ [to je možné, pretože rad (1) konverguje, teda $a_n \rightarrow 0$]. Keď v rade $[\alpha_1] \xi$ zmeníme znamienko pri člene a_n , t. j. keď utvoríme rad $[\alpha] \xi$, pre ktorý bude platiť:

$$[\alpha] \xi = \varepsilon'_1 a_1 + \varepsilon'_2 a_2 + \varepsilon'_3 a_3 + \dots + \varepsilon'_n a_n + \dots,$$

$\varepsilon'_k = \varepsilon_k$ pre $k \neq n$ a $\varepsilon'_n = \varepsilon_n$, potom zrejme

$$S([\alpha_1] \xi) - S([\alpha] \xi) > 0 \text{ a } S([\alpha_1] \xi) - S([\alpha] \xi) = 2a_n < \varepsilon,$$

t. j. $S([\alpha] \xi) \in J$, čo je spor. Teda musí byť:

$$[\alpha_1] \xi = \varepsilon_1 a_1 + \varepsilon_2 a_2 + \dots + \varepsilon_n a_n + a_{n+1} - a_{n+2} - a_{n+3} - \dots$$

Ako sme už videli, číslo $S([\alpha_1] \xi)$ zpomedzi všetkých prvkov množiny W je najbližšie ležiace k číslu $\varepsilon_1 a_1 + \varepsilon_2 a_2 + \dots + \varepsilon_n a_n$ sprava. Zľava najbližšie ležiace je číslo $S([\alpha'_2] \xi)$, kde

$$[\alpha'_2] \xi = \varepsilon_1 a_1 + \varepsilon_2 a_2 + \dots + \varepsilon_n a_n - a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3} + \dots$$

Keby bolo $i_2 < S([\alpha'_2] \xi)$, potom vzhľadom na $S([\alpha'_2] \xi) < S([\alpha_1] \xi)$ by bolo $S([\alpha'_2] \xi) \in (i_2, i_1)$, čo nie je možné. Podobne nemôže byť ani $i_2 > S([\alpha'_2] \xi)$, pretože potom vzhľadom na to, že $i_2 < i_1$, by bolo $i_2 \in \{S([\alpha'_2] \xi), S([\alpha_1] \xi)\}$, čo nie je možné (pozri 1.). Musí teda byť: $i_2 = S([\alpha'_2] \xi) = S([\alpha_2] \xi)$ a tým je dôkaz vety 6 hotový.

Veta 7. *Nech v základnom rade (1) pre každé prirodzené k platí: $a_k \leq R_k$. Potom systém styčných intervalov množiny W v intervale $\langle -A, A \rangle$ je prázdny, t. j. $W = \langle -A, A \rangle$.*

Dôkaz. Vzhľadom na vetu 5 stačí ukázať, že pre každé $a \in \langle 0, A \rangle$ existuje znamienková schéma $[\alpha]$ tak, že $S([\alpha] \xi) = a$. Pritom sa stačí obmedziť na interval $\langle 0, A \rangle$, pretože $A = S(\xi)$ (schéma: $[\alpha] \equiv +1, +1, +1, \dots +1, \dots$).

Nech teda $a \in \langle 0, A \rangle$. Existuje n_1 tak, že:

$$a_1 + a_2 + \dots + a_{n_1-1} \leq a, \text{ ale } a_1 + a_2 + \dots + a_{n_1} > a.$$

Označíme $\sigma_{n_1} = a_1 + a_2 + \dots + a_{n_1}$, je zrejmé: $|\sigma_{n_1} - a| \leq a_{n_1}$. Keď je $a = \sigma_{n_1} - R_{n_1}$, kde R_{n_1} je zvyšok po n_1 -tom člene v základnom rade (1), tvrdenie vety je dokázané. V opačnom prípade existuje n_2 také, že: $a_1 + a_2 + \dots + a_{n_1} - a_{n_1+1} - \dots - a_{n_2-1} \geq a$, avšak $a_1 + a_2 + \dots + a_{n_1} - a_{n_1+1} - \dots - a_{n_2} < a$. Označíme $\sigma_{n_2} = a_1 + a_2 + \dots + a_{n_1} - a_{n_1+1} - \dots - a_{n_2}$ zrejmé $|\sigma_{n_2} - a| \leq a_{n_2}$. Keď je $a = \sigma_{n_2} + R_{n_2}$, tvrdenie vety je dokázané. V opačnom prípade existuje n_3 také, že:

$$a_1 + \dots + a_{n_1} - a_{n_1+1} - \dots - a_{n_2} + a_{n_2+1} + \dots + a_{n_3-1} \leq a,$$

avšak $a_1 + \dots + a_{n_1} - a_{n_1+1} - \dots - a_{n_2} + a_{n_2+1} + \dots + a_{n_3} > a$. Označíme $\sigma_{n_3} = a_1 + \dots + a_{n_1} - a_{n_1+1} - \dots - a_{n_2} + a_{n_2+1} + \dots + a_{n_3}$ potom zrejmé: $|\sigma_{n_3} - a| \leq a_{n_3}$ atď.

Z celého postupu vidieť, že máme tieto možnosti:

a) Pre nejaké prirodzené k bude $a = \sigma_{n_k} + (-1)^k R_{n_k}$. Potom je dôkaz hotový.

b) Pre žiadne prirodzené k nenastane prípad a). Potom dostávame nekonečnú postupnosť prirodzených čísel:

$$n_1 < n_2 < n_3 < \dots < n_k < \dots$$

a rad: $[\alpha] \xi = a_1 + \dots + a_{n_1} - a_{n_1+1} - \dots - a_{n_2} + \dots + (-1)^{k+1} a_{n_k} + \dots$

Ukážeme, že $a = S([\alpha] \xi)$. Z konštrukcie radu $[\alpha] \xi$ je zrejmé toto:

Ak označíme $\sigma_{n_k} = a_1 + \dots + a_{n_1} - a_{n_1+1} - \dots - a_{n_2} + \dots + (-1)^{k+1} a_{n_k}$,

bude platiť: $|\sigma_{n_k} - a| \leq a_{n_k}$ teda $\lim_{k \rightarrow \infty} \sigma_{n_k} = a$. Postupnosť čiastočných súčtov

$\{\sigma_n\}_{n=1}^{\infty}$ radu $[\alpha] \xi$ je konvergentná (vzhľadom na konvergenciu radu) a keďže postupnosť $\{\sigma_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ je z nej vybraná, obe postupnosti budú mať ten istý limit, teda:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = a = S([\alpha] \xi).$$

Tým je dôkaz hotový.

Došlo dňa 21. IV. 1954.

О СУММЕ КОНВЕРГЕНТНЫХ РЯДОВ

ТИБОР ШАЛАТ

Выводы

Пусть $a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots$ (1) есть converгентный ряд с положительными членами. Пусть A_1^+ обозначает сумму этого ряда. Надо образовать все возможные ряды: $\varepsilon_1 a_1 + \varepsilon_2 a_2 + \dots + \varepsilon_n a_n + \dots$ (2) где ε_n есть $+1$ или -1 для каждого натурального n .

Предметом настоящей работы является исследование свойств множеств W суммы всех возможных рядов (2).

В работе доказано, что множество W является контактное и плотное в себе, дальше является симметрическое по отношению к началу. В таком случае, когда каждой член ряда (1) является больше, чем остаток ряда к нему принадлежащий, получим множество W из интервала $\langle -A, +A \rangle$, если выпустим счетную систему открытых интервалов, которых середина является соответствена с парциальными суммами рядов (2). В случае, когда никакой член ряда (1) не больше, как избыток ряда к нему принадлежащий, выполняет множество W весь интервал $\langle -A, A \rangle$, т. е. $W = \langle -A, +A \rangle$.